

EDUCACIÓN PARA PACIENTES Y CUIDADORES

Omalizumab

Esta información de UpToDate® Lexidrug™ le explica lo que debe saber sobre este medicamento, por ejemplo, para qué se usa, cómo tomarlo, sus efectos secundarios y cuándo llamar a su proveedor de cuidados de la salud.

Nombres comerciales: EE. UU.

Xolair

Nombres comerciales: Canadá

Omlyclo; Xolair

Advertencia

- Se han producido reacciones alérgicas después de la administración de este medicamento. En ocasiones, esto puso en riesgo la vida. Las reacciones alérgicas han sucedido tan pronto como después de la primera dosis. También han sucedido después de un año de tratamiento. El tratamiento se empezará a administrar en lugares de atención médica donde su hijo será controlado de cerca. Informe al médico de inmediato si tiene ansiedad, opresión en el pecho o la garganta, tos, mareos, latido cardíaco rápido o débil, calor, sofocos, urticaria, ronquera, picazón, desmayos, sarpullido, falta de aire, inflamación de la garganta o la lengua, dificultad para respirar o tragar, sibilancias o cualquier otro efecto grave.

¿Para qué se utiliza este medicamento?

- Este medicamento se utiliza para tratar la urticaria.
- Este medicamento se utiliza para tratar el asma.
- Se utiliza para reducir la probabilidad de que se produzca una reacción alérgica grave por ingerir accidentalmente un alimento al que la persona es alérgica.

- Si su hijo ha estado recibiendo este medicamento por alguna otra razón, consulte con su médico sobre los riesgos y beneficios. Consulte con su médico si tiene preguntas o dudas sobre el hecho de administrarle este medicamento a su hijo.

Para el asma:

- No administre este medicamento para tratar un ataque de asma. Utilice un inhalador de rescate. Hable con el médico.

Por motivos alérgicos:

- No utilice este medicamento para tratar una reacción alérgica. Consulte con su médico sobre qué medicamento utilizar para tratar una reacción alérgica.

¿Qué necesito decirle al médico ANTES de que mi hijo tome este medicamento?

- Si su hijo es alérgico a este medicamento, a algún componente de este medicamento, o a otros medicamentos, alimentos o sustancias. Informe a su médico acerca de esta alergia y qué síntomas ha presentado su hijo.

Este medicamento puede interactuar con otros medicamentos o trastornos.

Informe al médico y al farmacéutico todos los medicamentos que su hijo toma (sean estos recetados o de venta libre, productos naturales o vitaminas) y de los problemas de salud que padece. Debe verificar que sea seguro administrarle a su hijo este medicamento con todos sus otros medicamentos y problemas de salud. No empiece, interrumpa ni modifique la dosis de ningún medicamento que tome su hijo sin consultar antes con el médico.

¿Qué debo saber o hacer mientras mi hijo toma este medicamento?

- Avise a todos los proveedores de atención médica de su hijo que el niño toma este medicamento. Esto incluye a los médicos, enfermeras, farmacéuticos y dentistas del niño.
- Pueden necesitarse hasta varios meses para que se manifiesten los resultados completos.
- Controle la función sanguínea según le indique el médico. Consulte al médico.
- Este medicamento puede afectar ciertas pruebas de laboratorio. Avise a todos los proveedores de atención médica y bioquímicos de su hijo que su hijo toma este medicamento.
- Si su hijo es alérgico al látex, consulte al médico. Algunos

productos tienen látex.

- Se han presentado casos de cáncer en algunas personas que tomaban este medicamento. Consulte con el médico si tiene alguna pregunta.
- Algunas personas que tienen riesgo alto de infecciones por parásitos han contraído una infección por parásitos después de tomar este medicamento. El médico puede hacer un análisis de la materia fecal de su hijo para ver si tiene una infección por parásitos. Consulte con el médico.
- Si su hijo cambia a este medicamento luego de usar algún esteroide, no deje de darle el esteroide en forma repentina. Es posible que la dosis del esteroide deba reducirse poco a poco para evitar efectos secundarios. Consulte con el médico.
- Puede que algunas formas de este medicamento no sean aptas para utilizar en niños de todas las edades. Consulte con el médico si tiene alguna pregunta.

Si su hija está embarazada o amamantando a un bebé:

- Consulte al médico si su hija está embarazada, queda embarazada o está amamantando a un bebé. Tendrá que hablar acerca de los riesgos y beneficios para su hija y el bebé.

Por motivos alérgicos:

- Este medicamento no cura alergias. Siga haciendo que su hijo evite los alimentos que le provoquen una reacción alérgica. Si su hijo está tomando otros medicamentos para la alergia, no deje que su hijo deje de tomarlos a menos que el médico le indique lo contrario.

Para el asma:

- Llame al médico de inmediato si su hijo tiene problemas respiratorios que empeoran, si el inhalador de emergencia no funciona tampoco o si su hijo necesita el inhalador de emergencia con más frecuencia.

¿Cuáles son los efectos secundarios por los que debo llamar al médico de mi hijo de inmediato?

ADVERTENCIA/PRECAUCIÓN: a pesar de que es muy poco frecuente, algunas personas pueden sufrir efectos secundarios muy graves, y en ocasiones mortales, al tomar un medicamento. Si su hijo presenta alguno de los siguientes signos o síntomas que pueden estar relacionados con un efecto secundario muy grave, infórmelo al médico de su hijo o busque ayuda médica de inmediato:

- Signos de reacción alérgica, tales como sarpullido; urticaria; picazón; piel enrojecida, hinchada, ampollada

o descamada, con o sin fiebre; sibilancia; opresión en el pecho o la garganta; problemas para respirar, tragar o hablar; ronquera inusual, o hinchazón de la boca, el rostro, los labios, la lengua o la garganta. En muy pocas ocasiones, algunas reacciones alérgicas han causado una amenaza para la vida.

- Sensación de ardor, adormecimiento u hormigueo fuera de lo común.
- Dolor de huesos.
- Problema para respirar reciente o que empeoró.
- Algunas personas que usan este medicamento presentan fiebre, dolor articular, rigidez, inflamación, dolor muscular, inflamación de las glándulas o sarpullido. Esto ha sucedido en el lapso de 1 a 5 días después de tomar este medicamento. Llame al médico de inmediato si su hijo/a tiene cualquiera de estos síntomas.
- Algunas personas que toman este medicamento han presentado dolor en el pecho, ataques cardíacos, ataques isquémicos transitorios (AIT) o coágulos de sangre. Se desconoce si este medicamento causó estos problemas. Llame al médico si su hijo/a tiene dolor o presión de pecho, mandíbula o brazo, desmayos, falta de aire, hinchazón, calor, entumecimiento, cambio de

color o dolor en una pierna o un brazo o tos con sangre. Comuníquese con el médico de inmediato si su hijo presenta cambios en la fuerza, que es mayor de 1 lado que del otro, dificultades para hablar o pensar, cambios en el equilibrio o visión borrosa.

¿Qué otros efectos secundarios tiene este medicamento?

Todos los medicamentos pueden tener efectos secundarios. Sin embargo, muchas personas no padecen ningún efecto secundario o padecen solamente efectos secundarios menores. Llame al médico de su hijo o busque ayuda médica si al niño le molesta alguno de estos efectos secundarios o no desaparece:

- Dolor de cabeza.
- Náuseas.
- Irritación en la zona en la que se aplicó la inyección.
- Hematomas, picazón, dolor o enrojecimiento en el lugar de la inyección.
- Se siente cansado o débil.
- Irritación en la nariz o garganta.
- Signos de un resfrío común.
- Dolor en los brazos o las piernas.
- Dolor de oídos.

- Dolor de estómago.
- Hemorragia nasal.

Estos no son todos los efectos secundarios que podrían ocurrir. Si tiene preguntas acerca de los efectos secundarios, llame al médico de su hijo. Llame al médico de su hijo para que le aconseje acerca de los efectos secundarios.

Puede informar los efectos secundarios al organismo de salud de su país.

¿Cómo se administra mejor este medicamento?

Administre este medicamento según las instrucciones del médico de su hijo. Lea toda la información que se le brinde. Siga todas las instrucciones con atención.

Jeringas precargadas y autoinyectores:

- Este medicamento se administra por inyección en la capa grasa de la piel en la parte superior del muslo o en el vientre.
- Este medicamento puede administrarse en el área externa de la parte superior del brazo si lo hace otra persona.
- Si inyectará a su hijo, el médico de su hijo o la enfermera le indicarán cómo aplicar la inyección.

- Lávese las manos antes y después de usar.
- Antes de administrar este medicamento, retírelo del refrigerador. Permita que alcance la temperatura ambiente. Algunos productos tardarán de 15 a 30 minutos. Algunos productos tardarán de 30 a 45 minutos. Asegúrese de saber cuánto tiempo dejar reposar su producto. No caliente este medicamento.
- Algunos productos no deben agitarse. Asegúrese de saber si el producto no debe agitarse.
- No utilizar si la solución se ve turbia, pierde o contiene partículas.
- No utilice este medicamento si se cayó o se está dañado.
- Este medicamento tiene un aspecto incoloro entre levemente amarillo o levemente marrón. No se debe utilizar si la solución cambia de color.
- No ignore un lunar, una cicatriz o piel que esté irritada, sensible, amoratada, roja, dura o agrietada.
- No inyecte a través de la ropa.
- Inyecte al menos a 2,5 cm (1 pulgada) de distancia del lugar donde se administró la última dosis. Si la dosis de su hijo tiene más de 1 inyección, aplique las inyecciones en 2 lugares diferentes a una distancia de al menos 2,5 cm (1 pulgada).

- No lo administre en la piel que esté en un radio de 5 cm (2 pulgadas) del ombligo.
- Si observa una pequeña burbuja de aire en el dispositivo, no se deshaga de ella.
- No frote la zona donde aplicaron la inyección.
- Cada autoinyector y jeringa precargada sirven para un único uso.
- Deseche las agujas en la caja para agujas y objetos cortantes. No vuelva a utilizar agujas ni otros suministros. Cuando la caja esté llena, siga todos los procedimientos locales para desecharla. Si tiene preguntas, consulte al médico o farmacéutico.

Viales:

- Este medicamento se administra por inyección en la parte grasa de la piel, en la parte superior del muslo, en la zona abdominal o en la parte superior de brazo.

¿Qué debo hacer si mi hijo no toma una dosis?

- Llame al médico de su hijo para obtener instrucciones.

¿Cómo almaceno o descarto este medicamento?

Jeringas precargadas y autoinyectores:

- Conserve en el refrigerador. No congelar.
- No utilice el producto si se congeló.

- Conservar en el envase original para proteger de la luz.

Jeringas precargadas y autoinyectores de Xolair:

- Este medicamento puede retirarse del refrigerador y volver a guardarse si fuera necesario. La cantidad total de tiempo que puede estar fuera del refrigerador no puede superar los 2 días.
- Proteja del calor. No utilizar si la jeringa ha estado a temperaturas superiores a 25 °C (77 °F)

Jeringas precargadas de Omlyclo:

- Este medicamento puede retirarse del refrigerador y volver a guardarse si fuera necesario. La cantidad total de tiempo que puede estar fuera del refrigerador no puede superar los 7 días.
- Proteja del calor. No utilizar si la jeringa ha estado a temperaturas superiores a 25 °C (77 °F)

Viales:

- Si debe almacenar este medicamento en su hogar, hable con el médico de su hijo, la enfermera o el farmacéutico sobre las condiciones de almacenamiento.

Todas las presentaciones:

- Guarde los medicamentos en un lugar seguro. Mantenga todo medicamento fuera del alcance de los niños y las

mascotas.

- Deseche los medicamentos sin usar o que hayan expirado. No los tire por el retrete ni los vierta al desagüe a menos que así se lo indiquen. Consulte con el farmacéutico si tiene preguntas sobre la mejor manera de desechar medicamentos. Pueden existir programas de devolución de medicamentos en su área.

Datos generales sobre el medicamento

- Si los síntomas o trastornos de su hijo no mejoran o si empeoran, llame al médico de su hijo.
- No comparta el medicamento del niño con otras personas ni le de al niño el medicamento de ninguna otra persona.
- Algunos medicamentos pueden tener otro folleto informativo para el paciente. Si tiene alguna pregunta sobre este medicamento, hable con su médico, enfermera, farmacéutico u otro proveedor de atención médica.
- Si cree que ha habido una sobredosis, llame al centro de toxicología local o busque atención médica de inmediato. Prepárese para responder qué se ingirió, qué cantidad y cuándo.

Uso de la información por el consumidor y exención de responsabilidad

Esta información general es un resumen limitado de la información sobre el diagnóstico, el tratamiento y/o la medicación. No pretende ser exhaustivo y debe utilizarse como una herramienta para ayudar al usuario a comprender y/o evaluar las posibles opciones de diagnóstico y tratamiento. NO incluye toda la información sobre las enfermedades, los tratamientos, los medicamentos, los efectos secundarios o los riesgos que pueden aplicarse a un paciente específico. No pretende ser un consejo médico ni un sustituto del consejo médico, el diagnóstico o el tratamiento de un proveedor de atención médica basado en el examen y la evaluación del proveedor de atención médica de las circunstancias específicas y únicas de un paciente. Los pacientes deben hablar con un proveedor de atención médica para obtener información completa sobre su salud, preguntas médicas y opciones de tratamiento, incluidos los riesgos o beneficios relacionados con el uso de medicamentos. Esta información no respalda ningún tratamiento o medicamento como seguro, eficaz o aprobado para tratar a un paciente específico. UpToDate, Inc. y sus afiliados renuncian a cualquier garantía o responsabilidad relacionada con esta información o con el uso que se haga de esta. El uso de esta información se rige por las Condiciones de uso, disponibles en <https://www.wolterskluwer.com/en/know/clinical->

[effectiveness-terms.](#)

Última fecha de revisión

2026-02-04

Derechos de autor

© 2026 UpToDate, Inc. y sus licenciantes y/o afiliados.
Todos los derechos reservados.

Si tiene preguntas o inquietudes, contáctese con su proveedor de cuidados de la salud. Un integrante de su equipo de atención le responderá de lunes a viernes de 9 a. m. a 5 p. m. Fuera de ese horario, puede dejar un mensaje o hablar con otro proveedor de MSK. Siempre hay un médico o un enfermero de guardia. Si no está seguro de cómo comunicarse con su proveedor de cuidados de la salud, llame al 212-639-2000.

Para obtener más recursos, visite www.mskcc.org/pe y busque en nuestra biblioteca virtual.

Omalizumab - Last updated on December 12, 2022

Todos los derechos son propiedad y se reservan a favor de Memorial Sloan Kettering Cancer Center



Memorial Sloan Kettering
Cancer Center