EDUCACIÓN PARA PACIENTES Y CUIDADORES

Onasemnogene Abeparvovec

Esta información de UpToDate® Lexidrug™ le explica lo que debe saber sobre este medicamento, por ejemplo, para qué se usa, cómo tomarlo, sus efectos secundarios y cuándo llamar a su proveedor de cuidados de la salud.

Nombres comerciales: EE. UU.
Itvisma; Zolgensma

Nombres comerciales: Canadá
Zolgensma

Advertencia

- Este medicamento ha provocado problemas hepáticos. En algunos casos, los problemas hepáticos resultaron mortales. El riesgo de problemas hepáticos puede ser mayor si su hijo o hija ya tiene problemas hepáticos. Debe controlarse la función hepática de su hijo o hija según le haya indicado el médico.

¿Para qué se utiliza este medicamento?

- Se utiliza para tratar la atrofia muscular espinal.

¿Qué necesito decirle al médico ANTES de que mi hijo tome este medicamento?

Todas las presentaciones:

- Si su hijo es alérgico a este medicamento, a algún componente de este medicamento, o a otros medicamentos, alimentos o sustancias. Informe a su médico acerca de esta alergia y qué síntomas ha presentado su hijo.
- Si el niño tiene una infección.
- Si su hijo o hija tiene deshidratación o una mala nutrición.
- Si su hijo ha tomado alguna vez otro medicamento que contenga el mismo medicamento.

Inyección (si se aplica en la vena):

- Si su hijo es un bebé prematuro. Este medicamento no debe utilizarse en bebés prematuros de ciertas edades.

Esta no es una lista de todos los medicamentos o trastornos que pueden interactuar con este medicamento.

Informe al médico y al farmacéutico todos los medicamentos que su hijo toma (sean estos recetados o de venta libre, productos naturales o vitaminas) y de los

problemas de salud que padece. Debe verificar que sea seguro administrarle a su hijo este medicamento con todos sus otros medicamentos y problemas de salud. No empiece, interrumpa ni modifique la dosis de ningún medicamento que tome su hijo sin consultar antes con el médico.

¿Qué debo saber o hacer mientras mi hijo toma este medicamento?

- Avise a todos los proveedores de atención médica de su hijo que el niño toma este medicamento. Esto incluye a los médicos, enfermeras, farmacéuticos y dentistas del niño.
- Controle los análisis de sangre de su hijo y otras pruebas de laboratorio según le haya indicado el médico.
- Se han dado casos de aumento de los niveles de troponina (una proteína del músculo cardiaco) con este medicamento. Es posible que un cardiólogo tenga que examinar el corazón de su hijo. Consulte con el médico si tiene alguna pregunta.
- Asegúrese de que su hijo esté al día con todas las vacunas antes de comienzo del tratamiento con este medicamento.
- Este medicamento se toma con un esteroide, como la prednisolona. Consulte con el médico de su hijo antes

de que su hijo reciba vacunas.

- Sufrir una infección antes o después de la infusión de este medicamento puede provocar un problema más grave. Los cuidadores y las personas cercanas deben tomar medidas para prevenir infecciones. Por ejemplo, lavarse las manos a menudo, tener cuidado al toser o estornudar y limitar el contacto. Comuníquese con el médico de inmediato si su hijo presenta signos de infección como tos, sibilancias, estornudos, secreción nasal, dolor de garganta, fiebre, escalofríos, dolor de oídos o senos paranasales, aumento de la cantidad de esputo o cambio en su color, dolor al orinar, llagas en la boca o heridas que no cicatrizan.
- Tenga especial cuidado al manipular y desechar las heces del paciente. Arroje los pañales a la basura doméstica sellados en bolsas de basura. Asegúrese de lavarse bien las manos si entra en contacto con fluidos corporales como saliva, moco, orina o heces. Haga esto durante 1 mes después del tratamiento con este medicamento. Si tiene alguna pregunta, consulte al médico.
- Existe la posibilidad de que este medicamento aumente el riesgo de cáncer. Se han observado casos de cáncer en personas que habían sido tratadas con este medicamento. Se desconoce si este medicamento

podría ser la causa. Consulte con el médico si tiene alguna pregunta.

Si su hijo es sexualmente activo o puede serlo:

- Se realizará una prueba de embarazo para demostrar que la niña NO está embarazada antes de comenzar con la administración de este medicamento. Si la niña queda embarazada mientras toma este medicamento, llame al médico de inmediato.
- Si su hija puede quedar embarazada, debe usar un método anticonceptivo durante 6 meses después de tomarlo. Si su hija queda embarazada, llame al médico de inmediato.
- Si la compañera sexual de su hijo puede quedar embarazada, su hijo debe usar un método anticonceptivo durante 3 meses después de tomar este medicamento. Si la pareja de su hijo queda embarazada, llame al médico de inmediato.
- Informe al médico si está amamantando a su hijo. Deberá hablar acerca de los riesgos para el bebé.

¿Cuáles son los efectos secundarios por los que debo llamar al médico de mi hijo de inmediato?

ADVERTENCIA/PRECAUCIÓN: a pesar de que es muy poco frecuente, algunas personas pueden sufrir efectos secundarios muy graves, y en ocasiones mortales, al tomar

un medicamento. Si su hijo presenta alguno de los siguientes signos o síntomas que pueden estar relacionados con un efecto secundario muy grave, infórmelo al médico de su hijo o busque ayuda médica de inmediato:

Todas las presentaciones:

- Signos de reacción alérgica tales como sarpullido; urticaria; picazón; piel enrojecida, hinchada, con ampollas o descamada, con o sin fiebre; sibilancia; opresión en el pecho o la garganta; problemas para respirar, tragar o hablar; ronquera inusual; o hinchazón de la boca, el rostro, los labios, la lengua o la garganta.
- Signos de problemas hepáticos, como orina color oscuro, cansancio, disminución del apetito, malestar estomacal o dolor estomacal, heces color claro, vómitos, o piel u ojos amarillentos.
- Este medicamento ha provocado un problema de salud grave llamado microangiopatía trombótica (MAT). La MAT puede poner en riesgo la vida o ser mortal. Llame al médico de inmediato si su hijo presenta signos de cansancio o debilidad; hematomas o hemorragias inexplicables; convulsiones, cambios en la cantidad de orina; o signos de presión arterial alta como dolor de cabeza o mareos intensos, desmayos o cambios en la

vista.

Inyección (si se aplica en la vena):

- Se han producido reacciones durante la infusión. Informe de inmediato al médico de su hijo si tiene erupción cutánea; picor; vómitos; dificultad para respirar u otros problemas respiratorios; ritmo cardiaco rápido, lento o anormal; signos de presión arterial baja como mareos intensos o desmayos; o cualquier otro efecto adverso.

Inyección (si se administra en la columna vertebral):

- Entumecimiento, hormigueo, pinchazos o dolor en brazos, manos, piernas o pies que comienza unas 3 semanas después de recibir este medicamento. Comuníquese con el médico de inmediato si su hijo tiene cualquiera de estos efectos.

¿Qué otros efectos secundarios tiene este medicamento?
Todos los medicamentos pueden tener efectos secundarios. Sin embargo, muchas personas no padecen ningún efecto secundario o padecen solamente efectos secundarios menores. Llame al médico de su hijo o busque ayuda médica si al niño le molesta alguno de estos efectos secundarios o no desaparece:

Todas las presentaciones:

- Vómitos.

Inyección (si se administra en la columna vertebral):

- Dolor de cabeza.

Estos no son todos los efectos secundarios que podrían ocurrir. Si tiene preguntas acerca de los efectos secundarios, llame al médico de su hijo. Llame al médico de su hijo para que le aconseje acerca de los efectos secundarios.

Puede informar los efectos secundarios al organismo de salud de su país.

¿Cómo se administra mejor este medicamento?
Administre este medicamento según las instrucciones del médico de su hijo. Lea toda la información que se le brinde. Siga todas las instrucciones con atención.

Inyección (si se aplica en la vena):

- Este medicamento se administra como una infusión en una vena por un periodo de tiempo.
- Se administrará un medicamento esteroide como la prednisolona antes y después de este medicamento para ayudar a evitar los efectos secundarios. Informe al médico si el medicamento esteroide no se usa como se le indicó.

Inyección (si se administra en la columna vertebral):

- Este medicamento se administra en forma de inyección en la columna vertebral.
- Se administrará un medicamento esteroide como la prednisolona antes y después de este medicamento para ayudar a evitar los efectos secundarios. Informe al médico si el medicamento esteroide no se usa como se le indicó.

¿Qué debo hacer si mi hijo no toma una dosis?

- Llame al médico de su hijo para obtener instrucciones.

¿Cómo almaceno o descarto este medicamento?

- Si debe almacenar este medicamento en su hogar, hable con el médico de su hijo, la enfermera o el farmacéutico sobre las condiciones de almacenamiento.

Datos generales sobre el medicamento

- Si los síntomas o trastornos de su hijo no mejoran o si empeoran, llame al médico de su hijo.
- No comparta el medicamento del niño con otras personas ni le de al niño el medicamento de ninguna otra persona.
- Guarde los medicamentos en un lugar seguro. Mantenga todo medicamento fuera del alcance de los niños y las

mascotas.

- Deseche los medicamentos sin usar o que hayan expirado. No los tire por el retrete ni los vierta al desagüe a menos que así se lo indiquen. Consulte con el farmacéutico si tiene preguntas sobre la mejor manera de desechar medicamentos. Pueden existir programas de devolución de medicamentos en su área.
- Algunos medicamentos pueden tener otro folleto informativo para el paciente. Si tiene alguna pregunta sobre este medicamento, hable con el médico de su hijo, enfermera, farmacéutico u otro proveedor de atención médica.
- Si cree que ha habido una sobredosis, llame al centro de toxicología local o busque atención médica de inmediato. Prepárese para responder qué se ingirió, qué cantidad y cuándo.

Uso de la información por el consumidor y exención de responsabilidad

Esta información general es un resumen limitado de la información sobre el diagnóstico, el tratamiento y/o la medicación. No pretende ser exhaustivo y debe utilizarse como una herramienta para ayudar al usuario a comprender y/o evaluar las posibles opciones de diagnóstico y tratamiento. NO incluye toda la información sobre las enfermedades, los tratamientos, los

medicamentos, los efectos secundarios o los riesgos que pueden aplicarse a un paciente específico. No pretende ser un consejo médico ni un sustituto del consejo médico, el diagnóstico o el tratamiento de un proveedor de atención médica basado en el examen y la evaluación del proveedor de atención médica de las circunstancias específicas y únicas de un paciente. Los pacientes deben hablar con un proveedor de atención médica para obtener información completa sobre su salud, preguntas médicas y opciones de tratamiento, incluidos los riesgos o beneficios relacionados con el uso de medicamentos. Esta información no respalda ningún tratamiento o medicamento como seguro, eficaz o aprobado para tratar a un paciente específico. UpToDate, Inc. y sus afiliados renuncian a cualquier garantía o responsabilidad relacionada con esta información o con el uso que se haga de esta. El uso de esta información se rige por las Condiciones de uso, disponibles en https://www.wolterskluwer.com/en/know/clinical-effectiveness-terms.

Última fecha de revisión
2026-06-29

Derechos de autor
© 2026 UpToDate, Inc. y sus licenciantes y/o afiliados. Todos los derechos reservados.

Si tiene preguntas o inquietudes, contáctese con su proveedor de cuidados de la salud. Un integrante de su equipo de atención le responderá de lunes a viernes de 9 a. m. a 5 p. m. Fuera de ese horario, puede dejar un mensaje o hablar con otro proveedor de MSK. Siempre hay un médico o un enfermero de guardia. Si no está seguro de cómo comunicarse con su proveedor de cuidados de la salud, llame al 212-639-2000.

Para obtener más recursos, visite www.mskcc.org/pe y busque en nuestra biblioteca virtual.

Onasemnogene Abeparvovec - Last updated on December 12, 2022

Todos los derechos son propiedad y se reservan a favor de Memorial Sloan Kettering Cancer Center

Memorial Sloan Kettering Cancer Center