

# Oxybate Salts (Calcium, Magnesium, Potassium, and Sodium)

Esta información de UpToDate® Lexidrug™ le explica lo que debe saber sobre este medicamento, por ejemplo, para qué se usa, cómo tomarlo, sus efectos secundarios y cuándo llamar a su proveedor de cuidados de la salud.

## Nombres comerciales: EE. UU.

Xywav

## Nombres comerciales: Canadá

Xywav

### Advertencia

- Este medicamento puede ocasionar efectos secundarios graves. Estos pueden incluir problemas respiratorios, presión arterial baja, cambios en el estado de alerta y desmayos. Consulte con el médico si tiene alguna pregunta.
- El abuso y el uso indebido de este medicamento o con otros medicamentos pueden causar convulsiones, respiración lenta o poco profunda, cambios en el estado de alerta, coma o la muerte.

### ¿Para qué se utiliza este medicamento?

- Este medicamento se utiliza para tratar la pérdida de la tonicidad muscular (cataplexia) en pacientes con narcolepsia.

- Se utiliza para tratar la somnolencia durante el día en pacientes con narcolepsia.
- Se le puede recetar este medicamento al niño por otras razones. Consulte al médico.

## **¿Qué necesito decirle al médico ANTES de que mi hijo tome este medicamento?**

- Si su hijo es alérgico a este medicamento, a algún componente de este medicamento, o a otros medicamentos, alimentos o sustancias. Informe a su médico acerca de esta alergia y qué síntomas ha presentado su hijo.
- Si su hijo tiene deficiencia de succinato-semialdehído-deshidrogenasa.
- Si su hijo bebe alcohol o consume algún medicamento que contenga alcohol.
- Si su hijo está tomando medicamentos o productos naturales que se utilizan para dormir. Existen muchos productos que se utilizan para dormir. Consulte con el médico de su hijo o con el farmacéutico si no está seguro.

Esta no es una lista de todos los medicamentos o trastornos que pueden interactuar con este medicamento.

Informe al médico y al farmacéutico todos los medicamentos que su hijo toma (sean estos recetados o de venta libre, productos naturales o vitaminas) y de los problemas de salud que padece. Debe verificar que sea seguro administrarle a su hijo este medicamento con todos sus otros medicamentos y problemas de salud. No empiece, interrumpa ni modifique la dosis de ningún medicamento que tome su hijo sin consultar antes con el médico.

## **¿Qué debo saber o hacer mientras mi hijo toma este medicamento?**

- Avise a todos los proveedores de atención médica de su hijo que el niño toma este medicamento. Esto incluye a los médicos, enfermeras, farmacéuticos y dentistas del niño.

- El uso prolongado o regular de este medicamento puede provocar dependencia. Dejar de tomar este medicamento de forma repentina puede provocar signos de abstinencia. Consulte con el médico de su hijo antes de reducir la dosis o dejar de tomar este medicamento. Deberá seguir las instrucciones del médico. Informe al médico si su hijo experimenta algún efecto adverso.
- Evite que su hijo haga actividades o tareas que requieran un estado de alerta durante al menos 6 horas después de tomar este medicamento. Estas actividades incluyen andar en bicicleta, hacer deportes o utilizar artículos como tijeras, cortadoras de césped, monopatines eléctricos, coches de juguete o vehículos motorizados. Procure que su hijo evite estas tareas o acciones hasta que esté completamente despierto.
- El alcohol puede interactuar con este medicamento. Asegúrese de que su hijo no beba alcohol.
- Consulte al médico del niño antes de darle al niño otros medicamentos y productos naturales que puedan retardar sus reacciones.
- Muchas sustancias interactúan con este medicamento y puede aumentar la posibilidad de sufrir efectos secundarios, como problemas respiratorios mortales. Hable con el médico y el farmacéutico de su hijo para asegurarse de que es seguro administrar este medicamento junto con los otros medicamentos de su hijo.
- Después de tomar este medicamento, es probable que su hijo se quede dormido muy rápido (la mayoría de las veces dentro de los 5 o 15 minutos). El tiempo que tarde en conciliar el sueño puede cambiar de una noche a otra. Dormirse de repente al estar de pie o al levantarse de la cama ha producido caídas y la necesidad de acudir al hospital. Asegúrese de que su hijo tome este medicamento mientras está en la cama. Haga que su hijo se acueste inmediatamente después de tomarlo.

### **Si su hija está embarazada o amamantando a un bebé:**

- Consulte al médico si su hija está embarazada, queda embarazada o está amamantando a un bebé. Tendrá que hablar acerca de los riesgos y beneficios para su hija y el bebé.

## ¿Cuáles son los efectos secundarios por los que debo llamar al médico de mi hijo de inmediato?

**ADVERTENCIA/PRECAUCIÓN:** a pesar de que es muy poco frecuente, algunas personas pueden sufrir efectos secundarios muy graves, y en ocasiones mortales, al tomar un medicamento. Si su hijo presenta alguno de los siguientes signos o síntomas que pueden estar relacionados con un efecto secundario muy grave, infórmelo al médico de su hijo o busque ayuda médica de inmediato:

- Signos de reacción alérgica tales como sarpullido; urticaria; picazón; piel enrojecida, hinchada, con ampollas o descamada, con o sin fiebre; sibilancia; opresión en el pecho o la garganta; problemas para respirar, tragar o hablar; ronquera inusual; o hinchazón de la boca, el rostro, los labios, la lengua o la garganta.
- Signos de depresión, pensamientos suicidas, nerviosismo, altibajos emocionales, pensamiento anormal, ansiedad o falta de interés en la vida.
- Alucinaciones (ver o escuchar cosas que no están allí).
- Sentirse confundido, no poder concentrarse o cambiar de comportamiento.
- Cambio inexplicado en el peso.
- Cambios en el apetito.
- Sonambulismo.
- Dificultad para respirar, respiración lenta o superficial.
- Problemas respiratorios durante el sueño (apnea del sueño).
- Mareos severos o desmayos.
- Temblores.

## ¿Qué otros efectos secundarios tiene este medicamento?

Todos los medicamentos pueden tener efectos secundarios. Sin embargo, muchas personas no padecen ningún efecto secundario o padecen solamente efectos secundarios menores. Llame al médico de su hijo o busque ayuda médica si al niño le molesta alguno de estos efectos secundarios o no

desaparece:

- Sentirse mareado, soñoliento, cansado o débil.
- Diarrea, malestar estomacal o vómitos.
- Enuresis nocturna.
- Temblores.
- Dolor de cabeza.
- Sudoración excesiva.
- Sueños anormales, hablar dormido u otros efectos anormales durante el sueño.
- Problemas para dormir.
- Disminución del apetito.
- Boca seca.

Estos no son todos los efectos secundarios que podrían ocurrir. Si tiene preguntas acerca de los efectos secundarios, llame al médico de su hijo. Llame al médico de su hijo para que le aconseje acerca de los efectos secundarios.

Puede informar los efectos secundarios al organismo de salud de su país.

## **¿Cómo se administra mejor este medicamento?**

Administre este medicamento según las instrucciones del médico de su hijo. Lea toda la información que se le brinde. Siga todas las instrucciones con atención.

- Administre 2 dosis todas las noches.
- Administre este medicamento en ayunas. Administre la primera dosis al menos 2 horas después de comer.
- Debe mezclar este medicamento antes de tomarlo. Siga las instrucciones para mezclarlo exactamente como lo indicó el médico.
- Prepare cada dosis antes de que su hijo se acueste.

- Guarde las dosis preparadas en envases de dosificación a prueba de niños en un lugar seguro.
- Use el medicamento 24 horas después de haberlo mezclado.
- Administre la primera dosis a la hora de dormir luego de que su hijo se haya acostado.
- Haga que su niño se acueste de inmediato y permanezca acostado después de tomar las dosis.
- Deje pasar al menos entre 2.5 y 4 horas entre cada dosis.
- Prepare el reloj despertador para despertarse a la hora de la segunda dosis.
- Si su hijo se despierta antes de la alarma y han pasado al menos 2 horas y media desde su primera dosis, apague la alarma y administre la segunda dosis.

## ¿Qué debo hacer si mi hijo no toma una dosis?

- Si su hijo omite la segunda dosis, sáltese la dosis faltante. No administre otra dosis hasta la noche siguiente.
- No administre 2 dosis simultáneamente ni administre dosis adicionales.

## ¿Cómo almaceno o descarto este medicamento?

- Antes de mezclar, consérvelo en su envase original.
- Almacenar a temperatura ambiente en un lugar seco. No conservar en un baño.
- Guarde este medicamento en un lugar seguro donde los niños no puedan verlo ni alcanzarlo, y donde otras personas no puedan alcanzarlo. Una caja o área cerrada puede ayudar a mantener este medicamento seguro. Mantenga todos los medicamentos fuera del alcance de las mascotas.
- Deseche los medicamentos sin usar o que hayan expirado. No los tire por el retrete ni los vierta al desagüe a menos que así se lo indiquen. Consulte con el farmacéutico si tiene preguntas sobre la mejor manera de desechar medicamentos. Pueden existir programas de devolución de medicamentos

en su área.

## Datos generales sobre el medicamento

- Si los síntomas o trastornos de su hijo no mejoran o si empeoran, llame al médico de su hijo.
- No comparta el medicamento del niño con otras personas ni le de al niño el medicamento de ninguna otra persona.
- Algunos medicamentos pueden tener otro folleto informativo para el paciente. Si tiene alguna pregunta sobre este medicamento, hable con el médico de su hijo, enfermera, farmacéutico u otro proveedor de atención médica.
- Si cree que ha habido una sobredosis, llame al centro de toxicología local o busque atención médica de inmediato. Prepárese para responder qué se ingirió, qué cantidad y cuándo.

## Uso de la información por el consumidor y exención de responsabilidad

Esta información general es un resumen limitado de la información sobre el diagnóstico, el tratamiento y/o la medicación. No pretende ser exhaustivo y debe utilizarse como una herramienta para ayudar al usuario a comprender y/o evaluar las posibles opciones de diagnóstico y tratamiento. NO incluye toda la información sobre las enfermedades, los tratamientos, los medicamentos, los efectos secundarios o los riesgos que pueden aplicarse a un paciente específico. No pretende ser un consejo médico ni un sustituto del consejo médico, el diagnóstico o el tratamiento de un proveedor de atención médica basado en el examen y la evaluación del proveedor de atención médica de las circunstancias específicas y únicas de un paciente. Los pacientes deben hablar con un proveedor de atención médica para obtener información completa sobre su salud, preguntas médicas y opciones de tratamiento, incluidos los riesgos o beneficios relacionados con el uso de medicamentos. Esta información no respalda ningún tratamiento o medicamento como seguro, eficaz o aprobado para tratar a un paciente específico. UpToDate, Inc. y sus afiliados renuncian a cualquier garantía o responsabilidad relacionada con esta

información o con el uso que se haga de esta. El uso de esta información se rige por las Condiciones de uso, disponibles en <https://www.wolterskluwer.com/en/know/clinical-effectiveness-terms>.

## Última fecha de revisión

2025-07-14

## Derechos de autor

© 2026 UpToDate, Inc. y sus licenciantes y/o afiliados. Todos los derechos reservados.

Si tiene preguntas o inquietudes, contáctese con su proveedor de cuidados de la salud. Un integrante de su equipo de atención le responderá de lunes a viernes de 9 a. m. a 5 p. m. Fuera de ese horario, puede dejar un mensaje o hablar con otro proveedor de MSK. Siempre hay un médico o un enfermero de guardia. Si no está seguro de cómo comunicarse con su proveedor de cuidados de la salud, llame al 212-639-2000.

Para obtener más recursos, visite [www.mskcc.org/pe](http://www.mskcc.org/pe) y busque en nuestra biblioteca virtual.

Oxybate Salts (Calcium, Magnesium, Potassium, and Sodium - Last updated on December 12, 2022

Todos los derechos son propiedad y se reservan a favor de Memorial Sloan Kettering Cancer Center



Memorial Sloan Kettering  
Cancer Center