

Peanut Allergen Powder

Esta información de Lexicomp® le explica lo que debe saber sobre este medicamento, por ejemplo, para qué se usa, cómo tomarlo, sus efectos secundarios y cuándo llamar a su proveedor de cuidados de la salud.

Nombres comerciales: EE. UU.

Palforzia

Advertencia

- Se han producido reacciones alérgicas con este medicamento. En pocas ocasiones algunas reacciones pueden ser muy graves o poner en riesgo la vida. Consulte con el médico.
- La primera dosis y todos los aumentos de dosis se administrarán en el consultorio de un médico u otro entorno de atención médica.
- Su médico le brindará otro medicamento (epinefrina) para utilizar en caso de una reacción alérgica. Asegúrese de saber cómo y cuándo administrarlo. Algunos medicamentos pueden reducir el efecto de la epinefrina o pueden aumentar el riesgo de sufrir efectos secundarios. Esto incluye algunos medicamentos administrados para tratar la depresión, los problemas cardíacos, o la presión arterial alta. Existen muchos medicamentos que interactúan con la epinefrina. Consulte con el médico o farmacéutico para asegurarse de que sea seguro administrar epinefrina junto con los demás medicamentos que toma.
- No le administre este medicamento a su hijo si ha tenido asma muy grave o asma que no está controlado.

¿Para qué se utiliza este medicamento?

- Se usa para ayudar con las alergias causadas por el maní. Este medicamento no está aprobado para tratar una reacción alérgica.

¿Qué necesito decirle al médico ANTES de que mi hijo tome este medicamento?

- Si su hijo es alérgico a este medicamento, a algún componente de este medicamento, o a otros medicamentos, alimentos o sustancias. Informe a su médico acerca de esta alergia y qué síntomas ha presentado su hijo.
- Si su hijo alguna vez ha tenido una reacción potencialmente mortal a los cacahuetes (maní).
- Si alguna vez su hijo(a) ha tenido una reacción alérgica grave.
- Si su hijo o hija alguna vez tuvo esofagitis eosinofílica u otra enfermedad eosinofílica estomacal o intestinal.
- Si su hijo tiene problemas cardíacos, pulmonares o trastorno de mastocitos.

Esta no es una lista de todos los medicamentos o trastornos que pueden interactuar con este medicamento.

Informe al médico y al farmacéutico todos los medicamentos que su hijo toma (sean estos recetados o de venta libre, productos naturales o vitaminas) y de los problemas de salud que padece. Debe verificar que sea seguro administrarle a su hijo este medicamento con todos sus otros medicamentos y problemas de salud. No empiece, interrumpa ni modifique la dosis de ningún medicamento que tome su hijo sin consultar antes con el médico.

¿Qué debo saber o hacer mientras mi hijo toma este medicamento?

- Avise a todos los proveedores de atención médica de su hijo que el niño toma este medicamento. Esto incluye a los médicos, enfermeras, farmacéuticos y dentistas del niño.
- El niño debe continuar con el plan de alimentación según las

recomendaciones del proveedor de salud médica.

- Siga evitando que su hijo o hija consuma cacahuates, como le ha indicado el médico.
- El alcohol puede interactuar con este medicamento. Asegúrese de que su hijo no beba alcohol.
- Hable con su médico si su hijo tiene una enfermedad como una infección viral, está ayunando, está muy cansado o ha perdido el sueño, tiene su período menstrual o está tomando un antiinflamatorio no esteroideo (AINE), como ibuprofeno o naproxeno. El riesgo de una reacción alérgica puede aumentar.
- No le dé este medicamento dentro de las 3 horas antes o 3 horas después de que su hijo haga ejercicio o tome una ducha o baño caliente. Si su hijo ha hecho ejercicio o ha tomado una ducha o baño caliente y siente calor, está sudando o tiene respiración acelerada o latidos cardíacos, espere para darle este medicamento hasta que desaparezcan estos signos.
- Si su hijo tiene asma y se vuelve más difícil de controlar o si tiene dificultades para respirar, llame al médico de inmediato.

Si su hija está embarazada o amamantando a un bebé:

- Consulte al médico si su hija está embarazada, queda embarazada o está amamantando a un bebé. Tendrá que hablar acerca de los riesgos y beneficios para su hija y el bebé.

¿Cuáles son los efectos secundarios por los que debo llamar al médico de mi hijo de inmediato?

ADVERTENCIA/PRECAUCIÓN: a pesar de que es muy poco frecuente, algunas personas pueden sufrir efectos secundarios muy graves, y en ocasiones mortales, al tomar un medicamento. Si su hijo presenta alguno de los siguientes signos o síntomas que pueden estar relacionados con un efecto secundario muy grave, infórmelo al médico de su hijo o busque ayuda médica de inmediato:

- Signos de reacción alérgica tales como sarpullido; urticaria; picazón; piel

enrojecida, hinchada, con ampollas o descamada, con o sin fiebre; sibilancia; opresión en el pecho o la garganta; problemas para respirar, tragar o hablar; ronquera inusual; o hinchazón de la boca, el rostro, los labios, la lengua o la garganta.

- Dificultad para tragar o hablar.
- Dolor con inflamación.
- Ardor de estómago.
- Dolor o presión en el pecho, pulso acelerado, o desmayos.
- Mareos.
- Siente mucha pereza o somnolencia.
- Acaloramiento.
- Falta de aire.
- Diarrea intensa.
- Cólicos abdominales.
- Llanto anormal.
- Tirar de las piernas hacia el estómago.

¿Qué otros efectos secundarios tiene este medicamento?

Todos los medicamentos pueden tener efectos secundarios. Sin embargo, muchas personas no padecen ningún efecto secundario o padecen solamente efectos secundarios menores. Llame al médico de su hijo o busque ayuda médica si al niño le molesta alguno de estos efectos secundarios o no desaparece:

- Diarrea, dolor estomacal, malestar estomacal o vómitos.
- Comezón en el oído, la boca o la lengua.
- Entumecimiento u hormigueo en la boca.
- Irritación de la garganta.
- Tos.

- Goteo o congestión nasal.
- Estornudos.

Estos no son todos los efectos secundarios que podrían ocurrir. Si tiene preguntas acerca de los efectos secundarios, llame al médico de su hijo. Llame al médico de su hijo para que le aconseje acerca de los efectos secundarios.

Puede informar los efectos secundarios al organismo de salud de su país.

¿Cómo se administra mejor este medicamento?

Administre este medicamento según las instrucciones del médico de su hijo. Lea toda la información que se le brinde. Siga todas las instrucciones con atención.

- Administre este medicamento con una de las comidas.
- Administre este medicamento aproximadamente a la misma hora del día. Es preferible tomar este medicamento por la noche.
- No permita que su hijo trague la cápsula o inhale el polvo.
- Abra la cápsula o bolsita y vacíe el contenido en unas cucharadas de alimentos blandos como puré de manzana, yogur o pudín. Mezcle bien. No lo mezcle con líquidos.
- Luego de mezclar, administre la dosis a su hijo de inmediato. No almacene para usar posteriormente.
- Siga administrando este medicamento a su hijo según se lo indique el médico u otro proveedor de atención médica, aun si el niño se siente bien.
- Deseche cualquier sobrante luego de aplicar la dosis.
- Lávese las manos después de la aplicación.
- Si su hijo visita a su médico para aumentar la dosis, no le dé a su hijo la dosis ese día.

¿Qué debo hacer si mi hijo no toma una dosis?

- Llame al médico de su hijo para obtener instrucciones.

¿Cómo almaceno o descarto este medicamento?

- Conserve en el refrigerador o a temperatura ambiente.
- No congelar.
- Proteja del calor.
- Conserve en su envase original.
- Guarde los medicamentos en un lugar seguro. Mantenga todo medicamento fuera del alcance de los niños y las mascotas.
- Deseche los medicamentos sin usar o que hayan expirado. No los tire por el retrete ni los vierta al desagüe a menos que así se lo indiquen. Consulte con el farmacéutico si tiene preguntas sobre la mejor manera de desechar medicamentos. Pueden existir programas de devolución de medicamentos en su área.

Datos generales sobre el medicamento

- Si los síntomas o trastornos de su hijo no mejoran o si empeoran, llame al médico de su hijo.
- No comparta el medicamento del niño con otras personas ni le de al niño el medicamento de ninguna otra persona.
- Algunos medicamentos pueden tener otro folleto informativo para el paciente. Si tiene alguna pregunta sobre este medicamento, hable con el médico de su hijo, enfermera, farmacéutico u otro proveedor de atención médica.
- Si cree que ha habido una sobredosis, llame al centro de toxicología local o busque atención médica de inmediato. Prepárese para responder qué se ingirió, qué cantidad y cuándo.

Uso de la información por el consumidor y exención de responsabilidad

Esta información general es un resumen limitado de la información sobre el diagnóstico, el tratamiento y/o la medicación. No pretende ser exhaustivo y debe utilizarse como una herramienta para ayudar al usuario a comprender y/o

evaluar las posibles opciones de diagnóstico y tratamiento. NO incluye toda la información sobre las enfermedades, los tratamientos, los medicamentos, los efectos secundarios o los riesgos que pueden aplicarse a un paciente específico. No pretende ser un consejo médico ni un sustituto del consejo médico, el diagnóstico o el tratamiento de un proveedor de atención médica basado en el examen y la evaluación del proveedor de atención médica de las circunstancias específicas y únicas de un paciente. Los pacientes deben hablar con un proveedor de atención médica para obtener información completa sobre su salud, preguntas médicas y opciones de tratamiento, incluidos los riesgos o beneficios relacionados con el uso de medicamentos. Esta información no respalda ningún tratamiento o medicamento como seguro, eficaz o aprobado para tratar a un paciente específico. UpToDate, Inc. y sus afiliados renuncian a cualquier garantía o responsabilidad relacionada con esta información o con el uso que se haga de esta. El uso de esta información se rige por las Condiciones de uso, disponibles en <https://www.wolterskluwer.com/en/know/clinical-effectiveness-terms>.

Última fecha de revisión

2025-02-21

Derechos de autor

© 2026 UpToDate, Inc. y sus licenciantes y/o afiliados. Todos los derechos reservados.

If you have questions or concerns, contact your healthcare provider. A member of your care team will answer Monday through Friday from 9 a.m. to 5 p.m. Outside those hours, you can leave a message or talk with another MSK provider. There is always a doctor or nurse on call. If you're not sure how to reach your healthcare provider, call 212-639-2000.

Para obtener más recursos, visite www.mskcc.org/pe y busque en nuestra biblioteca virtual.

Peanut Allergen Powder - Last updated on December 12, 2022

Todos los derechos son propiedad y se reservan a favor de Memorial Sloan Kettering Cancer Center



Memorial Sloan Kettering
Cancer Center