

EDUCACIÓN PARA PACIENTES Y CUIDADORES

Pegcetacoplan (Systemic)

Esta información de UpToDate® Lexidrug™ le explica lo que debe saber sobre este medicamento, por ejemplo, para qué se usa, cómo tomarlo, sus efectos secundarios y cuándo llamar a su proveedor de cuidados de la salud.

Nombres comerciales: EE. UU.

Empaveli

Nombres comerciales: Canadá

Empaveli

Advertencia

- Este medicamento aumenta el riesgo de infecciones graves, especialmente meningocócicas, *Haemophilus influenzae* y *Streptococcus pneumoniae*. Se han presentado infecciones potencialmente mortales y mortales en personas tratadas con este tipo de medicamento. Estas infecciones pueden tornarse potencialmente mortales o pueden ser mortales muy rápido si no se tratan a tiempo. Las vacunas pueden ayudar a reducir el riesgo de estas infecciones. Su hijo deberá aplicarse ciertas vacunas como mínimo 2 semanas antes de comenzar el tratamiento con este medicamento, a menos que el médico indique lo contrario. Incluso si su hijo ha recibido estas vacunas anteriormente, es posible que deba recibir otra.
- Las vacunas reducen el riesgo de infecciones, pero no impiden que se produzcan todas las infecciones. Llame inmediatamente al médico si su hijo presenta signos de una infección grave, como fiebre con o sin erupciones cutáneas, escalofríos, latidos rápidos, dolor de pecho, problemas para respirar o tos, dolor de cabeza con malestar estomacal o vómitos, fiebre o rigidez de cuello o espalda, confusión, piel húmeda, dolores corporales con signos gripales, o si le molesta la luz en los ojos.

¿Para qué se utiliza este medicamento?

- Este medicamento se usa para tratar ciertos problemas renales.
- Si su hijo ha estado recibiendo este medicamento por alguna otra razón, consulte con su médico sobre los riesgos y beneficios. Consulte con su médico si tiene preguntas o dudas sobre el hecho de administrarle este medicamento a su hijo.

¿Qué necesito decirle al médico ANTES de que mi hijo tome este medicamento?

- Si su hijo es alérgico a este medicamento, a algún componente de este

medicamento, o a otros medicamentos, alimentos o sustancias. Informe a su médico acerca de esta alergia y qué síntomas ha presentado su hijo.

- Si su hijo no ha recibido una vacuna contra la infección meningocócica o *Streptococcus pneumoniae*.
- Si su hijo tiene una infección meningocócica, por *Haemophilus influenzae* o *Streptococcus pneumoniae*.

Si su hija está amamantando a un bebé:

- Asegúrese de que su hija no amamante a un bebé mientras tome este medicamento y durante 40 días después de la última dosis.

Esta no es una lista de todos los medicamentos o trastornos que pueden interactuar con este medicamento.

Informe al médico y al farmacéutico todos los medicamentos que su hijo toma (sean estos recetados o de venta libre, productos naturales o vitaminas) y de los problemas de salud que padece. Debe verificar que sea seguro administrarle a su hijo este medicamento con todos sus otros medicamentos y problemas de salud. No empiece, interrumpa ni modifique la dosis de ningún medicamento que tome su hijo sin consultar antes con el médico.

¿Qué debo saber o hacer mientras mi hijo toma este medicamento?

- Avise a todos los proveedores de atención médica de su hijo que el niño toma este medicamento. Esto incluye a los médicos, enfermeras, farmacéuticos y dentistas del niño.
- Es posible que el niño tenga mayor riesgo de presentar infecciones. Haga que el niño se lave las manos con frecuencia. Evite las multitudes y a personas con infecciones, resfriados o gripe.
- Asegúrese de tener a mano la tarjeta de seguridad de su hijo en todo momento y durante 2 meses después de la suspensión del medicamento.
- Controle los análisis de sangre de su hijo y otras pruebas de laboratorio según le haya indicado el médico.

- Este medicamento puede afectar ciertas pruebas de laboratorio. Avise a todos los proveedores de atención médica y bioquímicos de su hijo que su hijo toma este medicamento.
- Algunas personas experimentaron efectos secundarios durante la infusión. Informe al médico si su hijo tiene algún efecto secundario durante la infusión.
- Si el peso de su hijo cambia, consulte al médico. Es posible que deba cambiarse la dosis de este medicamento.
- Si su hija está en edad fértil, deberá realizarse una prueba de embarazo antes de comenzar a recibir este medicamento, para asegurarse de que no esté embarazada.

Si su hijo es sexualmente activo o puede serlo:

- Este medicamento puede dañar al feto si su hija lo toma durante el embarazo.
- Asegúrese de que su hija utilice algún método anticonceptivo mientras toma este medicamento y durante algún tiempo después de la última dosis. Pregúntele al médico por cuánto tiempo su hija debe usar métodos anticonceptivos. Si su hija queda embarazada, llame al médico de inmediato.

On-Body inyector corporal:

- Si su hijo es alérgico al acrílico, consulte al médico.

¿Cuáles son los efectos secundarios por los que debo llamar al médico de mi hijo de inmediato?

ADVERTENCIA/PRECAUCIÓN: a pesar de que es muy poco frecuente, algunas personas pueden sufrir efectos secundarios muy graves, y en ocasiones mortales, al tomar un medicamento. Si su hijo presenta alguno de los siguientes signos o síntomas que pueden estar relacionados con un efecto secundario muy grave, infórmelo al médico de su hijo o busque ayuda médica de inmediato:

- Signos de reacción alérgica tales como sarpullido; urticaria; picazón; piel enrojecida, hinchada, con ampollas o descamada, con o sin fiebre; sibilancia; opresión en el pecho o la garganta; problemas para respirar, tragar o hablar; ronquera inusual; o hinchazón de la boca, el rostro, los labios, la lengua o la garganta.
- Los signos de infección incluyen fiebre, escalofríos, dolor de garganta muy grave, dolor de oídos o senos paranasales, tos, aumento del esputo o cambio en el color del esputo, dolor para orinar, aftas o herida que no cicatriza.
- Síntomas de niveles bajos de potasio tales como dolor o debilidad en los músculos, calambres musculares o pulso que no se siente normal.
- Signos de alta presión como dolores de cabeza o mareos muy graves, desmayos o cambios en la visión.
- Dolor o presión en el pecho, o pulso acelerado.
- Mareos o desmayos.
- Náusea o vómito.
- Hinchazón del abdomen.
- Confusión.
- Ansiedad.
- Signos de un resfrío común.
- Hematoma o hemorragia sin motivo aparente.
- Algunos problemas de salud pueden tener lugar después de suspender el uso de este medicamento. Su hijo deberá ser observado de cerca al menos durante 2 meses luego de suspender este medicamento. Después de suspender este medicamento, llame al médico de inmediato si su hijo presenta orina oscura; hinchazón, calor o dolor en la pierna o el brazo; dolor o presión en el pecho; tos con sangre; dificultad para respirar o tragar; o dolor de estómago. Llame al médico de inmediato si su hijo se siente confundido, está muy cansado o débil, o si tiene debilidad en un lado del cuerpo, dificultad para hablar o pensar, cambios en el equilibrio, caída en un lado de la cara o cambios en la visión. Llame al médico de inmediato si su

hijo es sexualmente activo y no puede tener o mantener una erección.

¿Qué otros efectos secundarios tiene este medicamento?

Todos los medicamentos pueden tener efectos secundarios. Sin embargo, muchas personas no padecen ningún efecto secundario o padecen solamente efectos secundarios menores. Llame al médico de su hijo o busque ayuda médica si al niño le molesta alguno de estos efectos secundarios o no desaparece:

- Irritación en la zona en que se utilizó el medicamento.
- Dolor estomacal o diarrea.
- Se siente cansado o débil.
- Dolor de cabeza.
- Dolor de espalda, muscular, de articulaciones, de brazos o piernas.

Estos no son todos los efectos secundarios que podrían ocurrir. Si tiene preguntas acerca de los efectos secundarios, llame al médico de su hijo. Llame al médico de su hijo para que le aconseje acerca de los efectos secundarios.

Puede informar los efectos secundarios al organismo de salud de su país.

¿Cómo se administra mejor este medicamento?

Administre este medicamento según las instrucciones del médico de su hijo. Lea toda la información que se le brinde. Siga todas las instrucciones con atención.

- Este medicamento se administra como una infusión bajo la piel por un periodo de tiempo.
- Puede administrarse mediante una bomba o un inyector corporal.
- Si usted administrará la infusión a su hijo/a, el médico o el personal de enfermería le enseñarán a prepararla y a administrársela.
- Lávese las manos antes y después de usar.
- Antes de usar este medicamento, retírelo del refrigerador y déjelo a

temperatura ambiente durante 30 minutos.

- No lo caliente ni lo coloque en el microondas.
- No utilizar si la solución se ve turbia, pierde o contiene partículas.
- Este medicamento tiene un aspecto entre incoloro y amarillento. No administre si la solución cambia de color.
- Cambie el lugar donde aplica este medicamento según lo indicado por el médico.
- No aplique sobre la piel irritada, sensible, enrojecida, con escamas, dura, o con hematomas, cicatrices o estrías.
- No aplique sobre la piel con tatuaje.
- Deseche cualquier sobrante luego de aplicar la dosis.
- Deseche las agujas en la caja para agujas y objetos cortantes. No vuelva a utilizar agujas ni otros suministros. Cuando la caja esté llena, siga todos los procedimientos locales para desecharla. Si tiene preguntas, consulte al médico o farmacéutico.

Bomba de infusión:

- Si para su hijo necesita más de un lugar de infusión para administrar la dosis, asegúrese de que los lugares de infusión estén separados por al menos 8 cm (3 pulgadas).

On-Body inyector corporal:

- No utilice el inyector si se cayó o está dañado.
- No lo administre en la piel que esté en un radio de 1 pulgada (2.5 cm) del ombligo.
- No deje que la ropa de su hijo toque la piel limpia antes de ponerle el inyector en el abdomen.
- No coloque el inyector corporal donde un cinturón, una pretina u otro tipo de ropa puedan rozarlo o sacarlo de la piel.
- No toque la parte blanca pegajosa de la parte inferior del inyector antes de

colocar este medicamento en el estómago. No utilice ningún objeto para sujetar el inyector.

- No permita que su hijo se bañe, duche ni nade después de colocarse el inyector. Asegúrese de que no se moje el abdomen de su hijo. El agua o el sudor pueden hacer que el inyector se suelte.
- No permita que su hijo se duerma mientras lleva puesto el inyector. No permita que su hijo haga actividad física intensa o ejercicio mientras lo lleva puesto. Asegúrese de que su hijo no golpee el inyector.

¿Qué debo hacer si mi hijo no toma una dosis?

- Administre la dosis que olvidó tan pronto como lo recuerde y retome el horario habitual de toma de su hijo.
- No administre 2 dosis simultáneamente ni administre dosis adicionales.

¿Cómo almaceno o descarto este medicamento?

- Conserve en el refrigerador. No congelar.
- Conserve en el envase de cartón exterior para protegerlo de la luz.
- Guarde los medicamentos en un lugar seguro. Mantenga todo medicamento fuera del alcance de los niños y las mascotas.
- Deseche los medicamentos sin usar o que hayan expirado. No los tire por el retrete ni los vierta al desagüe a menos que así se lo indiquen. Consulte con el farmacéutico si tiene preguntas sobre la mejor manera de desechar medicamentos. Pueden existir programas de devolución de medicamentos en su área.

Datos generales sobre el medicamento

- Si los síntomas o trastornos de su hijo no mejoran o si empeoran, llame al médico de su hijo.
- No comparta el medicamento del niño con otras personas ni le de al niño el medicamento de ninguna otra persona.

- Algunos medicamentos pueden tener otro folleto informativo para el paciente. Si tiene alguna pregunta sobre este medicamento, hable con el médico de su hijo, enfermera, farmacéutico u otro proveedor de atención médica.
- Si cree que ha habido una sobredosis, llame al centro de toxicología local o busque atención médica de inmediato. Prepárese para responder qué se ingirió, qué cantidad y cuándo.

Uso de la información por el consumidor y exención de responsabilidad

Esta información general es un resumen limitado de la información sobre el diagnóstico, el tratamiento y/o la medicación. No pretende ser exhaustivo y debe utilizarse como una herramienta para ayudar al usuario a comprender y/o evaluar las posibles opciones de diagnóstico y tratamiento. NO incluye toda la información sobre las enfermedades, los tratamientos, los medicamentos, los efectos secundarios o los riesgos que pueden aplicarse a un paciente específico. No pretende ser un consejo médico ni un sustituto del consejo médico, el diagnóstico o el tratamiento de un proveedor de atención médica basado en el examen y la evaluación del proveedor de atención médica de las circunstancias específicas y únicas de un paciente. Los pacientes deben hablar con un proveedor de atención médica para obtener información completa sobre su salud, preguntas médicas y opciones de tratamiento, incluidos los riesgos o beneficios relacionados con el uso de medicamentos. Esta información no respalda ningún tratamiento o medicamento como seguro, eficaz o aprobado para tratar a un paciente específico. UpToDate, Inc. y sus afiliados renuncian a cualquier garantía o responsabilidad relacionada con esta información o con el uso que se haga de esta. El uso de esta información se rige por las Condiciones de uso, disponibles en

<https://www.wolterskluwer.com/en/know/clinical-effectiveness-terms>.

Última fecha de revisión

2025-08-05

Derechos de autor

© 2026 UpToDate, Inc. y sus licenciantes y/o afiliados. Todos los derechos reservados.

Si tiene preguntas o inquietudes, contáctese con su proveedor de cuidados de la salud. Un integrante de su equipo de atención le responderá de lunes a viernes de 9 a. m. a 5 p. m. Fuera de ese horario, puede dejar un mensaje o hablar con otro proveedor de MSK. Siempre hay un médico o un enfermero de guardia. Si no está seguro de cómo comunicarse con su proveedor de cuidados de la salud, llame al 212-639-2000.

Para obtener más recursos, visite www.mskcc.org/pe y busque en nuestra biblioteca virtual.

Pegcetacoplan (Systemic - Last updated on August 8, 2025

Todos los derechos son propiedad y se reservan a favor de Memorial Sloan Kettering Cancer Center

Última actualización

Agosto 8, 2025

Learn about our [Health Information Policy](#).



Memorial Sloan Kettering
Cancer Center