

EDUCACIÓN PARA PACIENTES Y CUIDADORES

Pegvaliase

Esta información de UpToDate® Lexidrug™ le explica lo que debe saber sobre este medicamento, por ejemplo, para qué se usa, cómo tomarlo, sus efectos secundarios y cuándo llamar a su proveedor de cuidados de la salud.

Nombres comerciales: EE. UU.

Palynziq

Nombres comerciales: Canadá

Palynziq

Advertencia

- Se pueden producir reacciones alérgicas en cualquier momento durante el tratamiento con este medicamento. En algunos casos, han puesto en riesgo la vida. Algunas reacciones se produjeron hasta 4 años después del inicio del tratamiento. Los casos se observaron en la hora siguiente a la inyección, pero también se han dado hasta 48 horas después de la dosis. Un profesional de la salud vigilará de cerca a su hijo durante al menos 60

minutos después de la primera dosis. Si es necesario, es posible que un profesional de la salud controle de cerca a su hijo para otras dosis también.

- Obtenga ayuda médica de inmediato si su hijo tiene dolor en el pecho, mareos o desmayos, latidos rápidos del corazón, sofoco, incapacidad para controlar la orina o las heces, erupción, picazón o protuberancias en la piel, hinchazón de la cara, labios, ojos o lengua, opresión en el pecho o la garganta, dificultad para respirar o sibilancias, fuerte malestar estomacal, vómitos o diarrea, o cualquier otro efecto adverso.
- El médico de su hijo le administrará otro medicamento (epinefrina) para utilizar en caso de una reacción alérgica. Manténgalo con su hijo en todo momento mientras toma este medicamento. Asegúrese de que usted y su hijo sepan cómo y cuándo usarlo. Busque ayuda médica para su hijo de inmediato después de utilizar epinefrina.
- El médico puede indicarle que haya un adulto cerca en caso de que su hijo presente una reacción alérgica. Asegúrese de que esa persona observe a su hijo atentamente cuando tome la dosis y durante al menos 60 minutos después. Asegúrese de que sepa dónde se almacena la epinefrina y cómo

administrarla en caso de una reacción alérgica.

- El médico le enseñará cómo administrar este medicamento a su hijo. Asegúrese de saber cuánto debe administrarle, con qué frecuencia y cómo debe almacenar este medicamento. Si el médico no le informa cómo administrarle este medicamento o si no está seguro de cómo hacerlo, consulte al médico.

¿Para qué se utiliza este medicamento?

- Este medicamento se utiliza para tratar la fenilketonuria (PKU).

¿Qué necesito decirle al médico ANTES de que mi hijo tome este medicamento?

- Si su hijo es alérgico a este medicamento, a algún componente de este medicamento, o a otros medicamentos, alimentos o sustancias. Informe a su médico acerca de esta alergia y qué síntomas ha presentado su hijo.

Este medicamento puede interactuar con otros medicamentos o trastornos.

Informe al médico y al farmacéutico todos los medicamentos que su hijo toma (sean estos recetados o de venta libre, productos naturales o vitaminas) y de los

problemas de salud que padece. Debe verificar que sea seguro administrarle a su hijo este medicamento con todos sus otros medicamentos y problemas de salud. No empiece, interrumpa ni modifique la dosis de ningún medicamento que tome su hijo sin consultar antes con el médico.

¿Qué debo saber o hacer mientras mi hijo toma este medicamento?

- Avise a todos los proveedores de atención médica de su hijo que el niño toma este medicamento. Esto incluye a los médicos, enfermeras, farmacéuticos y dentistas del niño.
- El niño debe evitar las tareas o las acciones que requieren un estado de alerta hasta que usted observe cómo este medicamento afecta a su hijo. Estas son actividades como andar en bicicleta, practicar deportes o usar elementos como tijeras, podadoras de césped, motocicletas eléctricas, automóviles de juguete o vehículos motorizados.
- Asegúrese de que su hijo siempre lleve la tarjeta de seguridad de paciente.
- Controle la función sanguínea según le indique el médico. Consulte al médico.
- El niño debe continuar con el plan de alimentación

según las recomendaciones del proveedor de salud médica.

- Las reacciones cutáneas que se extienden sobre la piel son comunes con este medicamento y han durado al menos 14 días. Estas reacciones han incluido picazón, sarpullido y enrojecimiento. Las reacciones cutáneas también pueden ser un signo de una reacción alérgica. Consulte al médico sobre cuáles son las reacciones cutáneas por las que debe llamar de inmediato.

Si su hija está embarazada o amamantando a un bebé:

- Este medicamento puede dañar al feto si su hija lo toma durante el embarazo.
- Si su hija queda embarazada mientras consume este medicamento o en el plazo de 1 mes después de la última dosis, consulte al médico de inmediato.
- Informe al médico si está amamantando a su hijo. Deberá hablar acerca de los riesgos para el bebé.

¿Cuáles son los efectos secundarios por los que debo llamar al médico de mi hijo de inmediato?

ADVERTENCIA/PRECAUCIÓN: a pesar de que es muy poco frecuente, algunas personas pueden sufrir efectos secundarios muy graves, y en ocasiones mortales, al tomar un medicamento. Si su hijo presenta alguno de los siguientes signos o síntomas que pueden estar

relacionados con un efecto secundario muy grave, infórmelo al médico de su hijo o busque ayuda médica de inmediato:

- Signos de reacción alérgica tales como sarpullido; urticaria; picazón; piel enrojecida, hinchada, con ampollas o descamada, con o sin fiebre; sibilancia; opresión en el pecho o la garganta; problemas para respirar, tragar o hablar; ronquera inusual; o hinchazón de la boca, el rostro, los labios, la lengua o la garganta.
- Se han presentado infecciones en el lugar en el que se administró este medicamento. A veces, estas infecciones fueron graves. Algunas necesitaron tratamiento en el hospital, incluida una cirugía. Llame al médico de inmediato si su hijo tiene ampollas, escaras, heridas abiertas o signos de infección en el lugar donde se administró este medicamento, como enrojecimiento que no desaparece, supuración, calor, hinchazón o sensibilidad.

¿Qué otros efectos secundarios tiene este medicamento?

Todos los medicamentos pueden tener efectos secundarios. Sin embargo, muchas personas no padecen ningún efecto secundario o padecen solamente efectos secundarios menores. Llame al médico de su hijo o busque ayuda médica si al niño le molesta alguno de estos efectos

secundarios o no desaparece:

- Irritación en la zona en la que se aplicó la inyección.
- Dolor de espalda, muscular, de articulaciones, de brazos o piernas.
- Dolor de cabeza.
- Diarrea, dolor estomacal, malestar estomacal o vómitos.
- Dolor en la boca.
- Dolor de garganta.
- Tos.
- Se siente cansado o débil.
- Ansiedad.
- Pérdida del pelo.
- Nariz tapada.

Estos no son todos los efectos secundarios que podrían ocurrir. Si tiene preguntas acerca de los efectos secundarios, llame al médico de su hijo. Llame al médico de su hijo para que le aconseje acerca de los efectos secundarios.

Puede informar los efectos secundarios al organismo de salud de su país.

¿Cómo se administra mejor este medicamento?

Administre este medicamento según las instrucciones del médico de su hijo. Lea toda la información que se le brinde. Siga todas las instrucciones con atención.

- Se administra por inyección en la parte grasa de la piel de la parte superior del brazo, muslo, glúteos o el área del estómago.
- Se pueden administrar otros medicamentos antes de este para evitar los efectos secundarios.
- No lo administre en la piel que esté en un radio de 5 cm (2 pulgadas) del ombligo.
- Si inyectará a su hijo, el médico de su hijo o la enfermera le indicarán cómo aplicar la inyección.
- Lávese las manos antes y después de usar.
- Si se almacena en un refrigerador, deje que este medicamento alcance la temperatura ambiente antes de administrarlo. Deje reposar este medicamento a temperatura ambiente durante al menos 30 minutos. No caliente este medicamento.
- No aplicar en un lunar, cicatriz, marca de nacimiento o sarpullido. No aplique sobre la piel enrojecida, tatuada, irritada, quemada, sensible, magullada, dura o dañada.
- No lo administre en una zona infectada de la piel.
- No agitar.

- No utilizar si la solución se ve turbia, pierde o contiene partículas.
- Este medicamento tiene un aspecto entre incoloro y amarillento. No administre si la solución cambia de color.
- Cambie el lugar donde pone la inyección cada vez.
- Si la dosis de su hijo es más de 1 inyección, puede administrarla en la misma parte del cuerpo. Sin embargo, aplique las inyecciones al menos a 5 cm (2 pulgadas) de distancia.
- Deseche las agujas en la caja para agujas y objetos cortantes. No vuelva a utilizar agujas ni otros suministros. Cuando la caja esté llena, siga todos los procedimientos locales para desecharla. Si tiene preguntas, consulte al médico o farmacéutico.

¿Qué debo hacer si mi hijo no toma una dosis?

- Sátese la dosis faltante y continúe con el horario habitual de su hijo.
- No administre 2 dosis simultáneamente ni administre dosis adicionales.

¿Cómo almaceno o descarto este medicamento?

- Conserve en el refrigerador. No congelar.

- Conservar en el envase original para proteger de la luz.
- Si es necesario, puede almacenarlo a temperatura ambiente.
- Si se almacena a temperatura ambiente, deseche los medicamentos que no se utilizaron luego de 30 días o luego de la fecha de vencimiento, lo que ocurra primero.
- No coloque este medicamento nuevamente en el refrigerador después de haberlo conservado a temperatura ambiente.
- Guarde los medicamentos en un lugar seguro. Mantenga todo medicamento fuera del alcance de los niños y las mascotas.
- Deseche los medicamentos sin usar o que hayan expirado. No los tire por el retrete ni los vierta al desagüe a menos que así se lo indiquen. Consulte con el farmacéutico si tiene preguntas sobre la mejor manera de desechar medicamentos. Pueden existir programas de devolución de medicamentos en su área.

Datos generales sobre el medicamento

- Si los síntomas o trastornos de su hijo no mejoran o si empeoran, llame al médico de su hijo.
- No comparta el medicamento del niño con otras personas ni le de al niño el medicamento de ninguna

otra persona.

- Algunos medicamentos pueden tener otro folleto informativo para el paciente. Si tiene alguna pregunta sobre este medicamento, hable con el médico de su hijo, enfermera, farmacéutico u otro proveedor de atención médica.
- Si cree que ha habido una sobredosis, llame al centro de toxicología local o busque atención médica de inmediato. Prepárese para responder qué se ingirió, qué cantidad y cuándo.

Uso de la información por el consumidor y exención de responsabilidad

Esta información general es un resumen limitado de la información sobre el diagnóstico, el tratamiento y/o la medicación. No pretende ser exhaustivo y debe utilizarse como una herramienta para ayudar al usuario a comprender y/o evaluar las posibles opciones de diagnóstico y tratamiento. NO incluye toda la información sobre las enfermedades, los tratamientos, los medicamentos, los efectos secundarios o los riesgos que pueden aplicarse a un paciente específico. No pretende ser un consejo médico ni un sustituto del consejo médico, el diagnóstico o el tratamiento de un proveedor de atención médica basado en el examen y la evaluación del proveedor de atención médica de las circunstancias

específicas y únicas de un paciente. Los pacientes deben hablar con un proveedor de atención médica para obtener información completa sobre su salud, preguntas médicas y opciones de tratamiento, incluidos los riesgos o beneficios relacionados con el uso de medicamentos. Esta información no respalda ningún tratamiento o medicamento como seguro, eficaz o aprobado para tratar a un paciente específico. UpToDate, Inc. y sus afiliados renuncian a cualquier garantía o responsabilidad relacionada con esta información o con el uso que se haga de esta. El uso de esta información se rige por las Condiciones de uso, disponibles en <https://www.woltersklower.com/en/know/clinical-effectiveness-terms>.

Última fecha de revisión

2026-03-18

Derechos de autor

© 2026 UpToDate, Inc. y sus licenciantes y/o afiliados.
Todos los derechos reservados.

Si tiene preguntas o inquietudes, contáctese con su proveedor de cuidados de la salud. Un integrante de su equipo de atención le responderá de lunes a viernes de 9 a. m. a 5 p. m. Fuera de ese horario, puede dejar un mensaje o hablar con otro proveedor de MSK. Siempre hay un médico o un enfermero de guardia. Si no está seguro de cómo comunicarse con su proveedor de cuidados de la salud, llame al 212-639-2000.

Para obtener más recursos, visite www.mskcc.org/pe y busque en nuestra biblioteca virtual.

Pegvaliase - Last updated on March 20, 2026

Todos los derechos son propiedad y se reservan a favor de Memorial Sloan Kettering Cancer Center



Memorial Sloan Kettering
Cancer Center