

# Posaconazole

Esta información de Lexicomp® le explica lo que debe saber sobre este medicamento, por ejemplo, para qué se usa, cómo tomarlo, sus efectos secundarios y cuándo llamar a su proveedor de cuidados de la salud.

## Nombres comerciales: EE. UU.

Noxafil

## Nombres comerciales: Canadá

GLN-Posaconazole; JAMP-Posaconazole; MINT-Posaconazole; Posanol; Sandoz Posaconazole; TARO-Posaconazole

## ¿Para qué se utiliza este medicamento?

- Este medicamento se utiliza para tratar infecciones fúngicas.
- Este medicamento se utiliza para prevenir infecciones fúngicas.

## ¿Qué necesito decirle al médico ANTES de que mi hijo tome este medicamento?

### Todas las presentaciones:

- Si su hijo es alérgico a este medicamento, a algún componente de este medicamento, o a otros medicamentos, alimentos o sustancias. Informe a su médico acerca de esta alergia y qué síntomas ha presentado su hijo.
- Si el niño tiene enfermedad renal.
- Si el niño tiene alguno de los trastornos siguientes: niveles bajos de calcio, magnesio o potasio.
- Si su hijo toma cualquier medicamento (ya sea uno recetado o de venta

libre, productos naturales o vitaminas) que no deba tomarse junto con este medicamento, entre otros, ciertos medicamentos que se usan para el colesterol alto, infecciones, migrañas, problemas de estado de ánimo. Hay muchos medicamentos que no se deben tomar con este.

## **Polvo para suspensión oral de liberación retardada:**

- Si el cuerpo del niño no puede descomponer la fructosa.
- Si su hijo pesa más de 88 libras (40 kilogramos).

Esta no es una lista de todos los medicamentos o trastornos que pueden interactuar con este medicamento.

Informe al médico y al farmacéutico todos los medicamentos que su hijo toma (sean estos recetados o de venta libre, productos naturales o vitaminas) y de los problemas de salud que padece. Debe verificar que sea seguro administrarle a su hijo este medicamento con todos sus otros medicamentos y problemas de salud. No empiece, interrumpa ni modifique la dosis de ningún medicamento que tome su hijo sin consultar antes con el médico.

## **¿Qué debo saber o hacer mientras mi hijo toma este medicamento?**

### **Todas las presentaciones:**

- Avise a todos los proveedores de atención médica de su hijo que el niño toma este medicamento. Esto incluye a los médicos, enfermeras, farmacéuticos y dentistas del niño.
- Solicite que le hagan análisis de sangre y de presión arterial según se lo haya indicado el médico.
- No se lo administre a su hijo durante más tiempo que el indicado ni utilice una dosis mayor. Es posible que haya una segunda infección.
- Si su hijo toma vinblastina, vincristina o vinorelbina, consulte con el médico de su hijo. Se presentaron problemas nerviosos muy graves como convulsiones; ardor, entumecimiento y hormigueo; y un tipo de obstrucción intestinal cuando este medicamento se administró junto con vincristina.

## **Si su hija está embarazada o amamantando a un bebé:**

- Este medicamento puede dañar al feto si su hija lo toma durante el embarazo. Si su hija está embarazada o queda embarazada mientras toma este medicamento, llame al médico de inmediato.
- Informe al médico si está amamantando a su hijo. Deberá hablar acerca de los riesgos para el bebé.

## **Todos los productos orales:**

- Si su hijo tiene vómitos o diarrea, es posible que este medicamento no actúe como debería. Consulte con el médico de su hijo.

## **Líquido (suspensión):**

- Si su niño es diabético, deberá vigilar cuidadosamente su nivel de azúcar en sangre.

## **Polvo para suspensión oral de liberación retardada:**

- El alcohol puede interactuar con este medicamento. Asegúrese de que su hijo no beba alcohol.

## **¿Cuáles son los efectos secundarios por los que debo llamar al médico de mi hijo de inmediato?**

**ADVERTENCIA/PRECAUCIÓN:** a pesar de que es muy poco frecuente, algunas personas pueden sufrir efectos secundarios muy graves, y en ocasiones mortales, al tomar un medicamento. Si su hijo presenta alguno de los siguientes signos o síntomas que pueden estar relacionados con un efecto secundario muy grave, infórmelo al médico de su hijo o busque ayuda médica de inmediato:

## **Todas las presentaciones:**

- Signos de reacción alérgica tales como sarpullido; urticaria; picazón; piel enrojecida, hinchada, con ampollas o descamada, con o sin fiebre; sibilancia; opresión en el pecho o la garganta; problemas para respirar, tragar o hablar;

ronquera inusual; o hinchazón de la boca, el rostro, los labios, la lengua o la garganta.

- Signos de problemas electrolíticos como cambios de humor; confusión; dolor muscular, calambres o espasmos; debilidad; temblores; cambios en el equilibrio; latidos cardíacos anormales; convulsiones; pérdida del apetito; o malestar estomacal severo o vómitos.
- Signos de presión arterial alta o baja como dolores de cabeza o mareos muy graves, desmayos o cambios en la visión.
- Falta de aire.
- Hinchazón en los brazos o las piernas.
- Fiebre, escalofríos o dolor de garganta, cualquier hematoma o hemorragia inexplicable, o sensación de cansancio o debilidad.
- Hemorragia nasal.
- Hemorragia vaginal que no es normal.
- Se observó un tipo de latido cardíaco anormal (intervalo QT prolongado) con la administración de este medicamento. A veces, esto ha provocado otro tipo de latido cardíaco anormal peligroso (torsades de pointes). Llame al médico de su hijo de inmediato si el niño presenta latidos cardíacos acelerados o anormales, o si se desmaya.
- Este medicamento ha provocado problemas hepáticos. A veces, los problemas hepáticos han sido mortales en personas con problemas de salud graves. Llame al médico de inmediato si su hijo presenta signos de problemas hepáticos, como orina color oscuro, cansancio, disminución del apetito, malestar estomacal o dolor estomacal, heces color claro, vómitos, o piel u ojos amarillentos.

### **Todos los productos orales:**

- Irritación bucal o úlceras bucales.

### **Líquido (suspensión):**

- Síntomas de altos niveles de azúcar en la sangre, tales como confusión,

somnolencia, sed o hambre inusuales, orina más frecuente, acaloramiento, respiración acelerada o aliento con olor a fruta.

## ¿Qué otros efectos secundarios tiene este medicamento?

Todos los medicamentos pueden tener efectos secundarios. Sin embargo, muchas personas no padecen ningún efecto secundario o padecen solamente efectos secundarios menores. Llame al médico de su hijo o busque ayuda médica si al niño le molesta alguno de estos efectos secundarios o no desaparece:

### Todas las presentaciones:

- Dolor de cabeza.
- Se siente cansado o débil.
- Estreñimiento, diarrea, dolor estomacal, malestar estomacal, vómitos o disminución del apetito.
- Tos.

### Líquido (suspensión):

- Mareos.
- Dolor en las articulaciones.
- Dolor de espalda.
- Problemas para dormir.

Estos no son todos los efectos secundarios que podrían ocurrir. Si tiene preguntas acerca de los efectos secundarios, llame al médico de su hijo. Llame al médico de su hijo para que le aconseje acerca de los efectos secundarios.

Puede informar los efectos secundarios al organismo de salud de su país.

## ¿Cómo se administra mejor este medicamento?

Administre este medicamento según las instrucciones del médico de su hijo. Lea toda la información que se le brinde. Siga todas las instrucciones con atención.

## **Líquido (suspensión):**

- Administre este medicamento con una comida completa.
- Si su hijo no puede terminar una comida completa, administre este medicamento con un suplemento nutricional líquido o con una bebida carbonatada ácida como la cerveza de jengibre. Si su hijo no puede tomar estas bebidas, consulte con el médico de su hijo.
- Agite bien antes de usar.
- Mida cuidadosamente las dosis del líquido. Utilice el medidor que viene con el medicamento.
- Siga administrando este medicamento a su hijo según se lo indique el médico u otro proveedor de atención médica, aun si el niño se siente bien.

## **Tabletas de liberación retardada:**

- Administre este medicamento con o sin alimentos.
- El niño debe tragarla entera. Anime al niño a no masticar, romper o triturarla.
- Si el niño tiene problemas al tragar, hable con un proveedor de salud médica.
- Siga administrando este medicamento a su hijo según se lo indique el médico u otro proveedor de atención médica, aun si el niño se siente bien.

## **Polvo para suspensión oral de liberación retardada:**

- Administre este medicamento con alimentos.
- No abra el paquete hasta que esté listo para administrar este medicamento. Este medicamento viene en un kit con jeringas con muesca especiales para preparar y administrar la dosis a su hijo o hija. Asegúrese de saber cómo mezclar y administrar este medicamento. Consulte con el médico o farmacéutico si no está seguro.
- Agite el polvo hasta el fondo del paquete. Coloque el contenido de un paquete en el vaso para la mezcla que viene con el medicamento. Agite bien

el líquido de mezcla y añada 9 ml de líquido de mezcla al vaso. No lo mezcle con ningún otro tipo de líquido (como agua, jugo o leche). Agite bien durante 45 segundos. Asegúrese de que el polvo esté bien mezclado. Se debe ver turbio y sin grumos.

- Use dentro de 1 hora después de la mezcla.
- Este medicamento puede venir con más de una jeringa dosificadora con muesca en el kit. Asegúrese de saber qué jeringa usar para la dosis de su hijo o hija.
- Mida cuidadosamente las dosis del líquido.
- Mida cuidadosamente la dosis de su hijo o hija en la jeringa dosificadora con muesca que viene con este medicamento. No utilice otra jeringa. Este medicamento puede aglutinarse y es posible que su hijo o hija no reciba la dosis completa. Deseche cualquier resto de la mezcla que quede después de administrar la dosis.
- Una vez administradas todas las dosis, deseche el líquido de mezcla sobrante.
- Si el peso de su hijo cambia, consulte al médico. Es posible que deba cambiarse la dosis de este medicamento.
- Pregunte al médico qué hacer en caso de que el niño no pueda tomar la dosis completa. Pregunte a su médico qué hacer si el niño vomita después de tomar este medicamento.

## Inyección:

- Este medicamento se administra como una infusión en una vena por un periodo de tiempo.

## ¿Qué debo hacer si mi hijo no toma una dosis?

### Líquido (suspensión):

- Administre la dosis que olvidó lo antes posible.
- Si ya casi es hora de la dosis siguiente, sáltese la dosis faltante y continúe con el horario habitual del niño.

- No administre 2 dosis simultáneamente ni administre dosis adicionales.

## **Comprimidos de liberación retardada y polvo para suspensión oral de liberación retardada:**

- Administre la dosis que olvidó lo antes posible.
- Si faltan menos de 12 horas para que su hijo tome la próxima dosis, saltee la dosis faltante y continúe con el horario habitual.
- No administre 2 dosis simultáneamente ni administre dosis adicionales.

### **Inyección:**

- Llame al médico de su hijo para obtener instrucciones.

## **¿Cómo almaceno o descarto este medicamento?**

### **Todos los productos orales:**

- Almacenar a temperatura ambiente en un lugar seco. No conservar en un baño.

### **Líquido (suspensión):**

- No congelar.

### **Polvo para suspensión oral de liberación retardada:**

- Guárdelo en la bolsa protectora de aluminio hasta que esté listo para usarlo.
- Guarde el líquido de mezcla a temperatura ambiente.

### **Inyección:**

- Si debe almacenar este medicamento en su hogar, hable con el médico de su hijo, la enfermera o el farmacéutico sobre las condiciones de almacenamiento.

### **Todas las presentaciones:**

- Guarde los medicamentos en un lugar seguro. Mantenga todo medicamento

fueras del alcance de los niños y las mascotas.

- Deseche los medicamentos sin usar o que hayan expirado. No los tire por el retrete ni los vierta al desagüe a menos que así se lo indiquen. Consulte con el farmacéutico si tiene preguntas sobre la mejor manera de desechar medicamentos. Pueden existir programas de devolución de medicamentos en su área.

## Datos generales sobre el medicamento

- Si los síntomas o trastornos de su hijo no mejoran o si empeoran, llame al médico de su hijo.
- No comparta el medicamento del niño con otras personas ni le de al niño el medicamento de ninguna otra persona.
- Algunos medicamentos pueden tener otro folleto informativo para el paciente. Si tiene alguna pregunta sobre este medicamento, hable con su médico, enfermera, farmacéutico u otro proveedor de atención médica.
- Si cree que ha habido una sobredosis, llame al centro de toxicología local o busque atención médica de inmediato. Prepárese para responder qué se ingirió, qué cantidad y cuándo.

## Uso de la información por el consumidor y exención de responsabilidad

Esta información general es un resumen limitado de la información sobre el diagnóstico, el tratamiento y/o la medicación. No pretende ser exhaustivo y debe utilizarse como una herramienta para ayudar al usuario a comprender y/o evaluar las posibles opciones de diagnóstico y tratamiento. NO incluye toda la información sobre las enfermedades, los tratamientos, los medicamentos, los efectos secundarios o los riesgos que pueden aplicarse a un paciente específico. No pretende ser un consejo médico ni un sustituto del consejo médico, el diagnóstico o el tratamiento de un proveedor de atención médica basado en el examen y la evaluación del proveedor de atención médica de las circunstancias específicas y únicas de un paciente. Los pacientes deben hablar con un proveedor de atención médica para obtener información completa sobre su salud, preguntas médicas y opciones de tratamiento, incluidos los

riesgos o beneficios relacionados con el uso de medicamentos. Esta información no respalda ningún tratamiento o medicamento como seguro, eficaz o aprobado para tratar a un paciente específico. UpToDate, Inc. y sus afiliados renuncian a cualquier garantía o responsabilidad relacionada con esta información o con el uso que se haga de esta. El uso de esta información se rige por las Condiciones de uso, disponibles en <https://www.wolterskluwer.com/en/know/clinical-effectiveness-terms>.

## Última fecha de revisión

2024-11-20

## Derechos de autor

© 2026 UpToDate, Inc. y sus licenciantes y/o afiliados. Todos los derechos reservados.

If you have questions or concerns, contact your healthcare provider. A member of your care team will answer Monday through Friday from 9 a.m. to 5 p.m. Outside those hours, you can leave a message or talk with another MSK provider. There is always a doctor or nurse on call. If you're not sure how to reach your healthcare provider, call 212-639-2000.

Para obtener más recursos, visite [www.mskcc.org/pe](http://www.mskcc.org/pe) y busque en nuestra biblioteca virtual.

Posaconazole - Last updated on December 12, 2022

Todos los derechos son propiedad y se reservan a favor de Memorial Sloan Kettering Cancer Center



Memorial Sloan Kettering  
Cancer Center