EDUCACIÓN PARA PACIENTES Y CUIDADORES

Ravulizumab

Esta información de UpToDate® Lexidrug™ le explica lo que debe saber sobre este medicamento, por ejemplo, para qué se usa, cómo tomarlo, sus efectos secundarios y cuándo llamar a su proveedor de cuidados de la salud.

Nombres comerciales: EE. UU.
Ultomiris

Nombres comerciales: Canadá
Ultomiris

Advertencia

- Este medicamento aumenta el riesgo de infecciones meningocócicas graves. Se han presentado infecciones meningocócicas potencialmente mortales y mortales en personas tratadas con este tipo de medicamento. Estas infecciones pueden tornarse potencialmente mortales o pueden ser mortales muy rápido si no se tratan a tiempo. Se deberá administrar a su hijo una vacuna contra el meningococo como mínimo 2 semanas antes de

comenzar el tratamiento con este medicamento, a menos que el médico indique lo contrario. Si su hijo ha recibido una vacuna antimeningocócica anteriormente, es posible que deba recibir otra. Consulte con el médico si tiene alguna pregunta.

- Las vacunas antimeningocócicas reducen el riesgo de infecciones meningocócicas, pero no impiden que se produzcan todas las infecciones de este tipo. Llame inmediatamente al médico de su hijo si presenta signos de una infección meningocócica, como dolor de cabeza con malestar estomacal o vómitos, fiebre o rigidez de cuello o espalda, confusión, fiebre con o sin erupciones cutáneas o taquicardia, dolores corporales con signos gripales, o si le molesta la luz en los ojos.

¿Para qué se utiliza este medicamento?

- Este medicamento se utiliza para tratar una enfermedad de la sangre denominada hemoglobinuria nocturna paroxística (HNP).
- Se utiliza para tratar una enfermedad de la sangre y el riñón denominada síndrome hemolítico urémico atípico (SHUa).
- Si su hijo ha estado recibiendo este medicamento por

alguna otra razón, consulte con su médico sobre los riesgos y beneficios. Consulte con su médico si tiene preguntas o dudas sobre el hecho de administrarle este medicamento a su hijo.

¿Qué necesito decirle al médico ANTES de que mi hijo tome este medicamento?

- Si su hijo es alérgico a este medicamento, a algún componente de este medicamento, o a otros medicamentos, alimentos o sustancias. Informe a su médico acerca de esta alergia y qué síntomas ha presentado su hijo.
- Si el niño no ha recibido una vacuna meningocócica.
- Si el niño tiene una infección meningocócica.

Si su hija está amamantando a un bebé:

- Asegúrese de que su hija no amamante a un bebé mientras tome este medicamento y durante 8 meses después de la última dosis.

Esta no es una lista de todos los medicamentos o trastornos que pueden interactuar con este medicamento.

Informe al médico y al farmacéutico todos los medicamentos que su hijo toma (sean estos recetados o de venta libre, productos naturales o vitaminas) y de los problemas de salud que padece. Debe verificar que sea

seguro administrarle a su hijo este medicamento con todos sus otros medicamentos y problemas de salud. No empiece, interrumpa ni modifique la dosis de ningún medicamento que tome su hijo sin consultar antes con el médico.

¿Qué debo saber o hacer mientras mi hijo toma este medicamento?

- Avise a todos los proveedores de atención médica de su hijo que el niño toma este medicamento. Esto incluye a los médicos, enfermeras, farmacéuticos y dentistas del niño.
- Este medicamento podría aumentar el riesgo de infecciones graves. Esto incluye infecciones causadas por *Streptococcus pneumoniae*, *Neisseria gonorrhoeae* y *Haemophilus influenzae*. Las vacunas pueden ayudar a reducir el riesgo de algunas de estas infecciones. Consulte con el médico si tiene alguna pregunta.
- Haga que el niño se lave las manos con frecuencia. Evite las multitudes y a personas con infecciones, resfriados o gripe.
- Hable con su médico para saber si su hijo está en riesgo de contraer gonorrea, cómo prevenirla y si es necesario que se realice una prueba.
- Asegúrese de que su hijo esté al día con todas las

vacunas antes de comienzo del tratamiento con este medicamento.

- Tenga consigo la tarjeta de seguridad del paciente de su hijo en todo momento y durante 8 meses después de la suspensión del medicamento.
- Controle los análisis de sangre de su hijo y otras pruebas de laboratorio según le haya indicado el médico.
- Si el peso de su hijo cambia, consulte al médico. Es posible que deba cambiarse la dosis de este medicamento.
- Si el paciente es un niño, use este medicamento con cuidado. El riesgo de ciertas infecciones graves puede aumentar en los niños.

Si su hijo es sexualmente activo o puede serlo:

- Es posible que su hija deba utilizar un método anticonceptivo mientras toma este medicamento y durante algo más de tiempo luego de su última dosis. Consulte con el médico para saber si su hija necesita usar un método anticonceptivo.

Si su hija está embarazada:

- Informe a su médico si su hija está embarazada o queda embarazada. Deberá hablar acerca de los riesgos y beneficios de que su hija utilice este medicamento

durante el embarazo.

¿Cuáles son los efectos secundarios por los que debo llamar al médico de mi hijo de inmediato?

ADVERTENCIA/PRECAUCIÓN: a pesar de que es muy poco frecuente, algunas personas pueden sufrir efectos secundarios muy graves, y en ocasiones mortales, al tomar un medicamento. Si su hijo presenta alguno de los siguientes signos o síntomas que pueden estar relacionados con un efecto secundario muy grave, infórmelo al médico de su hijo o busque ayuda médica de inmediato:

- Signos de reacción alérgica tales como sarpullido; urticaria; picazón; piel enrojecida, hinchada, con ampollas o descamada, con o sin fiebre; sibilancia; opresión en el pecho o la garganta; problemas para respirar, tragar o hablar; ronquera inusual; o hinchazón de la boca, el rostro, los labios, la lengua o la garganta.
- Los signos de infección incluyen fiebre, escalofríos, dolor de garganta muy grave, dolor de oídos o senos paranasales, tos, aumento del esputo o cambio en el color del esputo, dolor para orinar, aftas o herida que no cicatriza.
- Signos de una infección en el tracto urinario (ITU) como sangre en la orina, ardor o dolor al orinar, necesidad de

orinar con frecuencia o de inmediato, fiebre, dolor estomacal o dolor pélvico.

- Signos de presión arterial alta o baja como dolores de cabeza o mareos muy graves, desmayos o cambios en la visión.
- Síntomas de niveles bajos de potasio tales como dolor o debilidad en los músculos, calambres musculares o pulso que no se siente normal.
- Hinchazón en los brazos o las piernas.
- Contusión.
- Dolor e irritación en la zona en la que el medicamento entra al cuerpo.
- Glándula inflamada.
- Se han producido reacciones durante la infusión. Informe al médico de su hijo de inmediato si su hijo tiene dolor en el brazo o la pierna; dolor de espalda; dolor de estómago; escalofríos; espasmos musculares; mal sabor en la boca; tiene somnolencia; dolor en el pecho; dificultad para respirar; hinchazón de la cara, lengua o garganta; mareos intensos o desmayos, o cualquier otro efecto negativo durante o dentro de 1 hora después de la infusión.
- Algunos problemas de salud pueden tener lugar después de suspender el uso de este medicamento. Se

deberá observar de cerca a su hijo durante varias semanas o meses luego de suspender este medicamento. Acuda a evaluación médica. Llame al médico de inmediato si su hijo presenta un cambio en la cantidad de orina, orina oscura, hinchazón, calor o dolor en la pierna o brazo, dolor o presión en el pecho, tos con sangre, dificultad para respirar o tragar, hematomas o hemorragia sin causa aparente, convulsiones o dolor estomacal grave, mareos graves o desmayos. Llame al médico de inmediato si su hijo se siente confundido, muy cansado o débil, o si tiene debilidad en un lado del cuerpo, dificultad para hablar o pensar, cambios en el equilibrio, caída en un lado de la cara o cambios en la visión. Llame al médico de inmediato si su hijo no puede tener o mantener una erección.

¿Qué otros efectos secundarios tiene este medicamento?
Todos los medicamentos pueden tener efectos secundarios. Sin embargo, muchas personas no padecen ningún efecto secundario o padecen solamente efectos secundarios menores. Llame al médico de su hijo o busque ayuda médica si al niño le molesta alguno de estos efectos secundarios o no desaparece:

- Signos de un resfrío común.
- Irritación en la nariz o garganta.

- Dolor de cabeza.
- Estreñimiento, diarrea, dolor estomacal, malestar estomacal, vómitos o disminución del apetito.
- Se siente mareado, cansado o débil.
- Dolor de espalda, muscular, de articulaciones, de brazos o piernas.
- Espasmo muscular.
- Ansiedad.
- Pérdida del pelo.
- Piel seca.

Estos no son todos los efectos secundarios que podrían ocurrir. Si tiene preguntas acerca de los efectos secundarios, llame al médico de su hijo. Llame al médico de su hijo para que le aconseje acerca de los efectos secundarios.

Puede informar los efectos secundarios al organismo de salud de su país.

¿Cómo se administra mejor este medicamento?
Administre este medicamento según las instrucciones del médico de su hijo. Lea toda la información que se le brinde. Siga todas las instrucciones con atención.

- Este medicamento se administra como una infusión en

una vena por un periodo de tiempo.

¿Qué debo hacer si mi hijo no toma una dosis?

- Llame al médico de su hijo para obtener instrucciones.

¿Cómo almaceno o descarto este medicamento?

- Si debe almacenar este medicamento en su hogar, hable con el médico de su hijo, la enfermera o el farmacéutico sobre las condiciones de almacenamiento.

Datos generales sobre el medicamento

- Si los síntomas o trastornos de su hijo no mejoran o si empeoran, llame al médico de su hijo.
- No comparta el medicamento del niño con otras personas ni le de al niño el medicamento de ninguna otra persona.
- Guarde los medicamentos en un lugar seguro. Mantenga todo medicamento fuera del alcance de los niños y las mascotas.
- Deseche los medicamentos sin usar o que hayan expirado. No los tire por el retrete ni los vierta al desagüe a menos que así se lo indiquen. Consulte con el farmacéutico si tiene preguntas sobre la mejor manera de desechar medicamentos. Pueden existir programas de devolución de medicamentos en su área.

- Algunos medicamentos pueden tener otro folleto informativo para el paciente. Si tiene alguna pregunta sobre este medicamento, hable con el médico de su hijo, enfermera, farmacéutico u otro proveedor de atención médica.
- Si cree que ha habido una sobredosis, llame al centro de toxicología local o busque atención médica de inmediato. Prepárese para responder qué se ingirió, qué cantidad y cuándo.

Uso de la información por el consumidor y exención de responsabilidad

Esta información general es un resumen limitado de la información sobre el diagnóstico, el tratamiento y/o la medicación. No pretende ser exhaustivo y debe utilizarse como una herramienta para ayudar al usuario a comprender y/o evaluar las posibles opciones de diagnóstico y tratamiento. NO incluye toda la información sobre las enfermedades, los tratamientos, los medicamentos, los efectos secundarios o los riesgos que pueden aplicarse a un paciente específico. No pretende ser un consejo médico ni un sustituto del consejo médico, el diagnóstico o el tratamiento de un proveedor de atención médica basado en el examen y la evaluación del proveedor de atención médica de las circunstancias específicas y únicas de un paciente. Los pacientes deben

hablar con un proveedor de atención médica para obtener información completa sobre su salud, preguntas médicas y opciones de tratamiento, incluidos los riesgos o beneficios relacionados con el uso de medicamentos. Esta información no respalda ningún tratamiento o medicamento como seguro, eficaz o aprobado para tratar a un paciente específico. UpToDate, Inc. y sus afiliados renuncian a cualquier garantía o responsabilidad relacionada con esta información o con el uso que se haga de esta. El uso de esta información se rige por las Condiciones de uso, disponibles en https://www.wolterskluwer.com/en/know/clinical-effectiveness-terms.

Última fecha de revisión
2025-10-06

Derechos de autor
© 2026 UpToDate, Inc. y sus licenciantes y/o afiliados. Todos los derechos reservados.

Si tiene preguntas o inquietudes, contáctese con su proveedor de cuidados de la salud. Un integrante de su equipo de atención le responderá de lunes a viernes de 9 a. m. a 5 p. m. Fuera de ese horario, puede dejar un mensaje o hablar con otro proveedor de MSK. Siempre hay un médico o un enfermero de guardia. Si no está seguro de cómo comunicarse con su proveedor de cuidados de la salud, llame al 212-639-2000.

Para obtener más recursos, visite www.mskcc.org/pe y busque en nuestra biblioteca virtual.

Ravulizumab - Last updated on December 12, 2022
Todos los derechos son propiedad y se reservan a favor de Memorial Sloan Kettering Cancer Center



Memorial Sloan Kettering Cancer Center