

EDUCACIÓN PARA PACIENTES Y CUIDADORES

## Rho(D) Immune Globulin

Esta información de Lexicomp® le explica lo que debe saber sobre este medicamento, por ejemplo, para qué se usa, cómo tomarlo, sus efectos secundarios y cuándo llamar a su proveedor de cuidados de la salud.

### **Nombres comerciales: EE. UU.**

HyperRHO S/D; MICRhoGAM Ultra-Filtered Plus [DSC]; RhoGAM Ultra-Filtered Plus; Rhophylac; WinRho SDF

### **Nombres comerciales: Canadá**

Hyperrho S/D Full Dose [DSC]; HypRho-D; WinRho SDF

### **Advertencia**

#### **Para personas con trombocitopenia inmune (PTI):**

- Algunos pacientes con trombocitopenia inmune (PTI) han presentado una reacción grave con este medicamento, llamada anemia hemolítica. En ocasiones, esto ocasionó la muerte. Llame al médico de su hijo **de inmediato** si su hijo tiene orina oscura, dolor de espalda, fiebre, escalofríos,

menos cantidad de orina, hinchazón, aumento repentino de peso, falta de air, mareos o temblores. La mayoría de las veces, esto sucedió entre 4 y 8 horas después de una dosis. Esté atento a la aparición de estos efectos durante 72 horas después de que su hijo reciba este medicamento.

- Llame a su médico **de inmediato** si tiene orina oscura, dolor de espalda, fiebre, escalofríos, menos cantidad de orina, hinchazón, aumento repentino de peso, falta de aire, sarpullido, mareos o temblores. La mayoría de las veces, esto sucedió entre 4 y 8 horas después de una dosis. Esté atento a la aparición de estos efectos durante 72 horas después de recibir este medicamento
- Su médico controlará cuidadosamente al niño.

## ¿Para qué se utiliza este medicamento?

- Este medicamento se utiliza para tratar la púrpura trombocitopénica inmune (ITP).
- Este medicamento se utiliza para tratar la enfermedad hemolítica por Rh.
- Se le puede recetar este medicamento al niño por otras razones. Consulte al médico.

## **¿Qué necesito decirle al médico ANTES de que mi hijo tome este medicamento?**

- Si su hijo es alérgico a este medicamento, a algún componente de este medicamento, o a otros medicamentos, alimentos o sustancias. Informe a su médico acerca de esta alergia y qué síntomas ha presentado su hijo.
- Si el niño es alérgico al maíz o a los productos a base de maíz.
- Si su hijo tiene cualquiera de los siguientes problemas de salud: Anemia hemolítica autoinmune, descomposición de glóbulos rojos -o le han dicho que tiene riesgo de padecerla- o le han extirpado el bazo.
- si el niño tiene deficiencia de IgA.
- Si a su hijo/a le administraron una vacuna viva recientemente.
- Si su hijo/a es recién nacido/a. Algunas marcas comerciales de este medicamento no deben utilizarse en recién nacidos.

Esta no es una lista de todos los medicamentos o trastornos que pueden interactuar con este medicamento.

Informe al médico y al farmacéutico todos los

medicamentos que su hijo toma (sean estos recetados o de venta libre, productos naturales o vitaminas) y de los problemas de salud que padece. Debe verificar que sea seguro administrarle a su hijo este medicamento con todos sus otros medicamentos y problemas de salud. No empiece, interrumpa ni modifique la dosis de ningún medicamento que tome su hijo sin consultar antes con el médico.

### **¿Qué debo saber o hacer mientras mi hijo toma este medicamento?**

- Avise a todos los proveedores de atención médica de su hijo que el niño toma este medicamento. Esto incluye a los médicos, enfermeras, farmacéuticos y dentistas del niño.
- El niño debe evitar las tareas o las acciones que requieren un estado de alerta o una visión clara hasta que usted observe cómo este medicamento afecta a su hijo. Estas son actividades como andar en bicicleta, practicar deportes o usar elementos como tijeras, podadoras de césped, motocicletas eléctricas, automóviles de juguete o vehículos motorizados.
- Controle los análisis de sangre de su hijo y otras pruebas de laboratorio según le haya indicado el médico. Algunas personas también pueden necesitar que se les controle el ritmo cardíaco con un ECG.

- Este medicamento puede afectar ciertas pruebas de laboratorio. Avise a todos los proveedores de atención médica y bioquímicos de su hijo que su hijo toma este medicamento.
- Si el niño tiene un nivel elevado de azúcar en la sangre (diabetes), consulte al médico sobre las mejores pruebas de glucosa a aplicar.
- Existe la posibilidad de que se formen coágulos de sangre con este medicamento. La probabilidad aumenta si su hijo tiene sangre espesa, problemas del corazón o antecedentes de coágulos de sangre. La probabilidad también puede ser mayor si su hijo debe permanecer en cama o en una silla durante algún tiempo, si toma estrógenos o si utiliza determinados catéteres. Sin embargo, los coágulos de sangre pueden producirse, incluso si su hijo no tiene ninguno de estos problemas de salud. Llame inmediatamente al pediatra si su hijo siente adormecimiento o debilidad en un lado del cuerpo; dolor, enrojecimiento, sensibilidad, calor o hinchazón en los brazos o en las piernas; cambio de color de un brazo o una pierna; dolor o presión en el pecho; falta de aire; latidos rápidos, o tos con sangre. Consulte con el médico de su hijo.
- Este medicamento ha provocado problemas renales

con la inmunoglobulina humana. En algunos casos, estos problemas han sido mortales. Los problemas renales son más comunes en las personas que utilizan productos que tienen sacarosa. La mayoría de los productos con inmunoglobulina no contienen sacarosa. La posibilidad puede ser mayor si el niño tiene problemas renales, niveles de azúcar en sangre elevados (diabetes), pérdida de líquidos (deshidratación) o un volumen bajo de sangre, una infección en la sangre o proteínas en la sangre que no son normales. La posibilidad puede ser mayor si el niño toma otros medicamentos que puedan dañar los riñones. Consulte con el médico de su hijo si tiene preguntas sobre esta información o sobre si su producto tiene sacarosa.

- Deberá estar seguro de que su hijo no esté deshidratado antes de administrarse este medicamento. Consulte con el médico para averiguar si necesita asegurarse de que su hijo beba más líquido antes de administrarle este medicamento.
- Este medicamento está hecho de plasma humano (una parte de la sangre) y puede contener virus que provoquen enfermedades. Este medicamento se evalúa, prueba y trata para reducir las probabilidades de que transmita una infección. Consulte al médico.

- No le dé a su hijo ninguna vacuna durante los 3 meses posteriores a la inmunoglobulina sin hablar con el médico de su hijo.

## **Si su hija está embarazada o amamantando a un bebé:**

- Consulte al médico si su hija está embarazada, queda embarazada o está amamantando a un bebé. Tendrá que hablar acerca de los riesgos y beneficios para su hija y el bebé.

## **¿Cuáles son los efectos secundarios por los que debo llamar al médico de mi hijo de inmediato?**

**ADVERTENCIA/PRECAUCIÓN:** a pesar de que es muy poco frecuente, algunas personas pueden sufrir efectos secundarios muy graves, y en ocasiones mortales, al tomar un medicamento. Si su hijo presenta alguno de los siguientes signos o síntomas que pueden estar relacionados con un efecto secundario muy grave, infórmelo al médico de su hijo o busque ayuda médica de inmediato:

- Signos de reacción alérgica tales como sarpullido; urticaria; picazón; piel enrojecida, hinchada, con ampollas o descamada, con o sin fiebre; sibilancia; opresión en el pecho o la garganta; problemas para respirar, tragar o hablar; ronquera inusual; o

hinchazón de la boca, el rostro, los labios, la lengua o la garganta.

- Signos de presión arterial alta o baja como dolores de cabeza o mareos muy graves, desmayos o cambios en la visión.
- Signos de problemas renales como la incapacidad de orinar, cambios en la cantidad de orina, sangre en la orina o un aumento de peso importante.
- Dolor de espalda.
- Dolor de estómago.
- Orina oscura o piel/ojos amarillentos.
- Náusea o vómito.
- Falta de aire, mucho aumento peso, inflamación en los brazos o piernas.
- Fiebre, escalofríos o dolor de garganta, cualquier hematoma o hemorragia inexplicable, o sensación de cansancio o debilidad.
- Piel pálida.
- Escalofríos.
- Espasmo muscular.
- Este medicamento ha provocado problemas pulmonares graves. Este tipo de problema pulmonar puede ser potencialmente mortal. Llame al médico de



su hijo de inmediato si tiene problemas pulmonares o respiratorios, como dificultad para respirar, falta de aire o tos nueva o que empeoró.

## **¿Qué otros efectos secundarios tiene este medicamento?**

Todos los medicamentos pueden tener efectos secundarios. Sin embargo, muchas personas no padecen ningún efecto secundario o padecen solamente efectos secundarios menores. Llame al médico de su hijo o busque ayuda médica si al niño le molesta alguno de estos efectos secundarios o no desaparece:

- Dolor de cabeza.
- Sentirse mareado, soñoliento, cansado o débil.
- Dolor, enrojecimiento o hinchazón donde se aplicó la inyección.
- Diarrea.
- Dolor en los músculos o las articulaciones.

Estos no son todos los efectos secundarios que podrían ocurrir. Si tiene preguntas acerca de los efectos secundarios, llame al médico de su hijo. Llame al médico de su hijo para que le aconseje acerca de los efectos secundarios.

Puede informar los efectos secundarios al organismo de

salud de su país.

### **¿Cómo se administra mejor este medicamento?**

Administre este medicamento según las instrucciones del médico de su hijo. Lea toda la información que se le brinde. Siga todas las instrucciones con atención.

- Este medicamento se administra por inyección.

### **¿Qué debo hacer si mi hijo no toma una dosis?**

- Llame al médico de su hijo para obtener instrucciones.

### **¿Cómo almaceno o descarto este medicamento?**

- Si debe almacenar este medicamento en su hogar, hable con el médico de su hijo, la enfermera o el farmacéutico sobre las condiciones de almacenamiento.

### **Datos generales sobre el medicamento**

- Si los síntomas o trastornos de su hijo no mejoran o si empeoran, llame al médico de su hijo.
- No comparta el medicamento del niño con otras personas ni le de al niño el medicamento de ninguna otra persona.
- Guarde los medicamentos en un lugar seguro. Mantenga todo medicamento fuera del alcance de los niños y las mascotas.

- Deseche los medicamentos sin usar o que hayan expirado. No los tire por el retrete ni los vierta al desagüe a menos que así se lo indiquen. Consulte con el farmacéutico si tiene preguntas sobre la mejor manera de desechar medicamentos. Pueden existir programas de devolución de medicamentos en su área.
- Algunos medicamentos pueden tener otro folleto informativo para el paciente. Si tiene alguna pregunta sobre este medicamento, hable con el médico de su hijo, enfermera, farmacéutico u otro proveedor de atención médica.
- Si cree que ha habido una sobredosis, llame al centro de toxicología local o busque atención médica de inmediato. Prepárese para responder qué se ingirió, qué cantidad y cuándo.

## **Uso de la información por el consumidor y exención de responsabilidad**

Esta información general es un resumen limitado de la información sobre el diagnóstico, el tratamiento y/o la medicación. No pretende ser exhaustivo y debe utilizarse como una herramienta para ayudar al usuario a comprender y/o evaluar las posibles opciones de diagnóstico y tratamiento. NO incluye toda la información sobre las enfermedades, los tratamientos,

los medicamentos, los efectos secundarios o los riesgos que pueden aplicarse a un paciente específico. No pretende ser un consejo médico ni un sustituto del consejo médico, el diagnóstico o el tratamiento de un proveedor de atención médica basado en el examen y la evaluación del proveedor de atención médica de las circunstancias específicas y únicas de un paciente. Los pacientes deben hablar con un proveedor de atención médica para obtener información completa sobre su salud, preguntas médicas y opciones de tratamiento, incluidos los riesgos o beneficios relacionados con el uso de medicamentos. Esta información no respalda ningún tratamiento o medicamento como seguro, eficaz o aprobado para tratar a un paciente específico.

UpToDate, Inc. y sus afiliados renuncian a cualquier garantía o responsabilidad relacionada con esta información o con el uso que se haga de esta. El uso de esta información se rige por las Condiciones de uso, disponibles en

<https://www.wolterskluwer.com/en/know/clinical-effectiveness-terms>.

## **Última fecha de revisión**

2022-11-15

## **Derechos de autor**

© 2025 UpToDate, Inc. y sus licenciantes y/o afiliados.

Todos los derechos reservados.

If you have questions or concerns, contact your healthcare provider. A member of your care team will answer Monday through Friday from 9 a.m. to 5 p.m. Outside those hours, you can leave a message or talk with another MSK provider. There is always a doctor or nurse on call. If you're not sure how to reach your healthcare provider, call 212-639-2000.

Para obtener más recursos, visite [www.mskcc.org/pe](http://www.mskcc.org/pe) y busque en nuestra biblioteca virtual.

Rho(D) Immune Globulin - Last updated on December 12, 2022

Todos los derechos son propiedad y se reservan a favor de  
Memorial Sloan Kettering Cancer Center



Memorial Sloan Kettering  
Cancer Center