EDUCACIÓN PARA PACIENTES Y CUIDADORES

Risdiplam

Esta información de UpToDate® Lexidrug™ le explica lo que debe saber sobre este medicamento, por ejemplo, para qué se usa, cómo tomarlo, sus efectos secundarios y cuándo llamar a su proveedor de cuidados de la salud.

Nombres comerciales: EE. UU.

Evrysdi

Nombres comerciales: Canadá

Evrysdi

¿Para qué se utiliza este medicamento?

- Se utiliza para tratar la atrofia muscular espinal.

¿Qué necesito decirle al médico ANTES de que mi hijo tome este medicamento?

- Si su hijo es alérgico a este medicamento, a algún componente de este medicamento, o a otros medicamentos, alimentos o sustancias. Informe a su médico acerca de esta alergia y qué síntomas ha presentado su hijo.
- Si su hijo tiene enfermedad hepática.

Esta no es una lista de todos los medicamentos o trastornos que pueden interactuar con este medicamento.

Informe al médico y al farmacéutico todos los medicamentos que su hijo toma (sean estos recetados o de venta libre, productos naturales o vitaminas) y de los problemas de salud que padece. Debe verificar que sea seguro administrarle a su hijo este medicamento con todos sus otros medicamentos y problemas de

salud. No empiece, interrumpa ni modifique la dosis de ningún medicamento que tome su hijo sin consultar antes con el médico.

¿Qué debo saber o hacer mientras mi hijo toma este medicamento?

- Avise a todos los proveedores de atención médica de su hijo que el niño toma este medicamento. Esto incluye a los médicos, enfermeras, farmacéuticos y dentistas del niño.
- No deje de administrar este medicamento a su hijo sin consultar al médico que se lo recetó.
- Si el peso de su hijo cambia, consulte al médico. Es posible que deba cambiarse la dosis de este medicamento.
- Este medicamento puede afectar la fertilidad del hombre. Consulte al médico.
- Si su hija está en edad fértil, deberá realizarse una prueba de embarazo antes de comenzar a recibir este medicamento, para asegurarse de que no esté embarazada.

Si su hijo es sexualmente activo o puede serlo:

- Este medicamento puede dañar al feto si su hija lo toma durante el embarazo.
- Si su hija puede quedar embarazada, haga que use un método anticonceptivo mientras toma este medicamento y por 1 mes después de la última dosis. Si su hija queda embarazada, llame al médico de inmediato.
- Si la pareja sexual de su hijo puede quedar embarazada, debe usar métodos anticonceptivos mientras toma este medicamento y durante algún tiempo después de la última dosis de su hijo. Consulte con el médico.

Si su hija está amamantando a un bebé:

- Informe al médico si está amamantando a su hijo. Deberá hablar acerca de los riesgos para el bebé.

¿Cuáles son los efectos secundarios por los que debo llamar al médico de mi hijo de inmediato?

ADVERTENCIA/PRECAUCIÓN: a pesar de que es muy poco frecuente, algunas personas pueden sufrir efectos secundarios muy graves, y en ocasiones mortales, al tomar un medicamento. Si su hijo presenta alguno de los siguientes signos o síntomas que pueden estar relacionados con un efecto secundario muy grave, infórmelo al médico de su hijo o busque ayuda médica de inmediato:

- Signos de reacción alérgica tales como sarpullido; urticaria; picazón; piel enrojecida, hinchada, con ampollas o descamada, con o sin fiebre; sibilancia; opresión en el pecho o la garganta; problemas para respirar, tragar o hablar; ronquera inusual; o hinchazón de la boca, el rostro, los labios, la lengua o la garganta.
- Signos de una infección en el tracto urinario (ITU) como sangre en la orina, ardor o dolor al orinar, necesidad de orinar con frecuencia o de inmediato, fiebre, dolor estomacal o dolor pélvico.
- Falta de aire.
- Tos.

¿Qué otros efectos secundarios tiene este medicamento?

Todos los medicamentos pueden tener efectos secundarios. Sin embargo, muchas personas no padecen ningún efecto secundario o padecen solamente efectos secundarios menores. Llame al médico de su hijo o busque ayuda médica si al niño le molesta alguno de estos efectos secundarios o no desaparece:

- Fiebre leve.
- Diarrea o estreñimiento.
- Vómitos.
- Lesiones en la boca.
- Dolor en las articulaciones.

- Signos de un resfrío común.

Estos no son todos los efectos secundarios que podrían ocurrir. Si tiene preguntas acerca de los efectos secundarios, llame al médico de su hijo. Llame al médico de su hijo para que le aconseje acerca de los efectos secundarios.

Puede informar los efectos secundarios al organismo de salud de su país.

¿Cómo se administra mejor este medicamento?

Administre este medicamento según las instrucciones del médico de su hijo. Lea toda la información que se le brinde. Siga todas las instrucciones con atención.

Tabletas:

- Administre este medicamento con o sin alimentos.
- Administre este medicamento aproximadamente a la misma hora cada día.
- Lávese las manos antes y después de administrar este medicamento.
- El niño debe tragarla entera. Anime al niño a no masticar, romper o triturarla.
- Administre este medicamento con un vaso de agua completo.
- Si su hijo no puede tragarlo entero, añada el comprimido a 5 ml de agua potable no clorada a temperatura ambiente (agua filtrada). No utilice otros líquidos. Agite suavemente el vaso durante 3 minutos hasta que esté completamente mezclado. Quedarán algunas partículas. Asegúrese de que el niño lo tome de inmediato. Si no bebe la mezcla en 10 minutos, deséchela de inmediato. Para asegurarse de que su hijo recibe toda la dosis, llene de nuevo la taza con al menos 15 ml de agua filtrada, remuévala y haga que la beba inmediatamente.
- Si este medicamento entra en contacto con la piel luego de mezclarlo, lávese con agua y jabón de inmediato. Si le entra en los ojos después de mezclarlo, enjuáguelos inmediatamente con agua fría.
- Si derrama este medicamento después de mezclarlo, utilice una toalla de papel para secar la zona y luego límpiela con agua y jabón. Arroje la toalla de papel a la basura y lávese las manos con agua y jabón.

- Si su hijo no puede tragar la dosis completa o vomita después de tomar una dosis, no la repita. Administre a su hijo la dosis siguiente a la hora habitual.
- Aquellas personas que poseen sondas de alimentación pueden consumir este medicamento. Administre este medicamento según fue indicado. Enjuague la sonda de alimentación después de administrar este medicamento.

Solución oral:

- Administre este medicamento con o sin alimentos.
- Administre este medicamento aproximadamente a la misma hora cada día.
- El farmacéutico u otro proveedor de atención médica deberá mezclar este medicamento antes de que usted lo reciba.
- Mida cuidadosamente las dosis del líquido. Utilice el medidor que viene con el medicamento.
- Administre la dosis dentro de los 5 minutos después de introducirla en la jeringa oral. No conserve este medicamento en la jeringa. Si no se administra dentro de los 5 minutos, prepare una nueva dosis.
- Haga que su hijo beba agua después de tomar este medicamento para asegurarse de que la dosis se ingiera por completo.
- Enjuagar el dispositivo de medición con agua después de cada uso.
- Aquellas personas que poseen sondas de alimentación pueden consumir este medicamento. Administre este medicamento según fue indicado. Enjuague la sonda de alimentación después de administrar este medicamento.
- Si entra en contacto con la piel, lave inmediatamente con agua y jabón.
- Si este medicamento entra en sus ojos, enjuague con agua fría.
- Si su hijo no puede tragar la dosis completa o vomita después de tomar una dosis, no la repita. Administre a su hijo la dosis siguiente a la hora habitual.

Para niños pequeños que toman la solución oral:

- Si el paciente es un lactante, puede administrar este medicamento antes o después de amamantarlo. No mezcle este medicamento con leche de fórmula o leche.
- Haga que su hijo se sienta erguido para tomar una dosis. Coloque la punta de la jeringa en la boca, en la parte interior de la mejilla. Empuje suavemente el émbolo hasta que haya salido todo el medicamento. No presione la jeringa rápidamente. Esto podría causar asfixia.

¿Qué debo hacer si mi hijo no toma una dosis?

- Administre la dosis que olvidó lo antes posible.
- Si han transcurrido más de 6 horas desde la dosis faltante, omítala y continúe con el horario habitual de su hijo.
- No administre 2 dosis simultáneamente ni administre dosis adicionales.

¿Cómo almaceno o descarto este medicamento?

Tabletas:

- Guarde las tabletas en su envase original a temperatura ambiente. Mantenga la tapa bien cerrada.
- Mantener en un lugar seco. No conservar en un baño.

Solución oral:

- Conserve en el refrigerador. No lo congele. Deseche las partes que no utilice al cabo de 64 días de haber mezclado este medicamento. Hable con su farmacéutico si tiene dudas acerca de cuándo fue.
- Si fuera necesario, este medicamento puede almacenarse a temperatura ambiente hasta los 40°C (104°C) durante un total de 5 días. Este medicamento puede retirarse y volverse a colocar en un refrigerador. Si este medicamento se conservó a temperatura ambiente durante más de un total de 5 días, deséchelo.
- Evite las temperaturas superiores a 40°C (104°F). No tome este medicamento si ha estado a temperaturas mayores de 40°C (104°F).

- Conservar en el envase original para proteger de la luz.
- Guarde en posición vertical con la tapa puesta.

Todas las presentaciones:

- Guarde los medicamentos en un lugar seguro. Mantenga todo medicamento fuera del alcance de los niños y las mascotas.
- Deseche los medicamentos sin usar o que hayan expirado. No los tire por el retrete ni los vierta al desagüe a menos que así se lo indiquen. Consulte con el farmacéutico si tiene preguntas sobre la mejor manera de desechar medicamentos. Pueden existir programas de devolución de medicamentos en su área.

Datos generales sobre el medicamento

- Si los síntomas o trastornos de su hijo no mejoran o si empeoran, llame al médico de su hijo.
- No comparta el medicamento del niño con otras personas ni le de al niño el medicamento de ninguna otra persona.
- Algunos medicamentos pueden tener otro folleto informativo para el paciente. Si tiene alguna pregunta sobre este medicamento, hable con el médico de su hijo, enfermera, farmacéutico u otro proveedor de atención médica.
- Si cree que ha habido una sobredosis, llame al centro de toxicología local o busque atención médica de inmediato. Prepárese para responder qué se ingirió, qué cantidad y cuándo.

Uso de la información por el consumidor y exención de responsabilidad

Esta información general es un resumen limitado de la información sobre el diagnóstico, el tratamiento y/o la medicación. No pretende ser exhaustivo y debe utilizarse como una herramienta para ayudar al usuario a comprender y/o evaluar las posibles opciones de diagnóstico y tratamiento. NO incluye toda la información sobre las enfermedades, los tratamientos, los medicamentos, los

efectos secundarios o los riesgos que pueden aplicarse a un paciente específico. No pretende ser un consejo médico ni un sustituto del consejo médico, el diagnóstico o el tratamiento de un proveedor de atención médica basado en el examen y la evaluación del proveedor de atención médica de las circunstancias específicas y únicas de un paciente. Los pacientes deben hablar con un proveedor de atención médica para obtener información completa sobre su salud, preguntas médicas y opciones de tratamiento, incluidos los riesgos o beneficios relacionados con el uso de medicamentos. Esta información no respalda ningún tratamiento o medicamento como seguro, eficaz o aprobado para tratar a un paciente específico. UpToDate, Inc. y sus afiliados renuncian a cualquier garantía o responsabilidad relacionada con esta información o con el uso que se haga de esta. El uso de esta información se rige por las Condiciones de uso, disponibles en https://www.wolterskluwer.com/en/know/clinical-effectiveness-terms.

Última fecha de revisión

2026-03-17

Derechos de autor

© 2026 UpToDate, Inc. y sus licenciantes y/o afiliados. Todos los derechos reservados.

Si tiene preguntas o inquietudes, contáctese con su proveedor de cuidados de la salud. Un integrante de su equipo de atención le responderá de lunes a viernes de 9 a. m. a 5 p. m. Fuera de ese horario, puede dejar un mensaje o hablar con otro proveedor de MSK. Siempre hay un médico o un enfermero de guardia. Si no está seguro de cómo comunicarse con su proveedor de cuidados de la salud, llame al 212-639-2000.

Para obtener más recursos, visite www.mskcc.org/pe y busque en nuestra biblioteca virtual.

Risdiplam - Last updated on December 12, 2022
Todos los derechos son propiedad y se reservan a favor de Memorial Sloan Kettering Cancer Center