

# Sodium Picosulfate, Magnesium Oxide, and Citric Acid

Esta información de Lexicomp® le explica lo que debe saber sobre este medicamento, por ejemplo, para qué se usa, cómo tomarlo, sus efectos secundarios y cuándo llamar a su proveedor de cuidados de la salud.

## Nombres comerciales: EE. UU.

Clenpiq

## Nombres comerciales: Canadá

Oral Purgative; Pico-Salax; Picodan; Picroflo; Purg-Odan

## ¿Para qué se utiliza este medicamento?

- Este medicamento se utiliza para limpiar el tubo digestivo.

## ¿Qué necesito decirle al médico ANTES de que mi hijo tome este medicamento?

- Si su hijo es alérgico a este medicamento, a algún componente de este medicamento, o a otros medicamentos, alimentos o sustancias. Informe a su médico acerca de esta alergia y qué síntomas ha presentado su hijo.
- Si su hijo tiene cualquiera de los siguientes problemas de salud: obstrucción del intestino, deshidratación, problemas de electrolitos (como sodio, potasio, fosfato), hinchazón del colon, orificio en el tracto gastrointestinal (GI) o tracto gastrointestinal (GI) de tránsito lento.
- Si el niño tiene enfermedad renal.
- Si el niño toma otros laxantes.

Esta no es una lista de todos los medicamentos o trastornos que pueden interactuar con este medicamento.

Informe al médico y al farmacéutico todos los medicamentos que su hijo toma (sean estos recetados o de venta libre, productos naturales o vitaminas) y de los problemas de salud que padece. Debe verificar que sea seguro administrarle a su hijo este medicamento con todos sus otros medicamentos y problemas de salud. No empiece, interrumpa ni modifique la dosis de ningún medicamento que tome su hijo sin consultar antes con el médico.

## **¿Qué debo saber o hacer mientras mi hijo toma este medicamento?**

- Avise a todos los proveedores de atención médica de su hijo que el niño toma este medicamento. Esto incluye a los médicos, enfermeras, farmacéuticos y dentistas del niño.
- Si su hijo tiene riesgo de sufrir latidos cardíacos anormales, hable con el médico. El médico de su hijo puede pedirle un electrocardiograma (ECG) antes y después de utilizar este medicamento.
- No debe administrarse otros laxantes ni blandadores de heces , a menos que así se lo indique el médico del niño.
- El alcohol puede interactuar con este medicamento. Asegúrese de que su hijo no beba alcohol.
- Algunos pacientes se han deshidratado y desmayado mientras tomaban este medicamento. Los desmayos pueden provocar caídas y lesiones graves (como una lesión en la cabeza o una fractura de huesos). Asegúrese de que su hijo beba suficientes líquidos claros mientras toma este medicamento. Haga que su hijo se levante lentamente si ha estado sentado o recostado. Su hijo debe tener cuidado al subir y bajar escaleras.

## **Si su hija está embarazada o amamantando a un bebé:**

- Consulte al médico si su hija está embarazada, queda embarazada o está amamantando a un bebé. Tendrá que hablar acerca de los riesgos y beneficios para su hija y el bebé.

## **¿Cuáles son los efectos secundarios por los que debo llamar al médico de mi hijo de inmediato?**

**ADVERTENCIA/PRECAUCIÓN:** a pesar de que es muy poco frecuente, algunas personas pueden sufrir efectos secundarios muy graves, y en ocasiones mortales, al tomar un medicamento. Si su hijo presenta alguno de los siguientes signos o síntomas que pueden estar relacionados con un efecto secundario muy grave, infórmelo al médico de su hijo o busque ayuda médica de inmediato:

- Signos de reacción alérgica tales como sarpullido; urticaria; picazón; piel enrojecida, hinchada, con ampollas o descamada, con o sin fiebre; sibilancia; opresión en el pecho o la garganta; problemas para respirar, tragar o hablar; ronquera inusual; o hinchazón de la boca, el rostro, los labios, la lengua o la garganta.
- Hinchazón de estómago.
- Hinchazón del vientre.
- Cólicos abdominales.
- Vomitar sangre o vómito que parece granos de café.
- Materia fecal oscura, negra o con sangre.
- Sangramiento del recto o dolor en el recto.
- Dificultad para tragar.
- Es posible que este medicamento le produzca a su hijo deshidratación o problemas de electrólitos. En raras ocasiones, esto puede ser grave o mortal. Informe al médico de su hijo de inmediato si su hijo se marea, se desmaya, siente cansancio o debilidad o no puede orinar. Informe al médico de su hijo de inmediato si su hijo tiene una frecuencia cardíaca acelerada o anormal, convulsiones, dolor de cabeza, cambios de humor, confusión, dolor o debilidad muscular, aumento de la sed, disminución del apetito, tiene la boca o los ojos secos, sufre de malestar estomacal intenso o vómitos o experimenta cambios en la cantidad de orina producida.

## **¿Qué otros efectos secundarios tiene este medicamento?**

Todos los medicamentos pueden tener efectos secundarios. Sin embargo, muchas personas no padecen ningún efecto secundario o padecen solamente efectos secundarios menores. Llame al médico de su hijo o busque ayuda médica si al niño le molesta alguno de estos efectos secundarios o no desaparece:

- Náusea o vómito.
- Dolor de estómago.
- Dolor de cabeza.

Estos no son todos los efectos secundarios que podrían ocurrir. Si tiene preguntas acerca de los efectos secundarios, llame al médico de su hijo. Llame al médico de su hijo para que le aconseje acerca de los efectos secundarios.

Puede informar los efectos secundarios al organismo de salud de su país.

## **¿Cómo se administra mejor este medicamento?**

Administre este medicamento según las instrucciones del médico de su hijo. Lea toda la información que se le brinde. Siga todas las instrucciones con atención.

### **Todas las presentaciones:**

- Administre este medicamento según le indique su médico. Siga cuidadosamente todas las instrucciones recibidas. Esto incluye cuándo administrar el medicamento, los alimentos y bebidas que su hijo/a debe evitar antes del examen, y cuándo su hijo/a debe comenzar el ayuno líquido y sólido antes del examen. Consulte con su médico si tiene preguntas.
- No deje que su hijo ingiera alimentos sólidos ni tome productos lácteos como la leche mientras está tomando este medicamento.
- Haga que su hijo beba más líquidos después de cada dosis de este medicamento. Asegúrese de saber cuánto líquido quiere el médico que beba su hijo después de cada dosis.
- Haga que su hijo beba varios tipos de líquidos claros antes y después de tomar este medicamento, y mientras lo toma. Su hijo no debe beber solo

agua. Asegúrese de que 1 otro tipo de líquido claro sea una solución electrolítica como una bebida deportiva. Otros líquidos claros son el café negro o el té (sin leche ni crema), el caldo claro, el jugo claro sin pulpa, la gaseosa de jengibre, otros refrescos, la gelatina sin sabor y las barras de jugo congeladas.

- NO permita que su hijo beba líquidos, gelatinas o barras de jugo de color morado o rojo. No permita que su hijo beba leche o alcohol.
- Asegúrese que su hijo deja de beber líquidos al menos 2 horas antes del examen, a menos que el médico de su hijo le indique lo contrario.
- Si su hijo tiene dolor de estómago grave, inflamación o hinchazón después de la primera dosis, no le administre la segunda dosis hasta que estos síntomas desaparezcan. Consulte con el médico de su hijo si tiene preguntas.
- No administre otros medicamentos por vía oral durante la hora anterior a cada dosis de este medicamento. Es posible que algunos medicamentos deban aplazarse por más tiempo después de este medicamento. Consulte con el médico sobre cómo administrarle a su hijo otros medicamentos junto con este.

### **Polvo para solución:**

- Mezcle con agua como se le indicó antes de administrar este medicamento. Asegúrese de que su hijo/a no trague el polvo seco.
- Luego de mezclar, administre la dosis a su hijo de inmediato. No almacene para usar posteriormente.
- No agregue hielo a la solución mezclada.

### **Líquido (solución):**

- Este medicamento está listo para beberse. No es necesario diluir este medicamento antes de proporcionarlo.
- La solución es transparente y es posible que vea algunas partículas en ella. Esto es normal.

## **¿Qué debo hacer si mi hijo no toma una dosis?**

- Llame al médico de su hijo para obtener instrucciones.
- Llame al médico si su hijo no puede terminar este medicamento antes del examen.

## **¿Cómo almaceno o descarto este medicamento?**

### **Polvo para solución:**

- Conserve a temperatura ambiente.
- Después de mezclar, no refrigerere.

### **Líquido (solución):**

- Conserve a temperatura ambiente. No refrigerar ni congelar.

### **Todas las presentaciones:**

- Mantener en un lugar seco. No conservar en un baño.
- Guarde los medicamentos en un lugar seguro. Mantenga todo medicamento fuera del alcance de los niños y las mascotas.
- Deseche los medicamentos sin usar o que hayan expirado. No los tire por el retrete ni los vierta al desagüe a menos que así se lo indiquen. Consulte con el farmacéutico si tiene preguntas sobre la mejor manera de desechar medicamentos. Pueden existir programas de devolución de medicamentos en su área.

## **Datos generales sobre el medicamento**

- Si los síntomas o trastornos de su hijo no mejoran o si empeoran, llame al médico de su hijo.
- No comparta el medicamento del niño con otras personas ni le de al niño el medicamento de ninguna otra persona.
- Algunos medicamentos pueden tener otro folleto informativo para el paciente. Si tiene alguna pregunta sobre este medicamento, hable con el

médico de su hijo, enfermera, farmacéutico u otro proveedor de atención médica.

- Si cree que ha habido una sobredosis, llame al centro de toxicología local o busque atención médica de inmediato. Prepárese para responder qué se ingirió, qué cantidad y cuándo.

## **Uso de la información por el consumidor y exención de responsabilidad**

Esta información general es un resumen limitado de la información sobre el diagnóstico, el tratamiento y/o la medicación. No pretende ser exhaustivo y debe utilizarse como una herramienta para ayudar al usuario a comprender y/o evaluar las posibles opciones de diagnóstico y tratamiento. NO incluye toda la información sobre las enfermedades, los tratamientos, los medicamentos, los efectos secundarios o los riesgos que pueden aplicarse a un paciente específico. No pretende ser un consejo médico ni un sustituto del consejo médico, el diagnóstico o el tratamiento de un proveedor de atención médica basado en el examen y la evaluación del proveedor de atención médica de las circunstancias específicas y únicas de un paciente. Los pacientes deben hablar con un proveedor de atención médica para obtener información completa sobre su salud, preguntas médicas y opciones de tratamiento, incluidos los riesgos o beneficios relacionados con el uso de medicamentos. Esta información no respalda ningún tratamiento o medicamento como seguro, eficaz o aprobado para tratar a un paciente específico. UpToDate, Inc. y sus afiliados renuncian a cualquier garantía o responsabilidad relacionada con esta información o con el uso que se haga de esta. El uso de esta información se rige por las Condiciones de uso, disponibles en

<https://www.wolterskluwer.com/en/know/clinical-effectiveness-terms>.

## **Última fecha de revisión**

2025-03-05

## **Derechos de autor**

© 2025 UpToDate, Inc. y sus licenciantes y/o afiliados. Todos los derechos reservados.

If you have questions or concerns, contact your healthcare provider. A member of your care team will answer Monday through Friday from 9 a.m. to 5 p.m. Outside those hours, you can leave a message or talk with another MSK provider. There is always a doctor or nurse on call. If you're not sure how to reach your healthcare provider, call 212-639-2000.

Para obtener más recursos, visite [www.mskcc.org/pe](http://www.mskcc.org/pe) y busque en nuestra biblioteca virtual.

Sodium Picosulfate, Magnesium Oxide, and Citric Acid - Last updated on December 12, 2022

Todos los derechos son propiedad y se reservan a favor de Memorial Sloan Kettering Cancer Center



Memorial Sloan Kettering  
Cancer Center