

---

## EDUCACIÓN PARA PACIENTES Y CUIDADORES

# Sotalol

Esta información de Lexicomp® le explica lo que debe saber sobre este medicamento, por ejemplo, para qué se usa, cómo tomarlo, sus efectos secundarios y cuándo llamar a su proveedor de cuidados de la salud.

### **Nombres comerciales: EE. UU.**

Betapace; Betapace AF; Sorine [DSC]; Sotylize

### **Nombres comerciales: Canadá**

APO-Sotalol; JAMP-Sotalol; MED Sotalol; PMS-Sotalol;  
RATIO-Sotalol; RIVA-Sotalol [DSC]

## Advertencia

- Este medicamento puede generar un tipo de ritmo cardiaco potencialmente mortal que no es normal (intervalo QT prolongado). Consulte al médico si el niño tiene un QT largo en el ECG.
- El niño deberá comenzar y volver a comenzar con este medicamento en un ambiente donde se vigile continuamente su corazón. Consulte con el médico.
- Comuníquese con el proveedor de salud médica si el niño presenta enfermedad renal.

## ¿Para qué se utiliza este medicamento?

- Este medicamento se utiliza para tratar determinados tipos de ritmos cardiacos anómalos potencialmente mortales.
- Se usa para mantener un ritmo cardiaco normal en personas que presentan un ritmo cardiaco anormal (fibrilación auricular o aleteo auricular).

## ¿Qué necesito decirle al médico ANTES de que mi hijo tome este medicamento?

- Si su hijo es alérgico a este medicamento, a algún componente de este medicamento, o a otros

medicamentos, alimentos o sustancias. Informe a su médico acerca de esta alergia y qué síntomas ha presentado su hijo.

- Si el niño tiene alguno de estos problemas de salud: Asma u otros problemas del pulmón o para respirar que provocan disnea o sibilancia, insuficiencia cardiaca (corazón debilitado), determinados tipos de ritmos cardiacos anormales denominados bloqueo del corazón o síndrome del seno enfermo, o ritmo cardiaco lento.
- Si su hijo tiene alguno de estos problemas de salud: niveles bajos de potasio o magnesio.
- Si el niño está tomando medicamentos que se usan para un ritmo cardiaco que no es normal.
- Si el niño toma algún medicamento que pueda producir un determinado tipo de latido cardíaco que no es normal (prolongación del intervalo QT). Hay muchos medicamentos que pueden hacer esto. Pregunte al médico o al farmacéutico si no está seguro.

**Si su hija está amamantando a un bebé:**

- Asegúrese de que su hija no amamante a un bebé mientras tome este medicamento.

Esta no es una lista de todos los medicamentos o trastornos que pueden interactuar con este medicamento.

Informe al médico y al farmacéutico todos los medicamentos que su hijo toma (sean estos recetados o de venta libre, productos naturales o vitaminas) y de los problemas de salud que padece. Debe verificar que sea seguro administrarle a su hijo este medicamento con todos sus otros medicamentos y problemas de salud. No empiece, interrumpa ni modifique la dosis de ningún medicamento que tome su hijo sin consultar antes con el médico.

## **¿Qué debo saber o hacer mientras mi hijo toma este medicamento?**

- Avise a todos los proveedores de atención médica de su hijo que el niño toma este medicamento. Esto incluye a los médicos, enfermeras, farmacéuticos y dentistas del niño.
- El niño debe evitar las tareas o las acciones que requieren un estado de alerta hasta que usted observe cómo este medicamento afecta a su hijo. Estas son actividades como andar en bicicleta, practicar deportes o usar elementos como tijeras, podadoras de césped, motocicletas eléctricas, automóviles de juguete o vehículos motorizados.
- Para reducir la probabilidad de que su hijo se sienta mareado o pierda la conciencia, haga que se levante

lentamente si estuvo sentado o recostado. Haga que su hijo tenga cuidado al subir y bajar escaleras.

- Asegúrese de que le tomen la presión arterial y la frecuencia cardíaca de su hijo a menudo.
- Pida que le hagan análisis de sangre de control con frecuencia al niño. Hable con el médico del niño.
- Antes de comenzar a tomar este medicamento y durante el tratamiento, su hijo deberá hacerse un ECG. Hable con el médico.
- Este medicamento puede afectar ciertas pruebas de laboratorio. Avise a todos los proveedores de atención médica y bioquímicos de su hijo que su hijo toma este medicamento.
- Este medicamento puede prevenir algunos signos de hipoglucemia, como los latidos rápidos. Esto puede aumentar el riesgo de hipoglucemia grave o prolongada, especialmente en personas con diabetes, niños, niñas y personas en ayunas. Esto incluye a las personas que van a ser operadas, que no comen como de costumbre o que tienen vómitos. Consulte con el médico si tiene alguna pregunta.
- Si su niño es diabético, deberá vigilar cuidadosamente su nivel de azúcar en sangre.
- Dígale al médico si el niño suda más de lo habitual o

tiene pérdida de líquido, diarrea, aumento de la sed, vómitos o disminución del apetito.

- No deje de administrar este medicamento al niño en forma repentina. Si lo hace, puede producirse un dolor de pecho más intenso y, en algunos casos, tener un ataque al corazón. Es posible que la posibilidad sea mayor si el niño tiene determinados tipos de enfermedad cardíaca. Para evitar los efectos secundarios, es mejor que deje de tomar este medicamento lentamente según las indicaciones del médico. Llame al médico de inmediato si el niño tiene un nuevo dolor de pecho, si el dolor ha empeorado o si sucede algún otro problema de corazón.
- Con el uso de este medicamento se puede dificultar la detección de la presencia de síntomas de una hiperactividad de la tiroides como por ejemplo ritmo cardíaco rápido. Si el niño tiene una hiperactividad de la tiroides y suspende este medicamento en forma repentina, el hipertiroidismo podría agravarse y podría ser potencialmente mortal. Consulte al médico.
- Si el niño tuvo una reacción alérgica grave, consulte al médico. El niño puede experimentar una reacción más grave si entra en contacto con el elemento que provocó la alergia. Si el niño usa epinefrina para tratar reacciones alérgicas graves, consulte al médico. La epinefrina

puede disminuir su eficacia mientras su hijo toma esta medicamento.

- El riesgo de sufrir efectos secundarios puede ser mayor en mujeres. Consulte con su médico.

### **Si su hija está embarazada:**

- Informe a su médico si su hija está embarazada o queda embarazada. Deberá hablar acerca de los riesgos y beneficios de que su hija utilice este medicamento durante el embarazo.

### **¿Cuáles son los efectos secundarios por los que debo llamar al médico de mi hijo de inmediato?**

**ADVERTENCIA/PRECAUCIÓN:** a pesar de que es muy poco frecuente, algunas personas pueden sufrir efectos secundarios muy graves, y en ocasiones mortales, al tomar un medicamento. Si su hijo presenta alguno de los siguientes signos o síntomas que pueden estar relacionados con un efecto secundario muy grave, infórmelo al médico de su hijo o busque ayuda médica de inmediato:

### **Todas las presentaciones:**

- Signos de reacción alérgica tales como sarpullido; urticaria; picazón; piel enrojecida, hinchada, con ampollas o descamada, con o sin fiebre; sibilancia;

opresión en el pecho o la garganta; problemas para respirar, tragar o hablar; ronquera inusual; o hinchazón de la boca, el rostro, los labios, la lengua o la garganta.

- Mareos severos o desmayos.
- Dolor o presión en el pecho.
- Latidos cardíacos rápidos o lentos.
- Latidos cardíacos anormales que sean recientes o que hayan empeorado.
- Sudoración excesiva.
- Cambio en la vista.
- Este medicamento ha generado insuficiencia cardíaca, y las personas que ya padecían insuficiencia cardíaca, empeoraron. Informe al médico si el niño tiene alguna enfermedad del corazón. Llame a su médico de inmediato si a su hijo le falta el aire, aumenta mucho de peso, si tiene una frecuencia cardíaca que no es normal o una hinchazón en los brazos o las piernas reciente o que empeoró.

**Si su hijo es sexualmente activo o puede serlo:**

- Incapacidad de conseguir o mantener una erección.

**Inyección:**

- Dolor en la zona de la inyección.

- Irritación o inflamación en la zona en la que se aplicó la inyección.

## **¿Qué otros efectos secundarios tiene este medicamento?**

Todos los medicamentos pueden tener efectos secundarios. Sin embargo, muchas personas no padecen ningún efecto secundario o padecen solamente efectos secundarios menores. Llame al médico de su hijo o busque ayuda médica si al niño le molesta alguno de estos efectos secundarios o no desaparece:

- Se siente mareado, cansado o débil.
- Dolor de cabeza.
- Diarrea, malestar estomacal o vómitos.

Estos no son todos los efectos secundarios que podrían ocurrir. Si tiene preguntas acerca de los efectos secundarios, llame al médico de su hijo. Llame al médico de su hijo para que le aconseje acerca de los efectos secundarios.

Puede informar los efectos secundarios al organismo de salud de su país.

## **¿Cómo se administra mejor este medicamento?**

**Todos los productos orales:**

- Administre este medicamento con o sin alimentos.

- Administre este medicamento aproximadamente a la misma hora del día.
- Siga administrando este medicamento a su hijo según se lo indique el médico u otro proveedor de atención médica, aun si el niño se siente bien.

## Tabletas:

- Puede preparar un líquido (suspensión) si su hijo no puede tragar las píldoras. Consulte al médico de su hijo o al farmacéutico.
- Si se prepara un líquido (suspensión), agite bien antes de usar.

## Todos los productos líquidos:

- Mida cuidadosamente las dosis del líquido. Utilice el medidor que viene con este medicamento. Si el medicamento no lo trae, pídale al farmacéutico un dispositivo para medir este medicamento.
- No utilice cucharas soperas o cafeteras comunes para medir este medicamento. Si lo hace podría administrar una dosis demasiado alta.

## Inyección:

- Este medicamento se administra como una infusión en una vena por un periodo de tiempo.

## **¿Qué debo hacer si mi hijo no toma una dosis?**

### **Todos los productos orales:**

- Sáltese la dosis faltante y continúe con el horario habitual de su hijo.
- No le de doble dosis ni dosis adicionales.

### **Inyección:**

- Llame al médico de su hijo para obtener instrucciones.

## **¿Cómo almaceno o descarto este medicamento?**

### **Todos los productos orales:**

- Almacenar a temperatura ambiente en un lugar seco. No conservar en un baño.

### **Tabletas:**

- Si se prepara un líquido (suspensión) con las tabletas, almacénelo a temperatura ambiente. Deseche la porción que no utilice luego de 3 meses.

### **Inyección:**

- Si debe almacenar este medicamento en su hogar, hable con el médico de su hijo, la enfermera o el farmacéutico sobre las condiciones de almacenamiento.

### **Todas las presentaciones:**

- Guarde los medicamentos en un lugar seguro. Mantenga

todo medicamento fuera del alcance de los niños y las mascotas.

- Deseche los medicamentos sin usar o que hayan expirado. No los tire por el retrete ni los vierta al desagüe a menos que así se lo indiquen. Consulte con el farmacéutico si tiene preguntas sobre la mejor manera de desechar medicamentos. Pueden existir programas de devolución de medicamentos en su área.

## Datos generales sobre el medicamento

- Si los síntomas o trastornos de su hijo no mejoran o si empeoran, llame al médico de su hijo.
- No comparta el medicamento del niño con otras personas ni le de al niño el medicamento de ninguna otra persona.
- Algunos medicamentos pueden tener otro folleto informativo para el paciente. Si tiene alguna pregunta sobre este medicamento, hable con el médico de su hijo, enfermera, farmacéutico u otro proveedor de atención médica.
- Si cree que ha habido una sobredosis, llame al centro de toxicología local o busque atención médica de inmediato. Prepárese para responder qué se ingirió, qué cantidad y cuándo.

## Uso de la información por el consumidor y exención de responsabilidad

Esta información general es un resumen limitado de la información sobre el diagnóstico, el tratamiento y/o la medicación. No pretende ser exhaustivo y debe utilizarse como una herramienta para ayudar al usuario a comprender y/o evaluar las posibles opciones de diagnóstico y tratamiento. NO incluye toda la información sobre las enfermedades, los tratamientos, los medicamentos, los efectos secundarios o los riesgos que pueden aplicarse a un paciente específico. No pretende ser un consejo médico ni un sustituto del consejo médico, el diagnóstico o el tratamiento de un proveedor de atención médica basado en el examen y la evaluación del proveedor de atención médica de las circunstancias específicas y únicas de un paciente. Los pacientes deben hablar con un proveedor de atención médica para obtener información completa sobre su salud, preguntas médicas y opciones de tratamiento, incluidos los riesgos o beneficios relacionados con el uso de medicamentos. Esta información no respalda ningún tratamiento o medicamento como seguro, eficaz o aprobado para tratar a un paciente específico. UpToDate, Inc. y sus afiliados renuncian a cualquier garantía o responsabilidad relacionada con esta información o con el uso que se haga de esta. El uso de esta información se rige por las

Condiciones de uso, disponibles en  
<https://www.wolterskluwer.com/en/know/clinical-effectiveness-terms>.

**Última fecha de revisión**  
2025-08-18

**Derechos de autor**

© 2025 UpToDate, Inc. y sus licenciantes y/o afiliados.  
Todos los derechos reservados.

If you have questions or concerns, contact your healthcare provider. A member of your care team will answer Monday through Friday from 9 a.m. to 5 p.m. Outside those hours, you can leave a message or talk with another MSK provider. There is always a doctor or nurse on call. If you're not sure how to reach your healthcare provider, call 212-639-2000.

Para obtener más recursos, visite [www.mskcc.org/pe](http://www.mskcc.org/pe) y busque en nuestra biblioteca virtual.

Sotalol - Last updated on December 12, 2022

Todos los derechos son propiedad y se reservan a favor de Memorial Sloan Kettering Cancer Center



Memorial Sloan Kettering  
Cancer Center