

Topiramate

Esta información de Lexicomp® le explica lo que debe saber sobre este medicamento, por ejemplo, para qué se usa, cómo tomarlo, sus efectos secundarios y cuándo llamar a su proveedor de cuidados de la salud.

Nombres comerciales: EE. UU.

Eprontia; Qudexy XR [DSC]; Topamax; Topamax Sprinkle; Trokendi XR

Nombres comerciales: Canadá

ACH-Topiramate; AG-Topiramate; APO-Topiramate; Auro-Topiramate; DOM-Topiramate [DSC]; GLN-Topiramate; JAMP-Topiramate; MINT-Topiramate; MYLAN-Topiramate; NRA-Topiramate; PMS-Topiramate; PRO-Topiramate; SANDOZ Topiramate [DSC]; TEVA-Topiramate; Topamax; Topamax Sprinkle

¿Para qué se utiliza este medicamento?

- Este medicamento se utiliza para tratar las convulsiones.
- Este medicamento se utiliza para evitar migrañas.
- Se le puede recetar este medicamento al niño por otras razones. Consulte al médico.

¿Qué necesito decirle al médico ANTES de que mi hijo tome este medicamento?

- Si su hijo es alérgico a este medicamento, a algún componente de este medicamento, o a otros medicamentos, alimentos o sustancias. Informe a su médico acerca de esta alergia y qué síntomas ha presentado su hijo.

Este medicamento puede interactuar con otros medicamentos o trastornos.

Informe al médico y al farmacéutico todos los medicamentos que su hijo toma (sean estos recetados o de venta libre, productos naturales o vitaminas) y de los problemas de salud que padece. Debe verificar que sea seguro administrarle a su hijo este medicamento con todos sus otros medicamentos y problemas de salud. No empiece, interrumpa ni modifique la dosis de ningún medicamento que tome su hijo sin consultar antes con el médico.

¿Qué debo saber o hacer mientras mi hijo toma este medicamento?

Todas las presentaciones:

- Avise a todos los proveedores de atención médica de su hijo que el niño toma este medicamento. Esto incluye a los médicos, enfermeras, farmacéuticos y dentistas del niño.
- El niño debe evitar las tareas o las acciones que requieren un estado de alerta hasta que usted observe cómo este medicamento afecta a su hijo. Estas son actividades como andar en bicicleta, practicar deportes o usar elementos como tijeras, podadoras de césped, motocicletas eléctricas, automóviles de juguete o vehículos motorizados.
- No deje de administrar este medicamento a su hijo de forma repentina sin consultar al médico. Su hijo podría tener un mayor riesgo de padecer convulsiones. Si su hijo debe dejar de tomar este medicamento, debe hacerlo paulatinamente, según lo indique el médico.
- Controle los análisis de sangre de su hijo y otras pruebas de laboratorio según le haya indicado el médico.
- Consulte con el médico antes de que su hijo consuma marihuana, otras formas de cannabis, o medicamentos recetados o de venta libre que puedan ralentizar sus reacciones.
- Este medicamento puede causar problemas de acidez en la sangre (acidosis metabólica). Las posibilidades pueden aumentar en niños y personas con problemas renales, problemas respiratorios o diarrea. Las posibilidades pueden aumentar si su hijo toma otros medicamentos determinados, si se sometió a una cirugía o si sigue una dieta con alto contenido de grasa

llamada dieta cetogénica. Con el tiempo, la acidosis metabólica puede causar cálculos renales, problemas de huesos o problemas de crecimiento en los niños.

- Este medicamento puede aumentar el riesgo de hemorragias. A veces, las hemorragias pueden ser letales. Consulte al médico.
- Tomar este medicamento con ácido valproico puede provocar un descenso en la temperatura corporal. Esto también puede provocar cansancio, confusión o coma. Consulte con el médico de su hijo.
- Si el paciente es un niño, use este medicamento con cuidado. El riesgo de sufrir algunos efectos secundarios puede ser mayor en los niños.
- Este medicamento puede afectar el crecimiento de niños y adolescentes en algunos casos. Es posible que necesiten controles de crecimiento periódicos. Consulte al médico.

Si su hijo es sexualmente activo o puede serlo:

- Su hija debe usar un método anticonceptivo para evitar un embarazo mientras toma este medicamento.
- Las pastillas y otros métodos anticonceptivos a base de hormonas pueden perder su eficacia. Asegúrese de que su hijo/a use también algún otro método anticonceptivo, como un condón, mientras toma este medicamento.
- Consulte con el médico si su hija toma anticonceptivos hormonales y tiene cambios en el patrón de sangrado.

Si su hija está embarazada o amamantando a un bebé:

- Este medicamento puede dañar al feto si su hija lo toma durante el embarazo. Si su hija está embarazada o queda embarazada mientras toma este medicamento, llame al médico de inmediato.
- Informe al médico si está amamantando a su hijo. Deberá hablar acerca de los riesgos para el bebé.

Tabletas de liberación extendida:

- El alcohol puede interaccionar con este medicamento. Asegúrese de que su hijo no beba alcohol. Lo más importante es que no sea 6 horas antes o 6 horas después de tomar este medicamento.

Todas las demás presentaciones:

- El alcohol puede interactuar con este medicamento. Asegúrese de que su hijo no beba alcohol.

¿Cuáles son los efectos secundarios por los que debo llamar al médico de mi hijo de inmediato?

ADVERTENCIA/PRECAUCIÓN: a pesar de que es muy poco frecuente, algunas personas pueden sufrir efectos secundarios muy graves, y en ocasiones mortales, al tomar un medicamento. Si su hijo presenta alguno de los siguientes signos o síntomas que pueden estar relacionados con un efecto secundario muy grave, infórmelo al médico de su hijo o busque ayuda médica de inmediato:

- Signos de reacción alérgica tales como sarpullido; urticaria; picazón; piel enrojecida, hinchada, con ampollas o descamada, con o sin fiebre; sibilancia; opresión en el pecho o la garganta; problemas para respirar, tragar o hablar; ronquera inusual; o hinchazón de la boca, el rostro, los labios, la lengua o la garganta.
- Los signos de infección incluyen fiebre, escalofríos, dolor de garganta muy grave, dolor de oídos o senos paranasales, tos, aumento del esputo o cambio en el color del esputo, dolor para orinar, aftas o herida que no cicatriza.
- Los signos de niveles elevados de ácido en sangre (acidosis) como confusión; respiración acelerada; frecuencia cardíaca acelerada; frecuencia cardíaca que no se siente normal; dolor estomacal muy intenso, malestar estomacal o vómitos; mucho sueño; falta de aire; mucho cansancio o debilidad.
- Signos de niveles altos de amoníaco, como latidos o respiración anormales, confusión, piel pálida, latidos lentos, convulsiones, sudoración, vómitos o contracciones.

- Hematoma o hemorragia sin motivo aparente.
- Sentirse confundido, no poder concentrarse o cambiar de comportamiento.
- Problemas o pérdida de la memoria.
- Dificultad para hablar.
- Problemas para dormir.
- Modificación del equilibrio.
- Mareos o desmayos graves.
- No puede comer.
- Dolor de espalda, dolor de panza, o sangre en la orina. Pueden ser signos de cálculos renales.
- Sensación de ardor, adormecimiento u hormigueo fuera de lo común.
- Dolor de huesos.
- Dolor de pecho.
- Dolor muscular o debilidad.
- Temblores.
- Dificultad para caminar.
- Incapacidad para controlar los movimientos oculares.
- Al igual que otros medicamentos que pueden administrarse para tratar las convulsiones, este medicamento rara vez aumenta el riesgo de tener pensamientos o acciones suicidas. Es posible que exista un mayor riesgo en personas que tuvieron pensamientos o acciones suicidas en el pasado. Llame al médico de inmediato si tiene algún síntoma nuevo o que haya empeorado, como depresión, nerviosismo, inquietud, mal humor, ataques de pánico u otros cambios en el estado de ánimo o conducta. Llame al médico de inmediato si se presentan pensamientos o acciones suicidas.
- Este medicamento puede ocasionar problemas oculares muy graves. Si no se trata, puede ocasionar una pérdida permanente de la vista. Llame al médico de inmediato si su hijo tiene problemas oculares como visión borrosa u otros cambios en la visión, dolor o enrojecimiento en el ojo.

- Es muy poco común que se produjeran problemas hepáticos con este medicamento. En ocasiones, esto ocasionó la muerte. Llame al médico de su hijo de inmediato si su hijo presenta signos de problemas hepáticos, como orina color oscuro, cansancio, disminución del apetito, malestar estomacal o dolor estomacal, heces color claro, vómitos, o piel u ojos amarillentos.
- Se observaron falta de sudoración y temperaturas corporales altas con la administración de este medicamento. En ocasiones, esto ha provocado la necesidad de tratamiento en un hospital. Procure que su hijo tome las precauciones necesarias en días calurosos y cuando se encuentre activo. Llame al médico de su hijo de inmediato si su hijo tiene fiebre o no transpira durante las actividades o en temperaturas cálidas.
- Puede producirse una reacción cutánea grave (síndrome de Stevens-Johnson/necrólisis epidérmica tóxica). Puede ocasionar problemas de salud graves que no desaparecen y, en ocasiones, la muerte. Obtenga ayuda médica de inmediato si su hijo presenta signos como enrojecimiento, hinchazón, ampollas o descamación en la piel (con o sin fiebre); enrojecimiento o irritación en los ojos; o llagas en la boca, la garganta, la nariz o los ojos.

¿Qué otros efectos secundarios tiene este medicamento?

Todos los medicamentos pueden tener efectos secundarios. Sin embargo, muchas personas no padecen ningún efecto secundario o padecen solamente efectos secundarios menores. Llame al médico de su hijo o busque ayuda médica si su hijo padece efectos secundarios molestos o que no desaparecen.

- Estreñimiento, diarrea, dolor estomacal, malestar estomacal, vómitos o disminución del apetito.
- Cambios en la capacidad de percibir sabores.
- Pérdida de peso.
- Nerviosismo o excitabilidad.
- Sentirse mareado, soñoliento, cansado o débil.
- Dolor de cabeza.

- Acaloramiento.
- Signos de un resfrión común.
- Dolor en las articulaciones.

Estos no son todos los efectos secundarios que podrían ocurrir. Si tiene preguntas acerca de los efectos secundarios, llame al médico de su hijo. Llame al médico de su hijo para que le aconseje acerca de los efectos secundarios.

Puede informar los efectos secundarios al organismo de salud de su país.

¿Cómo se administra mejor este medicamento?

Administre este medicamento según las instrucciones del médico de su hijo. Lea toda la información que se le brinde. Siga todas las instrucciones con atención.

Todas las presentaciones:

- Administre este medicamento con o sin alimentos.
- Siga administrando este medicamento a su hijo según se lo indique el médico u otro proveedor de atención médica, aun si el niño se siente bien.
- Anime al niño a que beba mucho líquido sin cafeína todos los días, a menos que el médico le indique lo contrario.

Tabletas:

- El niño debe tragarla entera. Anime al niño a no masticar, romper o triturarla.

Cápsulas dispersables de liberación regular y cápsulas dispersables de liberación prolongada:

- Se puede tragar este medicamento entero o dispersarlo en una cucharada de alimento blando como el puré de manzana. No permita que su hijo lo triture o lo mastique antes de tragarlo.
- Si lo mezcla, el niño debe tragar el medicamento mezclado de inmediato. No almacene para utilizar más tarde.

- Su hijo debe beber líquido justo después de comer la mezcla de alimentos y medicamento para asegurarse de que el medicamento se ha tragado.

Tabletas de liberación extendida:

- Procure que su hija trague el medicamento entero. No permita que su hija lo mastique, abra o triture.
- no espolvoree este medicamento sobre la comida.

Solución oral:

- Mida cuidadosamente las dosis del líquido. Utilice el medidor que viene con este medicamento. Si el medicamento no lo trae, pídale al farmacéutico un dispositivo para medir este medicamento.
- No utilice cucharas soperas o cafeteras comunes para medir este medicamento. Si lo hace podría administrar una dosis demasiado alta.

¿Qué debo hacer si mi hijo no toma una dosis?

Tabletas de liberación extendida:

- Llame al médico de su hijo para obtener instrucciones.

Cápsulas dispersables de liberación prolongada:

- Administre la dosis que olvidó lo antes posible.
- Si ya casi es hora de la dosis siguiente, sáltese la dosis faltante y continúe con el horario habitual del niño.
- No administre 2 dosis simultáneamente ni administre dosis adicionales.
- Si olvida administrarle a su hijo 2 dosis, llame al médico.

Todas las demás presentaciones:

- Administre la dosis que olvidó lo antes posible.
- Si faltan menos de 6 horas para la dosis siguiente, omita la dosis faltante y continúe con el horario habitual.

- No administre 2 dosis simultáneamente ni administre dosis adicionales.
- Si olvida administrarle a su hijo 2 dosis, llame al médico.

¿Cómo almaceno o descarto este medicamento?

Todas las presentaciones:

- Almacenar a temperatura ambiente en un lugar seco. No conservar en un baño.
- Mantenga la tapa cerrada herméticamente.
- Guarde los medicamentos en un lugar seguro. Mantenga todo medicamento fuera del alcance de los niños y las mascotas.
- Deseche los medicamentos sin usar o que hayan expirado. No los tire por el retrete ni los vierta al desagüe a menos que así se lo indiquen. Consulte con el farmacéutico si tiene preguntas sobre la mejor manera de desechar medicamentos. Pueden existir programas de devolución de medicamentos en su área.

Solución oral:

- Después de 90 días de haber abierto el medicamento, deseche la porción que no administró.

Tabletas de liberación extendida:

- Proteja de la luz.

Datos generales sobre el medicamento

- Si los síntomas o trastornos de su hijo no mejoran o si empeoran, llame al médico de su hijo.
- No comparta el medicamento del niño con otras personas ni le de al niño el medicamento de ninguna otra persona.
- Algunos medicamentos pueden tener otro folleto informativo para el paciente. Si tiene alguna pregunta sobre este medicamento, hable con el médico de su hijo, enfermera, farmacéutico u otro proveedor de atención

médica.

- Si cree que ha habido una sobredosis, llame al centro de toxicología local o busque atención médica de inmediato. Prepárese para responder qué se ingirió, qué cantidad y cuándo.

Uso de la información por el consumidor y exención de responsabilidad

Esta información general es un resumen limitado de la información sobre el diagnóstico, el tratamiento y/o la medicación. No pretende ser exhaustivo y debe utilizarse como una herramienta para ayudar al usuario a comprender y/o evaluar las posibles opciones de diagnóstico y tratamiento. NO incluye toda la información sobre las enfermedades, los tratamientos, los medicamentos, los efectos secundarios o los riesgos que pueden aplicarse a un paciente específico. No pretende ser un consejo médico ni un sustituto del consejo médico, el diagnóstico o el tratamiento de un proveedor de atención médica basado en el examen y la evaluación del proveedor de atención médica de las circunstancias específicas y únicas de un paciente. Los pacientes deben hablar con un proveedor de atención médica para obtener información completa sobre su salud, preguntas médicas y opciones de tratamiento, incluidos los riesgos o beneficios relacionados con el uso de medicamentos. Esta información no respalda ningún tratamiento o medicamento como seguro, eficaz o aprobado para tratar a un paciente específico. UpToDate, Inc. y sus afiliados renuncian a cualquier garantía o responsabilidad relacionada con esta información o con el uso que se haga de esta. El uso de esta información se rige por las Condiciones de uso, disponibles en

<https://www.wolterskluwer.com/en/know/clinical-effectiveness-terms>.

Última fecha de revisión

2024-10-09

Derechos de autor

© 2025 UpToDate, Inc. y sus licenciantes y/o afiliados. Todos los derechos reservados.

If you have questions or concerns, contact your healthcare provider. A member of your care team will answer Monday through Friday from 9 a.m. to 5 p.m. Outside those hours, you can leave a message or talk with another MSK provider. There is always a doctor or nurse on call. If you're not sure how to reach your healthcare provider, call 212-639-2000.

Para obtener más recursos, visite www.mskcc.org/pe y busque en nuestra biblioteca virtual.

Topiramate - Last updated on December 12, 2022

Todos los derechos son propiedad y se reservan a favor de Memorial Sloan Kettering Cancer Center



Memorial Sloan Kettering
Cancer Center