EDUCACIÓN PARA PACIENTES Y CUIDADORES

Valproic Acid and Derivatives

Esta información de UpToDate® Lexidrug™ le explica lo que debe saber sobre este medicamento, por ejemplo, para qué se usa, cómo tomarlo, sus efectos secundarios y cuándo llamar a su proveedor de cuidados de la salud.

Nombres comerciales: EE. UU.
Depakote; Depakote ER; Depakote Sprinkles

Nombres comerciales: Canadá
APO-Divalproex; APO-Valproic Acid; Depakene; Epival; JAMP-Divalproex; JAMP-Valproic Acid; MYLAN-Divalproex; ODAN-Valproic Acid; PMS-Valproic; PMS-Valproic Acid

Advertencia
Todas las presentaciones:

- Este medicamento ha provocado problemas hepáticos. En ocasiones, estos problemas han sido mortales. Por lo general, los problemas hepáticos aparecen en los primeros 6 meses después de comenzar con la administración de este medicamento. En ocasiones, los problemas

hepáticos no desaparecieron luego de suspender el medicamento. Llame al médico de su hijo de inmediato si su hijo presenta signos de problemas hepáticos, como orina color oscuro, cansancio, disminución del apetito, malestar estomacal o dolor estomacal, heces color claro, vómitos, o piel u ojos amarillentos. En personas con convulsiones, es posible que no sea posible controlarlas.

- Controle los análisis de sangre de su hijo y otras pruebas de laboratorio según le haya indicado el médico.
- Los niños menores de 2 años de edad pueden correr un riesgo mayor de sufrir problemas hepáticos mortales. Los pacientes que toman más de 1 medicamento para tratar las convulsiones, que tienen un trastorno metabólico, un trastorno con convulsiones muy grave junto con retraso mental o padecen ciertas enfermedades del cerebro son quienes se encuentran en mayor riesgo. Consulte al médico.
- Existe un riesgo mayor de falla hepática y muerte en los pacientes que tienen un problema hepático genético causado por un trastorno mitocondrial como el síndrome de Alpers–Huttenlocher. Es posible que se le deban realizar pruebas genéticas al

niño para comprobar si tiene este problema médico. Si su hijo tiene o puede tener trastornos mitocondriales, no le administre el medicamento antes de consultar al pediatra.

- Este medicamento puede ocasionar problemas muy graves y, en ocasiones, mortales en el páncreas (pancreatitis). Esto puede suceder en niños en cualquier momento durante el tratamiento con este medicamento. Los síntomas de pancreatitis incluyen dolor de estómago, malestar estomacal, vómitos o disminución del apetito. Llame al médico de su hijo de inmediato si su hijo tiene cualquiera de estos signos.

Si su hijo es sexualmente activo o puede serlo:

- Si su hija está embarazada o puede quedar embarazada, consulte con el médico para asegurarse de que este medicamento es adecuado para ella. Su hija debe usar un método anticonceptivo para evitar un embarazo mientras toma este medicamento.

Si su hija está o podría estar embarazada.

- Este medicamento puede causar defectos de nacimiento graves si su hija lo toma durante el embarazo. También puede causar que el bebé tenga un coeficiente intelectual más bajo y puede

aumentar el riesgo de autismo o TDAH. Si su hija queda embarazada mientras toma este medicamento, consulte al médico de inmediato.

- No administre este medicamento para evitar las migrañas si su hija está embarazada o si no está utilizando métodos anticonceptivos para evitar embarazos.

Todos los productos orales:

- Este medicamento viene con una hoja de información adicional para el paciente llamada Guía de medicación. Léala de nuevo con cuidado cada vez que reponga este medicamento. Si tiene alguna pregunta sobre este medicamento, hable con el médico, farmacéutico u otro proveedor de atención médica.

¿Para qué se utiliza este medicamento?

- Este medicamento se utiliza para tratar las convulsiones.
- Este medicamento se utiliza para evitar migrañas.
- Se utiliza para tratar el trastorno bipolar.
- Se le puede recetar este medicamento al niño por otras razones. Consulte al médico.

¿Qué necesito decirle al médico ANTES de que mi hijo tome este medicamento?

- Si su hijo es alérgico a este medicamento, a algún componente de este medicamento, o a otros medicamentos, alimentos o sustancias. Informe a su médico acerca de esta alergia y qué síntomas ha presentado su hijo.
- Si el niño tiene alguno de los siguientes problemas de salud: enfermedad hepática o un trastorno en el ciclo de la urea.

Esta no es una lista de todos los medicamentos o trastornos que pueden interactuar con este medicamento.

Informe al médico y al farmacéutico todos los medicamentos que su hijo toma (sean estos recetados o de venta libre, productos naturales o vitaminas) y de los problemas de salud que padece. Debe verificar que sea seguro administrarle a su hijo este medicamento con todos sus otros medicamentos y problemas de salud. No empiece, interrumpa ni modifique la dosis de ningún medicamento que tome su hijo sin consultar antes con el médico.

¿Qué debo saber o hacer mientras mi hijo toma este medicamento?

Para todos los usos de este medicamento:

- Avise a todos los proveedores de atención médica de su hijo que el niño toma este medicamento. Esto incluye a los médicos, enfermeras, farmacéuticos y dentistas del niño.
- El niño debe evitar las tareas o las acciones que requieren un estado de alerta hasta que usted observe cómo este medicamento afecta a su hijo. Estas son actividades como andar en bicicleta, practicar deportes o usar elementos como tijeras, podadoras de césped, motocicletas eléctricas, automóviles de juguete o vehículos motorizados.
- El alcohol puede interactuar con este medicamento. Asegúrese de que su hijo no beba alcohol.
- Consulte con el médico antes de que su hijo consuma marihuana, otras formas de cannabis, o medicamentos recetados o de venta libre que puedan ralentizar sus reacciones.
- Este medicamento puede afectar ciertas pruebas de laboratorio. Avise a todos los proveedores de atención médica y bioquímicos de su hijo que su hijo toma este medicamento.
- Si su hija no puede comer ni beber con normalidad, consulte al médico de su hija. Esto incluye si su hija está enferma, en ayunas, o por someterse a algún

procedimiento o cirugía.

- Algunas marcas de este medicamento contienen aceite de maní. Si su hijo es alérgico al maní, consulte con el farmacéutico para averiguar si la marca que utiliza su hijo contiene aceite de maní.
- Es posible que el niño sangre más fácilmente. Asegúrese de que su hijo tenga cuidado y evite lesionarse. Asegúrese de que su hijo tenga un cepillo de dientes suave.
- Se han presentado niveles altos de amoníaco con el uso de este medicamento. Esto puede ocasionar ciertos problemas cerebrales. En algunas personas, esto ha resultado fatal. Consulte con su médico.
- Algunas personas han tenido ciertos problemas cerebrales sin niveles altos de amoníaco. En algunos casos, estos problemas cerebrales desaparecieron luego de suspender el medicamento. Sin embargo, en otros casos, no han vuelto a la normalidad por completo. Consulte con el médico.
- Este medicamento puede afectar la fertilidad del hombre. Consulte al médico.

Si su hijo es sexualmente activo o puede serlo:

- Si su hija puede quedar embarazada, consulte al médico sobre el método anticonceptivo que es mejor para ella.

Su hija también puede necesitar tomar un suplemento de ácido fólico mientras esté tomando este medicamento.

Si su hija está amamantando a un bebé:

- Informe al médico si está amamantando a su hijo. Deberá hablar acerca de los riesgos para el bebé.

Para convulsiones:

- Si las convulsiones son diferentes o empeoran después de comenzar a tomar este medicamento, consulte con el médico.

¿Cuáles son los efectos secundarios por los que debo llamar al médico de mi hijo de inmediato?

ADVERTENCIA/PRECAUCIÓN: a pesar de que es muy poco frecuente, algunas personas pueden sufrir efectos secundarios muy graves, y en ocasiones mortales, al tomar un medicamento. Si su hijo presenta alguno de los siguientes signos o síntomas que pueden estar relacionados con un efecto secundario muy grave, infórmelo al médico de su hijo o busque ayuda médica de inmediato:

- Signos de reacción alérgica tales como sarpullido; urticaria; picazón; piel enrojecida, hinchada, con ampollas o descamada, con o sin fiebre; sibilancia;

opresión en el pecho o la garganta; problemas para respirar, tragar o hablar; ronquera inusual; o hinchazón de la boca, el rostro, los labios, la lengua o la garganta.

- Los signos de infección incluyen fiebre, escalofríos, dolor de garganta muy grave, dolor de oídos o senos paranasales, tos, aumento del esputo o cambio en el color del esputo, dolor para orinar, aftas o herida que no cicatriza.
- Signos de niveles altos de amoníaco, como latidos o respiración anormales, confusión, piel pálida, latidos lentos, convulsiones, sudoración, vómitos o contracciones.
- Dolor de pecho.
- Hinchazón en los brazos o las piernas.
- Cambio en la vista.
- Problemas o pérdida de la memoria.
- Modificación del equilibrio.
- Dificultad para caminar.
- Hematoma o hemorragia sin motivo aparente.
- Manchas púrpura o enrojecimiento de la piel.
- No puede orinar o notó un cambio en la cantidad de la orina.
- Dolor muscular o debilidad.

- Dolor o inflamación en las articulaciones.
- Temblores.
- Incapacidad para controlar los movimientos oculares.
- Zumbido en los oídos.
- Siente frío.
- Al igual que otros medicamentos que pueden administrarse para tratar las convulsiones, este medicamento rara vez aumenta el riesgo de tener pensamientos o acciones suicidas. Es posible que exista un mayor riesgo en personas que tuvieron pensamientos o acciones suicidas en el pasado. Llame al médico de inmediato si tiene algún síntoma nuevo o que haya empeorado, como depresión, nerviosismo, inquietud, mal humor, ataques de pánico u otros cambios en el estado de ánimo o conducta. Llame al médico de inmediato si se presentan pensamientos o acciones suicidas.
- Se ha producido una reacción muy grave llamada angioedema con la administración de este medicamento. A veces, esto podría poner su vida en riesgo. Los signos pueden incluir hinchazón de las manos, la cara, los labios, los ojos, la lengua o la garganta; problemas para respirar; problemas para tragar; o una ronquera inusual. Obtenga ayuda médica

de inmediato si su hijo presenta alguno de estos signos.

- Se pueden producir reacciones cutáneas graves con este medicamento. Estas incluyen el síndrome de Stevens-Johnson (SJS), la necrólisis epidérmica tóxica (TEN) y otras reacciones graves. A veces, los órganos del cuerpo también pueden verse afectados. Estas reacciones pueden ser mortales. Busque ayuda médica de inmediato si su hijo presenta signos como piel roja, hinchada, con ampollas o descamación; ojos rojos o irritados; llagas en la boca, garganta, nariz, ojos, genitales o cualquier zona de la piel; fiebre; escalofríos; dolores corporales; falta de aire; o inflamación de los ganglios.

¿Qué otros efectos secundarios tiene este medicamento?
Todos los medicamentos pueden tener efectos secundarios. Sin embargo, muchas personas no padecen ningún efecto secundario o padecen solamente efectos secundarios menores. Llame al médico de su hijo o busque ayuda médica si al niño le molesta alguno de estos efectos secundarios o no desaparece:

- Dolor de cabeza.
- Estreñimiento, diarrea, dolor estomacal, malestar estomacal, vómitos o disminución del apetito.
- Aumento del apetito.

- Ardor de estómago, sensación de llenura o hinchazón después de comer.
- Se siente mareado, cansado o débil.
- Problemas para dormir.
- Aumento o pérdida de peso.
- Pérdida del pelo.
- Nerviosismo o excitabilidad.
- Síntomas similares a los de la gripe.

Estos no son todos los efectos secundarios que podrían ocurrir. Si tiene preguntas acerca de los efectos secundarios, llame al médico de su hijo. Llame al médico de su hijo para que le aconseje acerca de los efectos secundarios.

Puede informar los efectos secundarios al organismo de salud de su país.

¿Cómo se administra mejor este medicamento?

Administre este medicamento según las instrucciones del médico de su hijo. Lea toda la información que se le brinde. Siga todas las instrucciones con atención.

Todos los productos orales:

- Administre este medicamento con o sin alimentos. Se debe administrar con alimentos si produce malestar

estomacal.

- Siga administrando este medicamento a su hijo según se lo indique el médico u otro proveedor de atención médica, aun si el niño se siente bien.
- No deje de administrar este medicamento a su hijo de forma repentina sin consultar al médico. Su hijo podría tener un mayor riesgo de padecer convulsiones. Si su hijo debe dejar de tomar este medicamento, debe hacerlo paulatinamente, según lo indique el médico.
- Si su hijo toma colestiramina, podría necesitar tomarla en un momento distinto al que toma este medicamento. Consulte con el farmacéutico.

Tabletas y cápsulas:

- El niño debe tragarla entera. Anime al niño a no masticar, romper o triturarla.
- Administre este medicamento con un vaso de agua completo.
- Si el niño tiene problemas al tragar, hable con un un proveedor de salud médica.

Tabletas de acción prolongada:

- Llame al médico si usted o el niño notan partes de este medicamento en las heces.

Cápsulas dispersables:

- El niño puede tragar el contenido de la cápsula entero o mezclarlo con ciertos alimentos como el puré de manzana. El niño debe consumir la mezcla inmediatamente. No almacene para un uso posterior.
- No permita que su hijo o hija mastique la mezcla.
- Llame al médico si usted o el niño notan partes de este medicamento en las heces.

Líquido:

- Mida cuidadosamente las dosis del líquido. Utilice el medidor que viene con este medicamento. Si el medicamento no lo trae, pídale al farmacéutico un dispositivo para medir este medicamento.

Inyección:

- Este medicamento se administra como una infusión en una vena por un periodo de tiempo.

¿Qué debo hacer si mi hijo no toma una dosis?
Todos los productos orales:

- Administre la dosis que olvidó lo antes posible.
- Si ya casi es hora de la dosis siguiente, sáltese la dosis faltante y continúe con el horario habitual del niño.
- No administre 2 dosis simultáneamente ni administre

dosis adicionales.

Inyección:

- Llame al médico de su hijo para obtener instrucciones.

¿Cómo almaceno o descarto este medicamento?

Todos los productos orales:

- Almacenar a temperatura ambiente en un lugar seco. No conservar en un baño.

Inyección:

- Si debe almacenar este medicamento en su hogar, hable con el médico de su hijo, la enfermera o el farmacéutico sobre las condiciones de almacenamiento.

Todas las presentaciones:

- Guarde los medicamentos en un lugar seguro. Mantenga todo medicamento fuera del alcance de los niños y las mascotas.
- Deseche los medicamentos sin usar o que hayan expirado. No los tire por el retrete ni los vierta al desagüe a menos que así se lo indiquen. Consulte con el farmacéutico si tiene preguntas sobre la mejor manera de desechar medicamentos. Pueden existir programas de devolución de medicamentos en su área.

Datos generales sobre el medicamento

- Si los síntomas o trastornos de su hijo no mejoran o si empeoran, llame al médico de su hijo.
- No comparta el medicamento del niño con otras personas ni le de al niño el medicamento de ninguna otra persona.
- Algunos medicamentos pueden tener otro folleto informativo para el paciente. Si tiene alguna pregunta sobre este medicamento, hable con el médico de su hijo, enfermera, farmacéutico u otro proveedor de atención médica.
- Si cree que ha habido una sobredosis, llame al centro de toxicología local o busque atención médica de inmediato. Prepárese para responder qué se ingirió, qué cantidad y cuándo.

Uso de la información por el consumidor y exención de responsabilidad

Esta información general es un resumen limitado de la información sobre el diagnóstico, el tratamiento y/o la medicación. No pretende ser exhaustivo y debe utilizarse como una herramienta para ayudar al usuario a comprender y/o evaluar las posibles opciones de diagnóstico y tratamiento. NO incluye toda la información sobre las enfermedades, los tratamientos, los medicamentos, los efectos secundarios o los riesgos que pueden aplicarse a un paciente específico. No pretende

ser un consejo médico ni un sustituto del consejo médico, el diagnóstico o el tratamiento de un proveedor de atención médica basado en el examen y la evaluación del proveedor de atención médica de las circunstancias específicas y únicas de un paciente. Los pacientes deben hablar con un proveedor de atención médica para obtener información completa sobre su salud, preguntas médicas y opciones de tratamiento, incluidos los riesgos o beneficios relacionados con el uso de medicamentos. Esta información no respalda ningún tratamiento o medicamento como seguro, eficaz o aprobado para tratar a un paciente específico. UpToDate, Inc. y sus afiliados renuncian a cualquier garantía o responsabilidad relacionada con esta información o con el uso que se haga de esta. El uso de esta información se rige por las Condiciones de uso, disponibles en https://www.wolterskluwer.com/en/know/clinical-effectiveness-terms.

Última fecha de revisión
2026-05-01

Derechos de autor
© 2026 UpToDate, Inc. y sus licenciantes y/o afiliados. Todos los derechos reservados.

Si tiene preguntas o inquietudes, contáctese con su proveedor de cuidados de la salud. Un integrante de su equipo de atención le responderá de lunes a viernes de 9 a. m. a 5 p. m. Fuera de ese horario, puede dejar un mensaje o hablar con otro proveedor de MSK. Siempre hay un médico o un enfermero de guardia. Si no está seguro de cómo comunicarse con su proveedor de cuidados de la salud, llame al 212-639-2000.

Para obtener más recursos, visite www.mskcc.org/pe y busque en nuestra biblioteca virtual.

Todos los derechos son propiedad y se reservan a favor de Memorial Sloan Kettering Cancer Center



Memorial Sloan Kettering Cancer Center