

EDUCACIÓN PARA PACIENTES Y CUIDADORES

Zolmitriptan

Esta información de Lexicomp® le explica lo que debe saber sobre este medicamento, por ejemplo, para qué se usa, cómo tomarlo, sus efectos secundarios y cuándo llamar a su proveedor de cuidados de la salud.

Nombres comerciales: EE. UU.

Zomig

Nombres comerciales: Canadá

AURO-Zolmitriptan; BIO-Zolmitriptan; CCP-Zolmitriptan [DSC]; DOM-Zolmitriptan [DSC]; JAMP Zolmitriptan; JAMP-Zolmitriptan; JAMP-Zolmitriptan ODT [DSC]; Mar-Zolmitriptan; MINT-Zolmitriptan; NAT-Zolmitriptan; NRA-Zolmitriptan; SANDOZ Zolmitriptan; SANDOZ Zolmitriptan ODT; TEVA-Zolmitriptan; TEVA-Zolmitriptan OD; Zomig; Zomig Rapimelt

¿Para qué se utiliza este medicamento?

- Este medicamento se utiliza para tratar la jaqueca.

Tabletas y tabletas de disolución oral:

- Este medicamento no es apto para ser utilizado en

menores de 18 años. Consulte con su médico.

- Si el niño ha estado recibiendo esta forma de este medicamento, consulte al médico la información sobre los riesgos y beneficios. Consulte con su médico si tiene preguntas o dudas sobre el hecho de administrarle este medicamento a su hijo.

¿Qué necesito decirle al médico ANTES de que mi hijo tome este medicamento?

- Si su hijo es alérgico a este medicamento, a algún componente de este medicamento, o a otros medicamentos, alimentos o sustancias. Informe a su médico acerca de esta alergia y qué síntomas ha presentado su hijo.
- Si su hijo tiene cualquiera de los siguientes problemas de salud: presión arterial alta o enfermedad hepática.
- Si su hijo presentó alguna vez algunos de los siguientes problemas de salud: presión o dolor en el pecho, arterias tapadas que van hacia a las piernas o brazos, ataque cardíaco, enfermedad cardíaca, flujo sanguíneo insuficiente en el corazón, el cerebro, los intestinos o los riñones, accidente cerebrovascular o ataque isquémico transitorio (AIT), migrañas, como migrañas hemipléjicas o basilares, o latidos del corazón anormales, como el síndrome de Wolff-Parkinson-White.

- Si su hijo ha tomado ciertos medicamentos para tratar la depresión, como isocarboxazida, fenelzina o tranilcipromina, en los últimos 14 días. El uso de este medicamento en el plazo de 14 días luego de haber tomado esos otros medicamentos puede ocasionar presión arterial alta muy grave.
- Si su hijo/a ha tomado almotriptán, eletriptán, frovatriptán, naratriptán, rizatriptán o sumatriptán durante las últimas 24 horas.
- Si el niño ha tomado ergotamina, metisergida, dihidroergotamina u otro medicamento similar durante las últimas 24 horas.

Esta no es una lista de todos los medicamentos o trastornos que pueden interactuar con este medicamento.

Informe al médico y al farmacéutico todos los medicamentos que su hijo toma (sean estos recetados o de venta libre, productos naturales o vitaminas) y de los problemas de salud que padece. Debe verificar que sea seguro administrarle a su hijo este medicamento con todos sus otros medicamentos y problemas de salud. No empiece, interrumpa ni modifique la dosis de ningún medicamento que tome su hijo sin consultar antes con el médico.

¿Qué debo saber o hacer mientras mi hijo toma este

medicamento?

- Avise a todos los proveedores de atención médica de su hijo que el niño toma este medicamento. Esto incluye a los médicos, enfermeras, farmacéuticos y dentistas del niño.
- El niño debe evitar las tareas o las acciones que requieren un estado de alerta hasta que usted observe cómo este medicamento afecta a su hijo. Estas son actividades como andar en bicicleta, practicar deportes o usar elementos como tijeras, podadoras de césped, motocicletas eléctricas, automóviles de juguete o vehículos motorizados.
- Este medicamento no se indica para evitar o disminuir la cantidad de dolores de cabeza por migraña de su hijo/a. Consulte con el médico.
- Si el niño tiene un dolor de cabeza que no se asemeja a las migrañas normales, consulte al médico antes de administrar este medicamento.
- Administrar más cantidad de medicamento (una dosis mayor, o más a menudo) de lo que le indicó el médico puede hacer que los dolores de cabeza empeoren.
- Se han presentado casos de presión arterial alta con medicamentos como este. Controle la presión arterial de su hijo según le haya indicado el médico.

- Tenga cuidado si su hijo tiene riesgos de enfermedad cardíaca (hipertensión, colesterol alto, sobrepeso, azúcar alta en sangre, diabetes, tabaquismo u otro consumo de nicotina, o tiene miembros de la familia con enfermedad cardíaca temprana). Consulte con el médico.

Si su hija está embarazada o amamantando a un bebé:

- Consulte al médico si su hija está embarazada, queda embarazada o está amamantando a un bebé. Tendrá que hablar acerca de los riesgos y beneficios para su hija y el bebé.

¿Cuáles son los efectos secundarios por los que debo llamar al médico de mi hijo de inmediato?

ADVERTENCIA/PRECAUCIÓN: a pesar de que es muy poco frecuente, algunas personas pueden sufrir efectos secundarios muy graves, y en ocasiones mortales, al tomar un medicamento. Si su hijo presenta alguno de los siguientes signos o síntomas que pueden estar relacionados con un efecto secundario muy grave, infórmelo al médico de su hijo o busque ayuda médica de inmediato:

- Signos de reacción alérgica tales como sarpullido; urticaria; picazón; piel enrojecida, hinchada, con ampollas o descamada, con o sin fiebre; sibilancia;

opresión en el pecho o la garganta; problemas para respirar, tragar o hablar; ronquera inusual; o hinchazón de la boca, el rostro, los labios, la lengua o la garganta.

- Signos de alta presión como dolores de cabeza o mareos muy graves, desmayos o cambios en la visión.
- Cambio en la vista.
- Pérdida de la vista. Esto puede durar durante mucho tiempo.
- Diarrea o estreñimiento.
- Dolor estomacal intenso o diarrea con sangre.
- Pérdida de peso.
- Calambres en las piernas.
- Sensación de pesadez o rigidez en los músculos de las piernas.
- Siente frío.
- Ardor o dolor persistente en los pies o los dedos de los pies.
- Falta de aire.
- Sensación de ardor, adormecimiento u hormigueo fuera de lo común.
- Puede provocar un problema grave, y a veces mortal, denominado síndrome de serotonina. El riesgo puede

ser mayor si su hijo también toma otros medicamentos determinados. Llame al médico de su hijo de inmediato si tiene agitación, problemas de equilibrio, confusión, alucinaciones, fiebre, latidos cardíacos anormales o rápidos, enrojecimiento de la piel, entumecimiento o contracciones musculares, convulsiones, escalofríos o temblores, sudoración excesiva, diarrea intensa, malestar estomacal o vómitos o dolor de cabeza muy intenso.

- En raras ocasiones se informaron problemas cardíacos muy graves y a veces mortales, como ataque cardíaco o frecuencia cardíaca anormal después de unas horas de la toma de este medicamento. Llame al médico de inmediato si el niño siente rigidez, dolor, presión o pesadez en el pecho, garganta, cuello o quijada, si sufre de sudoración fría, falta de aire, frecuencia cardíaca acelerada, frecuencia cardíaca anormal, o mareos fuertes o desmayos.
- En raras ocasiones, se informaron problemas graves, y en ocasiones mortales, en los vasos sanguíneos del cerebro, como accidentes cerebrovasculares, debido a la ingesta de este medicamento. Llame al médico del niño de inmediato si el niño tiene debilidad en 1 lado del cuerpo, dificultades para hablar o pensar, cambios en el equilibrio, caída en 1 lado de la cara o cambios en la

visión.

¿Qué otros efectos secundarios tiene este medicamento?

Todos los medicamentos pueden tener efectos secundarios. Sin embargo, muchas personas no padecen ningún efecto secundario o padecen solamente efectos secundarios menores. Llame al médico de su hijo o busque ayuda médica si al niño le molesta alguno de estos efectos secundarios o no desaparece:

- Sentirse mareado, soñoliento, cansado o débil.
- Sensación de calor.
- Sensación de pesadez u opresión.
- Boca seca.
- Náusea o vómito.
- Cambios en la capacidad de percibir sabores.
- Irritación nasal.

Estos no son todos los efectos secundarios que podrían ocurrir. Si tiene preguntas acerca de los efectos secundarios, llame al médico de su hijo. Llame al médico de su hijo para que le aconseje acerca de los efectos secundarios.

Puede informar los efectos secundarios al organismo de salud de su país.

¿Cómo se administra mejor este medicamento?

Administre este medicamento según las instrucciones del médico de su hijo. Lea toda la información que se le brinde. Siga todas las instrucciones con atención.

- No administre este medicamento por boca. Solo para nariz. No acercar a la boca ni los ojos del niño (puede quemar).
- El niño debe sonarse la nariz antes de usar este medicamento.
- Rocíe una sola dosis en 1 de los orificios nasales lo antes posible luego de que el ataque haya comenzado.
- Si, luego de que su hijo tome una dosis, no mejora el dolor de cabeza, mejora pero reaparece o si solo tiene un poco de alivio, hable con el médico antes de administrarle otra dosis.

¿Qué debo hacer si mi hijo no toma una dosis?

- Este medicamento se administra según sea necesario. No administre al niño con mayor frecuencia que la indicada por el médico.

¿Cómo almaceno o descarto este medicamento?

- Almacenar a temperatura ambiente protegido de la luz. Mantener en un lugar seco. No conservar en un baño.

- Guarde los medicamentos en un lugar seguro. Mantenga todo medicamento fuera del alcance de los niños y las mascotas.
- Deseche los medicamentos sin usar o que hayan expirado. No los tire por el retrete ni los vierta al desagüe a menos que así se lo indiquen. Consulte con el farmacéutico si tiene preguntas sobre la mejor manera de desechar medicamentos. Pueden existir programas de devolución de medicamentos en su área.

Datos generales sobre el medicamento

- Si los síntomas o trastornos de su hijo no mejoran o si empeoran, llame al médico de su hijo.
- No comparta el medicamento del niño con otras personas ni le de al niño el medicamento de ninguna otra persona.
- Algunos medicamentos pueden tener otro folleto informativo para el paciente. Si tiene alguna pregunta sobre este medicamento, hable con su médico, enfermera, farmacéutico u otro proveedor de atención médica.
- Si cree que ha habido una sobredosis, llame al centro de toxicología local o busque atención médica de inmediato. Prepárese para responder qué se ingirió, qué cantidad y cuándo.

Uso de la información por el consumidor y exención de responsabilidad

Esta información general es un resumen limitado de la información sobre el diagnóstico, el tratamiento y/o la medicación. No pretende ser exhaustivo y debe utilizarse como una herramienta para ayudar al usuario a comprender y/o evaluar las posibles opciones de diagnóstico y tratamiento. NO incluye toda la información sobre las enfermedades, los tratamientos, los medicamentos, los efectos secundarios o los riesgos que pueden aplicarse a un paciente específico. No pretende ser un consejo médico ni un sustituto del consejo médico, el diagnóstico o el tratamiento de un proveedor de atención médica basado en el examen y la evaluación del proveedor de atención médica de las circunstancias específicas y únicas de un paciente. Los pacientes deben hablar con un proveedor de atención médica para obtener información completa sobre su salud, preguntas médicas y opciones de tratamiento, incluidos los riesgos o beneficios relacionados con el uso de medicamentos. Esta información no respalda ningún tratamiento o medicamento como seguro, eficaz o aprobado para tratar a un paciente específico. UpToDate, Inc. y sus afiliados renuncian a cualquier garantía o responsabilidad relacionada con esta información o con el uso que se haga de esta. El uso de esta información se rige por las

Condiciones de uso, disponibles en <https://www.wolterskluwer.com/en/know/clinical-effectiveness-terms>.

Última fecha de revisión

2023-02-01

Derechos de autor

© 2026 UpToDate, Inc. y sus licenciantes y/o afiliados.
Todos los derechos reservados.

If you have questions or concerns, contact your healthcare provider. A member of your care team will answer Monday through Friday from 9 a.m. to 5 p.m. Outside those hours, you can leave a message or talk with another MSK provider. There is always a doctor or nurse on call. If you're not sure how to reach your healthcare provider, call 212-639-2000.

Para obtener más recursos, visite www.mskcc.org/pe y busque en nuestra biblioteca virtual.

Zolmitriptan - Last updated on December 12, 2022

Todos los derechos son propiedad y se reservan a favor de Memorial Sloan Kettering Cancer Center



Memorial Sloan Kettering
Cancer Center