



## EDUCACIÓN DE PACIENTES Y CUIDADORES

# Mefloquine

Esta información de Lexicomp® le explica lo que debe saber sobre este medicamento, por ejemplo, para qué se usa, cómo tomarlo, sus efectos secundarios y cuándo llamar a su proveedor de cuidados de la salud.

## Marcas canadienses

Mefloquine

## Advertencia

- Este medicamento puede causar mareos, pérdida del equilibrio, zumbido en los oídos, ansiedad, paranoia, falta de ánimo (depresión), convulsiones, pensamiento poco claro o ilógico, cambios de humor, cambios en las acciones o alucinaciones. Estos efectos secundarios pueden durar algunos meses o pueden ser a largo plazo y no desaparecer luego de suspender el medicamento. No administre este medicamento para prevenir la malaria si su hijo tiene problemas mentales o anímicos. Llame al médico de su hijo de inmediato si su hijo tiene algunos de estos efectos secundarios.

## ¿Para qué se usa este medicamento?

- Este medicamento se utiliza para tratar o evitar la malaria.

## ¿Qué debo informar al médico ANTES de que mi hijo/hija tome este medicamento?

- Si su hijo tiene alergia a este medicamento o a alguno de sus componentes.
- Si el niño es alérgico a la quinidina o a la quinina.
- Si su hijo es alérgico a algún medicamento como este o a otros medicamentos, alimentos o sustancias. Informe al médico acerca de la alergia y qué síntomas presentó su hijo, tales como sarpullido; urticaria; picazón; falta de aire; sibilancias; tos; inflamación de la cara, los labios, la lengua o la garganta o cualquier otro síntoma.
- Si su hijo alguna vez tuvo alguno de los siguientes problemas de salud: ansiedad, falta de ánimo (depresión), cualquier otro problema anímico o convulsiones.
- Si su hijo toma cualquiera de los siguientes medicamentos: cloroquina, quinidina o quinina.
- Si su hijo toma cualquiera de los siguientes medicamentos: halofantrina o ketoconazol. No administre estos medicamentos durante 15 semanas después de la última dosis de este medicamento que tomó su hijo.
- Si a su hijo/a le administraron una vacuna viva recientemente.

Esta no es una lista de todos los medicamentos o trastornos que pueden interactuar con este medicamento.

Informe al médico y al farmacéutico todos los medicamentos

que su hijo toma (sean estos recetados o de venta libre, productos naturales o vitaminas) y de los problemas de salud que padece. Debe verificar que sea seguro para su hijo tomar este medicamento con todos sus otros medicamentos y problemas de salud. No empiece, interrumpa ni modifique la dosis de ningún medicamento que tome su hijo sin consultar antes con el médico.

## **¿Hay algo que deba saber o hacer mientras mi hijo/hija toma este medicamento?**

### **Para todos los usos de este medicamento:**

- Avise a todos los proveedores de atención médica de su hijo que el niño toma este medicamento. Esto incluye a los médicos, enfermeras, farmacéuticos y dentistas del niño.
- El niño debe evitar las tareas o las acciones que requieren un estado de alerta hasta que usted observe cómo este medicamento afecta a su hijo. Estas son actividades como andar en bicicleta, practicar deportes o usar elementos como tijeras, podadoras de césped, motocicletas eléctricas, automóviles de juguete o vehículos motorizados.
- Mantenga consigo la tarjeta de seguridad del paciente en todo momento.
- Si el niño toma este medicamento durante un largo período de tiempo, hágale un análisis de sangre. Comuníquese con el proveedor de salud médica.
- Haga que el niño se someta a un examen de la vista según las indicaciones del médico.

- Este medicamento puede aumentar las probabilidades de tener convulsiones en algunas personas, incluso en aquellas que ya han tenido convulsiones anteriormente. Hable con el médico para saber si su hijo tiene mayores posibilidades de tener convulsiones durante la administración de este medicamento.
- Este medicamento puede afectar la cantidad de otros medicamentos presente en el organismo. Si su hijo toma otros medicamentos, consulte con el médico. Es posible que deban controlar los análisis de sangre de su hijo con mayor atención mientras tome este medicamento junto con otros medicamentos.
- Úselo con precaución en los niños. Hable con el médico.

### **Si su hijo es sexualmente activo o puede serlo:**

- Procure que su hija use un método anticonceptivo para prevenir el embarazo mientras toma este medicamento y durante 3 meses después de dejar de tomarlo.

### **Si su hija está embarazada o amamantando a un bebé:**

- Si su hija queda embarazada mientras toma este medicamento o en los 3 meses posteriores a la última dosis, llame al médico de inmediato.
- Informe al médico si está amamantando a su hijo. Deberá hablar acerca de los riesgos para el bebé.

### **Prevención de malaria:**

- Es preciso aplicar otras medidas de protección junto con este medicamento, tales como el uso de malla mosquitero, redes para la cama, insecticidas (10% al 35% DEET), y permetrina en aerosol para la ropa y las redes de protección. Evite rociar a los niños con la mayoría de los insecticidas. Disminuya la actividad nocturna al aire libre.
- Llame al médico de su hijo de inmediato si su hijo tiene fiebre después de abandonar una zona con presencia de malaria.
- Si su hija está embarazada y está viajando a un lugar infestado de malaria, hable primero con el médico sobre los riesgos.

### **¿Cuáles son los efectos secundarios por los que debo llamar al médico de mi hijo/hija de inmediato?**

**ADVERTENCIA/PRECAUCIÓN:** a pesar de que es muy poco frecuente, algunas personas pueden sufrir efectos secundarios muy graves, y en ocasiones mortales, al tomar un medicamento. Si su hijo presenta alguno de los siguientes signos o síntomas que pueden estar relacionados con un efecto secundario muy grave, infórmelo al médico de su hijo o busque ayuda médica de inmediato:

- Signos de reacción alérgica tales como sarpullido; urticaria; picazón; piel enrojecida, hinchada, con ampollas o descamada, con o sin fiebre; sibilancia; opresión en el pecho o la garganta; problemas para respirar, tragar o hablar;

ronquera inusual; o hinchazón de la boca, el rostro, los labios, la lengua o la garganta.

- Síntomas de problemas en el hígado como orina oscura, cansancio, falta de apetito, malestar o dolor estomacal, heces de color claro, vómitos o piel o ojos amarillentos.
- Dolor o presión en el pecho, o pulso acelerado.
- Latido cardíaco lento.
- Pulso que no se siente normal.
- Mareos severos o desmayos.
- Cambios en la visión, dolor en el ojo o irritación ocular grave.
- Incapacidad para dormir.
- Agitación.
- Algunas personas que tomaban este medicamento han cometido suicidio. Se desconoce si el medicamento fue el motivo. Comuníquelo al médico de su hijo si este está pensando en suicidarse.
- Este medicamento ha provocado problemas de cuidado con los recuentos de glóbulos. Esto incluye un tipo de anemia, que se denomina anemia aplásica, y un tipo de recuento bajo de glóbulos blancos. Informe de inmediato al médico si su hijo presenta cualquier síntoma de fiebre o escalofrío, falta de aire, sensación de mucho cansancio o debilidad, cualquier hematoma o hemorragia inexplicable o “manchas” moradas en la piel.

## **¿Qué otros efectos secundarios tiene este medicamento?**

Todos los medicamentos pueden tener efectos secundarios. Sin embargo, muchas personas no padecen ningún efecto secundario o padecen solamente efectos secundarios menores. Llame al médico de su hijo o busque ayuda médica si al niño le molesta alguno de estos efectos secundarios o no desaparece:

- Dolor de cabeza.
- Náusea o vómito.
- Dolor abdominal.
- Diarrea.
- No tiene apetito.
- Dolor muscular.
- Se siente cansado o débil.

Estos no son todos los efectos secundarios que podrían ocurrir. Si tiene preguntas acerca de los efectos secundarios, llame al médico de su hijo. Llame al médico de su hijo para que le aconseje acerca de los efectos secundarios.

Puede informar los efectos secundarios al organismo de salud de su país.

## **¿Cuál es la mejor forma de tomarlo?**

Administre este medicamento según las instrucciones del médico de su hijo. Lea toda la información que se le brinde. Siga todas las instrucciones con atención.

## **Para todos los usos de este medicamento:**

- Administre este medicamento con la comida más abundante del día.
- No administre este medicamento en ayunas.
- Administre este medicamento con un vaso de agua completo.
- La tableta puede triturarse y mezclarse con agua, leche o cualquier otro líquido.
- Para sacar el mayor provecho de este medicamento, no permita que el niño se salte ninguna dosis.
- Siga administrando este medicamento a su hijo según se lo indique el médico u otro proveedor de atención médica, aun si el niño se siente bien.
- Llame al médico para pedirle nuevas instrucciones sobre qué hacer si su hijo vomita después de tomar una dosis de este medicamento.

## **Prevención de malaria:**

- Administre según las instrucciones para ayudar a evitar la malaria.
- Si este medicamento se consume para prevenir la malaria, inicie la administración antes de viajar a la zona de alto riesgo.

**¿Qué hago si mi hijo/hija olvida tomar una dosis?**



## **Tratamiento de malaria:**

- La mayoría de las veces, se necesita 1 dosis de este medicamento. Si omite administrar la dosis a su hijo, adminístrela con una comida tan pronto como lo recuerde. Siga las instrucciones del médico si su hijo necesita tomar más de 1 dosis de este medicamento.

## **Para todos los usos de este medicamento:**

- Administre la dosis que olvidó lo antes posible.
- Si ya casi es hora de la dosis siguiente, sátese la dosis faltante y continúe con el horario habitual del niño.
- No administre 2 dosis simultáneamente ni administre dosis adicionales.
- Si olvida darle una dosis a su hijo antes de partir para su viaje, llame a un proveedor de salud médica.

## **¿Cómo debo guardar y/o desechar este medicamento?**

- Conserve a temperatura ambiente.
- Mantener en un lugar seco. No conservar en un baño.
- Guarde los medicamentos en un lugar seguro. Mantenga todo medicamento fuera del alcance de los niños y las mascotas.
- Deseche los medicamentos sin usar o que hayan expirado. No los tire por el retrete ni los vierta al desagüe a menos que así se lo indiquen. Consulte con el farmacéutico si tiene

preguntas sobre la mejor manera de desechar medicamentos. Pueden existir programas de devolución de medicamentos en su área.

## **Afirmaciones generales**

- Si los síntomas o trastornos de su hijo no mejoran o si empeoran, llame al médico de su hijo.
- No comparta el medicamento del niño con otras personas ni le de al niño el medicamento de ninguna otra persona.
- Lleve consigo una lista de todos los medicamentos de su hijo (recetados o de venta libre, productos naturales, vitaminas). Entregue esta lista al médico del niño.
- Hable con el médico de su hijo antes de administrarle cualquier medicamento nuevo, ya sea uno recetado o de venta libre, productos naturales o vitaminas.
- Algunos medicamentos pueden tener otro folleto informativo para el paciente. Si tiene alguna pregunta sobre este medicamento, hable con el médico de su hijo, enfermera, farmacéutico u otro proveedor de atención médica.
- Si cree que ha habido una sobredosis, llame al centro de toxicología local o busque atención médica de inmediato. Prepárese para responder qué se ingirió, qué cantidad y cuándo.

## **Exención de responsabilidad y uso de la información del consumidor**

No se debe utilizar esta información para decidir si se debe tomar este medicamento o cualquier otro. Solamente el proveedor de atención médica tiene el conocimiento y la capacitación para decidir qué medicamentos son adecuados para un paciente específico. Esta información no recomienda ningún medicamento como seguro, eficaz o aprobado para tratar a ningún paciente o enfermedad. Es solamente un breve resumen de información general sobre este medicamento. NO incluye toda la información sobre los usos, las instrucciones, las advertencias, las precauciones, las interacciones, los efectos secundarios o los riesgos posibles que podrían aplicarse a este medicamento. Esta información no constituye asesoramiento médico específico y no reemplaza la información que usted recibe de su proveedor de atención médica. Debe hablar con el proveedor de atención médica para obtener información completa sobre los riesgos y los beneficios de tomar este medicamento.

## **Copyright**

© 2019 Wolters Kluwer Clinical Drug Information, Inc. y sus licenciados y/o afiliados. Todos los derechos reservados.

Si tiene preguntas, llame a un miembro de su equipo de atención médica directamente. Si es paciente de MSK puede comunicarse con un proveedor de cuidados de la salud después de las 5:00 PM, durante los fines de semana y los feriados, llame al 212-639-2000.

Para obtener más recursos, visite [www.mskcc.org/pe](http://www.mskcc.org/pe) y podrá hacer búsquedas en nuestra biblioteca virtual.

---

Mefloquine - Generated on July 17, 2019

©2019 Memorial Sloan Kettering Cancer Center