



## EDUCACIÓN PARA PACIENTES Y CUIDADORES

# Preparación intestinal con MiraLAX®

En esta información, se explica cómo tomar polietilenglicol (MiraLAX) para vaciar el colon antes de su cirugía o procedimiento. A esto se le llama preparación intestinal o preparación del intestino.

Su equipo de atención le indicará si tiene que hacer la preparación intestinal con MiraLAX antes de su cirugía o procedimiento.

## Compre los artículos necesarios

El enfermero marcará los artículos que necesita. Los puede adquirir en una farmacia local sin receta.

- ☐ 1 frasco (de 238 gramos) de polietilenglicol (MiraLAX®).
- ☐ 1 botella (64 onzas (1.9 litros)) de líquido claro.

También es posible que quiera adquirir lo siguiente:

- ☐ Líquido claro para tomar durante el día antes de la cirugía o del procedimiento.
- ☐ Una jarra para mezclar el MiraLAX y 64 onzas (1,9 litros) de líquido claro.

## El día antes de su cirugía o procedimiento

### Siga una dieta de líquidos claros

Deberá seguir una dieta de líquidos claros el día antes de su procedimiento. Una dieta de líquidos claros solo incluye líquidos que sean transparentes. Puede encontrar ejemplos en la tabla de la “Dieta de líquidos claros”.

Mientras siga una dieta de líquidos claros:

- No coma ningún alimento sólido.
- No beba ningún líquido de color rojo, violeta ni anaranjado.
- Trate de tomar por lo menos un vaso (8 onzas, 236 ml) de líquido claro cada hora mientras esté despierto.
- Tome líquidos claros de distintos tipos. No tome solamente agua, café y té. Esto le permite obtener suficientes calorías. Esta es una parte importante de su preparación para la colonoscopia.
- Si tiene diabetes, debe beber solo líquidos claros sin azúcar y revisarse el nivel de azúcar en la sangre con frecuencia. Si tiene preguntas, hable con su proveedor de cuidados de la salud.

| Dieta de líquidos claros |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                          | Puede ingerir                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | No ingiera                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Sopas                    | <ul style="list-style-type: none"><li>• Caldo y consomé.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <ul style="list-style-type: none"><li>• Cualquier producto con trozos de comida o condimentos.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Dulces                   | <ul style="list-style-type: none"><li>• Gelatina, como Jell-O®.</li><li>• Hielo de sabores.</li><li>• Caramelos duros, como Life Savers® y lemon drops.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                | <ul style="list-style-type: none"><li>• Bebidas de color rojo, violeta o anaranjado.</li><li>• Todos los otros dulces.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Bebidas                  | <ul style="list-style-type: none"><li>• Jugos de frutas claros, como limonada, jugo de manzana, de arándano blanco y de uva blanca.</li><li>• Refrescos, como ginger ale, 7-UP®, Sprite® y seltzer.</li><li>• Bebidas deportivas, como Gatorade® o Powerade®.</li><li>• Café o té sin leche ni crema.</li><li>• Agua, incluida agua gasificada (con gas) y saborizada.</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Bebidas de color rojo, violeta o anaranjado. Esto incluye jugos rojos, morados o naranjas, refrescos y bebidas deportivas.</li><li>• Jugos con pulpa.</li><li>• Néctares.</li><li>• Batidos o licuados.</li><li>• Leche, crema y otros productos lácteos.</li><li>• Leches de frutos secos, leches vegetales, cremas no lácteas y otras alternativas lácteas.</li><li>• Bebidas con alcohol.</li></ul> |

## **Prepare la preparación intestinal MiraLAX**

La mañana del día antes de su cirugía o procedimiento: mezcle los 238 gramos de MiraLAX con las 64 onzas (casi 2 litros) de líquido claro hasta que el polvo de MiraLAX se disuelva. Una vez que el polvo se disuelva, si lo desea, puede poner la mezcla en el refrigerador.

## **Tome la preparación intestinal MiraLAX**

A las 5:00 p. m. del día antes de su cirugía o procedimiento, comience a tomar la mezcla de MiraLAX. Causa defecaciones frecuentes, así que asegúrese de estar cerca de un baño.

- Tome una taza (8 onzas, 236 ml) de la mezcla cada 15 minutos hasta que se termine.
- Cuando haya terminado de tomar la mezcla MiraLAX, tome de 4 a 6 tazas de líquidos claros.
- Después de cada defecación, póngase pomada de óxido de zinc o Desitin<sup>®</sup> en la piel alrededor del ano. Esto ayuda a prevenir la irritación.

Siga con una dieta de líquidos claros después de terminar su preparación intestinal con MiraLAX.

## **El día de su cirugía o procedimiento**

# Instrucciones sobre lo que debe beber

**Importante:** si toma un medicamento GLP-1, no siga estas instrucciones. En su lugar, siga las instrucciones en *Qué comer y beber antes de su cirugía o procedimiento si toma medicamentos GLP-1* ([www.mskcc.org/es/cancer-care/patient-education/eating-and-drinking-before-your-surgery-or-procedure-when-taking-glp-1-medicines](http://www.mskcc.org/es/cancer-care/patient-education/eating-and-drinking-before-your-surgery-or-procedure-when-taking-glp-1-medicines)).

Entre la medianoche (12 a. m.) y 2 horas antes de la hora de su llegada, beba únicamente los líquidos de la siguiente lista. No coma ni beba nada más. Deje de beber 2 horas antes de la hora de llegada.

- Agua.
- Jugo de manzana claro, jugo de uva claro o jugo de arándanos claro.
- Gatorade o Powerade.
- Café negro o té. Se puede añadir azúcar. No añada nada más.
  - No añada ninguna cantidad de ningún tipo de leche o crema. Esto incluye las leches y cremas vegetales.
  - No añada jarabe aromatizado.

Si tiene diabetes, preste atención a la cantidad de azúcar que contienen las bebidas que toma. Será más fácil controlar sus niveles de azúcar en la sangre si incluye versiones de estas bebidas sin azúcar, bajas en azúcar o sin azúcares añadidos.

Es útil mantenerse hidratado antes de las cirugías y los procedimientos, así que beba líquido si tiene sed. No beba más de lo necesario. Recibirá líquidos por vía intravenosa (VI) durante su cirugía o procedimiento.



Deje de beber 2 horas antes de la hora de llegada. Esto incluye agua.

Es posible que su proveedor de cuidados de la salud le haya

dado instrucciones diferentes sobre cuándo debe dejar de beber. Si es así, siga sus instrucciones.

## Otras instrucciones

Tome solo los medicamentos que le haya indicado el proveedor de cuidados de la salud. Puede tomarlos con unos pequeños sorbos de agua.

Siga cualquier otra instrucción que le haya dado el proveedor de cuidados de la salud acerca de su cirugía o procedimiento.

Si tiene preguntas o inquietudes, contáctese con su proveedor de cuidados de la salud. Un integrante de su equipo de atención le responderá de lunes a viernes de 9 a. m. a 5 p. m. Fuera de ese horario, puede dejar un mensaje o hablar con otro proveedor de MSK. Siempre hay un médico o un enfermero de guardia. Si no está seguro de cómo comunicarse con su proveedor de cuidados de la salud, llame al 212-639-2000.

Para obtener más recursos, visite [www.mskcc.org/pe](http://www.mskcc.org/pe) y busque en nuestra biblioteca virtual.

---

MiraLAX® Bowel Prep Before Your Colorectal Surgery or Procedure - Last updated on September 28, 2026

Todos los derechos son propiedad y se reservan a favor de Memorial Sloan Kettering Cancer Center