

Naloxone

Esta información de Lexicomp® le explica lo que debe saber sobre este medicamento, por ejemplo, para qué se usa, cómo tomarlo, sus efectos secundarios y cuándo llamar a su proveedor de cuidados de la salud.

Marcas estadounidenses

Evzio; Narcan

Marcas canadienses

Narcan; S.O.S. Naloxone Hydrochloride

¿Para qué se usa este medicamento?

- Este medicamento se utiliza para prevenir los efectos secundarios de ciertos medicamentos.
- Este medicamento se utiliza para tratar ciertas sobredosis.
- Se le puede recetar este medicamento al niño por otras razones. Consulte al médico.

¿Qué debo informar al médico ANTES de que mi hijo/hija tome este medicamento?

- Si su hijo es alérgico a este medicamento, a algún componente de este medicamento, o a otros medicamentos, alimentos o sustancias. Informe a su médico acerca de esta alergia y qué síntomas ha presentado su hijo.

Este medicamento puede interactuar con otros medicamentos o trastornos.

Informe al médico y al farmacéutico todos los medicamentos que su hijo toma

(sean estos recetados o de venta libre, productos naturales o vitaminas) y de los problemas de salud que padece. Debe verificar que sea seguro para su hijo tomar este medicamento con todos sus otros medicamentos y problemas de salud. No empiece, interrumpa ni modifique la dosis de ningún medicamento que tome su hijo sin consultar antes con el médico.

¿Hay algo que deba saber o hacer mientras mi hijo/hija toma este medicamento?

Todas las presentaciones:

- Avise a todos los proveedores de atención médica de su hijo que el niño toma este medicamento. Esto incluye a los médicos, enfermeras, farmacéuticos y dentistas del niño.
- Si su hijo es adicto a los medicamentos para el dolor y le recetan este medicamento, puede tener síntomas de abstinencia. Hable con el médico.
- En los bebés menores de 4 semanas de vida que han estado recibiendo medicamentos opioides en forma regular, la interrupción repentina del medicamento puede poner en riesgo la vida si no se trata de inmediato. Obtenga ayuda médica de inmediato si su hijo tiene convulsiones, llora más de lo normal o tiene más reflejos.

Si su hija está embarazada o amamantando a un bebé:

- Consulte al médico si su hija está embarazada, queda embarazada o está amamantando a un bebé. Tendrá que hablar acerca de los riesgos y beneficios para su hija y el bebé.
- Si este medicamento se utiliza durante el embarazo, puede causar signos de abstinencia en el nonato. El nonato deberá ser controlado por un médico una vez que se empieza a usar este medicamento.

Inyección:

- Han ocurrido efectos secundarios muy graves cuando se administró este medicamento después de una cirugía. Esto incluye presión arterial baja o alta, latidos anormales y ciertos problemas pulmonares o cardíacos. En ocasiones,

estos efectos secundarios originaron problemas cerebrales, estado de coma o la muerte. Consulte al médico.

¿Cuáles son los efectos secundarios por los que debo llamar al médico de mi hijo/hija de inmediato?

ADVERTENCIA/PRECAUCIÓN: a pesar de que es muy poco frecuente, algunas personas pueden sufrir efectos secundarios muy graves, y en ocasiones mortales, al tomar un medicamento. Si su hijo presenta alguno de los siguientes signos o síntomas que pueden estar relacionados con un efecto secundario muy grave, infórmelo al médico de su hijo o busque ayuda médica de inmediato:

- Signos de reacción alérgica tales como sarpullido; urticaria; picazón; piel enrojecida, hinchada, con ampollas o descamada, con o sin fiebre; sibilancia; opresión en el pecho o la garganta; problemas para respirar, tragar o hablar; ronquera inusual; o hinchazón de la boca, el rostro, los labios, la lengua o la garganta.
- Signos de presión arterial alta o baja como dolores de cabeza o mareos muy graves, desmayos o cambios en la visión.
- Dolor o presión en el pecho.
- Latidos cardíacos anormales o acelerados.
- Falta de aire.
- Convulsiones.
- Sensación de ardor, adormecimiento u hormigueo fuera de lo común.
- Agitación.
- Cambios de humor.
- Alucinaciones (ver o escuchar cosas que no están allí).
- Temblor.
- Sudoración excesiva.

¿Qué otros efectos secundarios tiene este medicamento?

Todos los medicamentos pueden tener efectos secundarios. Sin embargo, muchas

personas no padecen ningún efecto secundario o padecen solamente efectos secundarios menores. Llame al médico de su hijo o busque ayuda médica si al niño le molesta alguno de estos efectos secundarios o no desaparece:

Pulverizador nasal:

- Dolor muscular.
- Espasmo muscular.
- Dolor de cabeza.
- Nariz seca.
- Goteo o congestión nasal.
- Hinchazón de la nariz.
- Estreñimiento.
- Dolor dental.
- Piel seca.

Todos los productos inyectables:

- Náusea o vómito.
- Mareos.
- Irritación en la zona en la que se aplicó la inyección.
- Sofocos o bochornos.
- Acaloramiento.

Estos no son todos los efectos secundarios que podrían ocurrir. Si tiene preguntas acerca de los efectos secundarios, llame al médico de su hijo. Llame al médico de su hijo para que le aconseje acerca de los efectos secundarios.

Puede informar los efectos secundarios al organismo de salud de su país.

¿Cuál es la mejor forma de tomarlo?

Administre este medicamento según las instrucciones del médico de su hijo. Lea toda la información que se le brinde. Siga todas las instrucciones con atención.

Atomizador para la nariz o inyección mediante autoinyector:

- Si inyectará a su hijo, el médico de su hijo o la enfermera le indicarán cómo aplicar la inyección.
- Asegúrese de saber cómo usarlo antes de que ocurra una emergencia. Lea el prospecto del envase y las instrucciones de uso del medicamento. Hable con el médico o farmacéutico si tiene dudas sobre cómo utilizar este medicamento.
- Este medicamento debe ser administrado por otra persona. Asegúrese de que otras personas sepan dónde almacena este medicamento y cómo administrarlo en caso de ser necesario.
- Después de administrarse este medicamento, los síntomas de sobredosis podrían desaparecer y regresar. Es importante recibir ayuda médica de inmediato después de administrarse este medicamento.
- No utilice el medicamento si está vencido. Use uno nuevo.

Pulverizador nasal:

- Solo para nariz.
- Cada atomizador para la nariz tiene solo 1 dosis y no se puede reutilizar. Si se necesita otra dosis, deberá usar un nuevo atomizador para la nariz.
- Si se administra más de 1 dosis, cambie de orificio nasal en cada dosis.
- Si este medicamento se congela, puede dejarlo descongelar a temperatura ambiente antes de usarlo. Si ocurre una emergencia y este medicamento está congelado, no espere a que se descongele. Obtenga ayuda médica inmediatamente.

Inyección mediante autoinyector:

- Este medicamento se administra en forma de inyección en el músculo o en la capa de grasa de la piel.

- Inyecte directamente sobre la parte externa del muslo según fue indicado. Este medicamento puede administrarse a través de la ropa si es necesario. Inyecte y sostenga durante el tiempo que le indicaron.
- No utilice este medicamento si la solución cambia de color, está turbida o tiene partículas. Use una nueva.
- Cada autoinyector solo tiene 1 dosis. Si se necesita otra dosis, deberá usar un segundo autoinyector.

Todos los demás productos inyectables:

- Este medicamento se administra por inyección intramuscular, intravenosa o subcutánea.

¿Qué hago si mi hijo/hija olvida tomar una dosis?

- Obtenga ayuda médica inmediatamente.

¿Cómo debo guardar y/o desechar este medicamento?

Pulverizador nasal:

- Conserve en su envase original a temperatura ambiente.
- No congelar.
- Proteja del calor y de la luz.

Inyección mediante autoinyector:

- Conserve a temperatura ambiente. No congelar.
- Guárdelo en el envase que le proporcionaron.

Todos los demás productos inyectables:

- Si debe almacenar este medicamento en su hogar, hable con el médico de su hijo, la enfermera o el farmacéutico sobre las condiciones de almacenamiento.

Todas las presentaciones:

- Guarde los medicamentos en un lugar seguro. Mantenga todo medicamento fuera del alcance de los niños y las mascotas.
- Deseche los medicamentos sin usar o que hayan expirado. No los tire por el retrete ni los vierta al desagüe a menos que así se lo indiquen. Consulte con el farmacéutico si tiene preguntas sobre la mejor manera de desechar medicamentos. Pueden existir programas de devolución de medicamentos en su área.

Afirmaciones generales

- Si los síntomas o trastornos de su hijo no mejoran o si empeoran, llame al médico de su hijo.
- No comparta el medicamento del niño con otras personas ni le de al niño el medicamento de ninguna otra persona.
- Algunos medicamentos pueden tener otro folleto informativo para el paciente. Si tiene alguna pregunta sobre este medicamento, hable con el médico de su hijo, enfermera, farmacéutico u otro proveedor de atención médica.
- Si cree que ha habido una sobredosis, llame al centro de toxicología local o busque atención médica de inmediato. Prepárese para responder qué se ingirió, qué cantidad y cuándo.

Exención de responsabilidad y uso de la información del consumidor

No se debe utilizar esta información para decidir si se debe tomar este medicamento o cualquier otro. Solamente el proveedor de atención médica tiene el conocimiento y la capacitación para decidir qué medicamentos son adecuados para un paciente específico. Esta información no recomienda ningún medicamento como seguro, eficaz o aprobado para tratar a ningún paciente o enfermedad. Es solamente un breve resumen de información general sobre este medicamento. NO incluye toda la información sobre los usos, las instrucciones, las advertencias, las precauciones, las interacciones, los efectos secundarios o los riesgos posibles que podrían aplicarse a este medicamento. Esta información no constituye asesoramiento médico específico y no reemplaza la información que usted recibe

de su proveedor de atención médica. Debe hablar con el proveedor de atención médica para obtener información completa sobre los riesgos y los beneficios de tomar este medicamento.

Copyright

© 2020 UpToDate, Inc. y sus licenciantes y/o afiliados. Todos los derechos reservados.

Si tiene preguntas, contacte a un integrante del equipo de atención médica directamente. Si es paciente de MSK y necesita comunicarse con un proveedor después de las 5:00 PM, durante el fin de semana o un día feriado, llame al 212-639-2000.

Para obtener más recursos, visite www.mskcc.org/pe y busque en nuestra biblioteca virtual.

Naloxone - Last updated on August 5, 2020

©2020 Memorial Sloan Kettering Cancer Center