EDUCACIÓN PARA PACIENTES Y CUIDADORES

Instrucciones al ser dado de alta después de su tratamiento con naxitamab (Danyelza®)

En esta información, se explica cómo cuidarse después de su tratamiento de inmunoterapia con naxitamab. En este recurso, la palabra “usted” se refiere a usted o a su hijo.

Recientemente, recibió un tratamiento de inmunoterapia con naxitamab para tratar su neuroblastoma u osteosarcoma. El neuroblastoma es un cáncer que se presenta en una parte del sistema nervioso periférico. El osteosarcoma es un tipo de cáncer de hueso.

La mayoría de los efectos secundarios después de este tratamiento generalmente no duran más que la semana de tratamiento. Existe la posibilidad de que aún tenga algunos efectos secundarios después del alta (cuando salga del hospital).

Efectos secundarios habituales

Dolor

El dolor es el efecto secundario más común de la inmunoterapia con naxitamab. Por lo general, el dolor es más intenso durante la infusión de naxitamab, pero también puede experimentar dolor cuando esté en casa. Es posible que sienta diferentes niveles de dolor en diferentes momentos.

Para tener en cuenta:

- Puede tener dolor después del alta. Antes de salir del hospital, asegúrese de

tener el analgésico que le recetamos.

- No tome acetaminophen (Tylenol®) o ibuprofen (Advil® o Motrin®) para aliviar el dolor a menos que se lo indiquemos.
    - Siempre mida su temperatura antes de tomar estos medicamentos. Pueden ocultar la fiebre, y si tiene fiebre, su equipo de atención médica debe hacerle una revisión.
- Solo tome el analgésico según lo recetado. Si el medicamento no le ayuda a aliviar el dolor o si tiene algún efecto secundario, llámenos. Los efectos secundarios son:
    - Estreñimiento (defecar con menos frecuencia de lo normal).
    - Náuseas (sensación de que va a vomitar).
    - Fatiga (sensación de mucho cansancio).
    - Comezón.

La próxima dosis de analgésico se puede administrar a las: _____ a. m. | p. m.

Nombre del medicamento: _____

Cantidad de medicamento: _____ cada _____ horas, según sea necesario para el dolor.

Reacciones alérgicas

Es posible que tenga una reacción alérgica, como un sarpullido con picazón, enrojecimiento o hinchazón. Estas reacciones pueden ocurrir en cualquier momento entre los tratamientos con naxitamab. Le recetaremos un medicamento para la alergia para que lo tome en casa, como hydroxyzine (Vistaril®) o diphenhydramine (Benadryl®).

Para tener en cuenta:

- Los cambios en la respiración o la dificultad para respirar pueden ser un signo de una reacción alérgica. Llame al 911 y pida atención médica de urgencia si tiene alguna preocupación sobre la respiración.
- Le daremos una receta para un antialérgico. Asegúrese de conseguir los medicamentos antes de salir del hospital.

La próxima dosis de antihistamínico se puede administrar a las: _____ a. m. | p. m.

Nombre del medicamento: _____

Cantidad del medicamento: _____ cada _____ horas, según sea necesario para los síntomas de la alergia.

Fiebre

Es posible que tenga fiebre después de su tratamiento. Puede estar relacionado con el tratamiento o ser un signo de infección. Asegúrese de tener un termómetro en casa. Es importante que nos llame para recibir instrucciones si tiene:

- Fiebre de 100.4 a 100.9 °F (de 38 a 38.2 °C) que dura más de una hora.
- Fiebre de 101 °F (38.3 °C) o más.

Infecciones del catéter venoso central

Una vía central, o catéter venoso central, funciona como una vena artificial. Gracias a esta vía central, su equipo de atención médica podrá acceder con más facilidad a los vasos sanguíneos para administrarle medicamentos y hacerle pruebas. Las vías centrales pueden acumular bacterias (gérmenes) y causar una infección. Podría tener fiebre, enrojecimiento, inflamación o dolor en el sitio del catéter. Llámenos de inmediato si tiene alguno de estos síntomas.

¿Tiene una vía central, como un MediPort, Broviac™ o un catéter central de inserción periférica (PICC)? sí | no

Consulte el área de comentarios a continuación para obtener más instrucciones:

Dificultad para ir al baño

Puede estar estreñido (tener problemas para hacer caca) o tener dificultad para orinar (hacer pis). Este es un efecto secundario común de muchos analgésicos. Le podemos recetar un medicamento para ayudarle a hacer pis y a defecar (hacer caca).

Lo que usted puede hacer:

- Aplique un paño tibio y húmedo en el abdomen, debajo del ombligo, para ayudarle a hacer pis.
- Tome una cantidad suficiente de líquidos.
- Siga nuestras instrucciones para hacerle frente al estreñimiento.

Náuseas y vómito

Puede tener náuseas y vómitos (devolver). Podemos recetarle medicamentos para ayudar con esto.

La próxima dosis de medicamento contra las náuseas se puede administrar a las: _____ a. m. | p. m.

Nombre del medicamento: _____

Cantidad del medicamento: _____ cada _____ horas, según sea necesario para las náuseas.

Cuándo regresar a la clínica

Regrese a la clínica el _____ a las _____ **a. m. | p. m.** para:

Cuándo llamar a su equipo de atención

Llame al 911 y pida atención médica de urgencia si:

- Tiene dificultad para respirar.
- Tiene problemas para respirar.
- Tiene inquietudes sobre su respiración.

Llame a su equipo de atención si:

- Tiene inflamación en los labios, la lengua o la garganta.
- Tiene fiebre de 100.4 a 100.9 °F (38 a 38.2 °C) durante más de una hora.
- Tiene fiebre de 101 °F (38.3 °C) o más.

- Tiene la piel pálida, sudoración o escalofríos. Pueden ser indicios de infección.
- No hizo pis en una cierta cantidad de horas. Su equipo de atención le dirá la cantidad.
- No defecó (no hizo caca) en cierta cantidad de días. Su equipo de atención le dirá la cantidad.
- Tiene dolor que no mejora o que empeora después de tomar su medicamento.
- Tiene náuseas o vómitos que no se detienen.
- Vomita cada vez que bebe algo.
- Tiene un dolor de cabeza repentino que no desaparece.
- Nota cambios en la visión.
- Tiene una convulsión.
- Nota cambios en su estado de ánimo, su comportamiento o su nivel de alerta.
- Tiene tos que no se detiene.
- La zona donde la vía central entra en el cuerpo está enrojecida, hinchada o sensible.

Detalles de contacto

Si tiene alguna pregunta, contacte directamente a un miembro de su equipo de atención. Puede comunicarse con ellos de lunes a viernes, de 8 a. m. a 6 p. m. Después de las 6 p. m., durante los fines de semana y los días festivos, llame al 212-639-2000 y pregunte por el pediatra.

Si tiene alguna pregunta que no requiere una respuesta inmediata, puede enviar un mensaje a su equipo de atención médica a través de MSK MyChart. MSK MyChart es el portal para pacientes de MSK.

Información sobre el Centro de Atención de Urgencia (UCC) de Pediatría de MSK.

Según los síntomas, el equipo de atención médica puede indicarle que vaya al UCC de Pediatría de MSK.

El UCC de Pediatría está en el 9.º piso del Memorial Hospital (el hospital principal de MSK). La entrada más cercana está ubicada en 1275 York Avenue (sobre E. 68 Street). Esta entrada está abierta siempre. Cuando llegue al hospital, tome los ascensores M hasta el 9.º piso y regístrese en la recepción.

Para obtener más recursos, visite www.mskcc.org/pe y busque en nuestra biblioteca virtual.

Discharge Instructions After Your Naxitamab (Danyelza®) Treatment - Last updated on December 2, 2025
Todos los derechos son propiedad y se reservan a favor de Memorial Sloan Kettering Cancer Center



Memorial Sloan Kettering
Cancer Center