



## EDUCACIÓN DE PACIENTES Y CUIDADORES

# Neomycin, Polymyxin B, and Hydrocortisone

Esta información de Lexicomp® le explica lo que debe saber sobre este medicamento, por ejemplo, para qué se usa, cómo tomarlo, sus efectos secundarios y cuándo llamar a su proveedor de cuidados de la salud.

### **Marcas estadounidenses**

Cortisporin; Cortomycin

### **Marcas canadienses**

Cortimyxin; Cortisporin Otic

### **¿Para qué se usa este medicamento?**

- Este medicamento se utiliza para tratar la otitis.
- Este medicamento se utiliza para tratar o evitar infecciones oculares.
- Este medicamento se utiliza para tratar la irritación de la piel.

### **¿Qué debo informar al médico ANTES de que mi hijo/hija tome este medicamento?**

#### **Todas las presentaciones:**

- Si su hijo tiene alergia a este medicamento o a alguno de sus

componentes.

- Si su hijo es alérgico a algún medicamento como este o a otros medicamentos, alimentos o sustancias. Informe al médico acerca de la alergia y qué síntomas presentó su hijo, tales como sarpullido; urticaria; picazón; falta de aire; sibilancias; tos; inflamación de la cara, los labios, la lengua o la garganta o cualquier otro síntoma.

### **Cutáneo:**

- Si el niño tiene alguno de los siguientes problemas de salud: infección por hongos, tuberculosis (TB) o infección viral de la piel.
- Si el niño tiene ruptura del tímpano.

### **Ojo:**

- Si el niño tiene alguno de estos problemas de salud: herpes, infección viral o por levaduras en los ojos.

### **Oído:**

- Si su hijo tiene alguno de estos problemas de salud: varicela, infección por herpes u otro tipo de infección viral del oído.
- Si el niño tiene ruptura del tímpano.

*Esta no es una lista de todos los medicamentos o trastornos que pueden interactuar con este medicamento.*

*Informe al médico y al farmacéutico todos los medicamentos que su hijo toma (sean estos recetados o de venta libre,*

*productos naturales o vitaminas) y de los problemas de salud que padece. Debe verificar que sea seguro para su hijo tomar este medicamento con todos sus otros medicamentos y problemas de salud. No empiece, interrumpa ni modifique la dosis de ningún medicamento que tome su hijo sin consultar antes con el médico.*

**¿Hay algo que deba saber o hacer mientras mi hijo/hija toma este medicamento?**

**Todas las presentaciones:**

- Informe al dentista, cirujano u otro personal médico que el niño usa este medicamento.
- No se lo administre a su hijo durante más tiempo que el indicado ni utilice una dosis mayor. Es posible que haya una segunda infección.
- Úselo con precaución en los niños. Hable con el médico.
- Este medicamento puede afectar el crecimiento de niños y adolescentes en algunos casos. Es posible que necesiten controles de crecimiento periódicos. Consulte al médico.

**Si su hija está embarazada o amamantando a un bebé:**

- Consulte al médico si su hija está embarazada, queda embarazada o está amamantando a un bebé. Tendrá que hablar acerca de los beneficios y los riesgos de utilizar este medicamento.

**Cutáneo:**

- Tenga cuidado al colocar en una área extensa de la piel o donde tenga heridas abiertas. Consulte al médico.
- No lo utilice para el tratamiento de la dermatitis del pañal.
- Hable con el médico del niño antes de usar otro medicamento o producto sobre la piel de su hijo.

### **Ojo:**

- El niño debe evitar las tareas o las acciones que requieren un estado de alerta o una visión clara hasta que usted observe cómo este medicamento afecta a su hijo. Estas son actividades como andar en bicicleta, practicar deportes o usar elementos como tijeras, podadoras de césped, motocicletas eléctricas, automóviles de juguete o vehículos motorizados.
- El niño debe evitar usar lentes de contacto a menos que se la haya indicado un proveedor de salud médica.

### **Oído:**

- Si el niño es alérgico a los sulfitos, hable con un proveedor de salud médica. Algunos productos contienen sulfitos.

**¿Cuáles son los efectos secundarios por los que debo llamar al médico de mi hijo/hija de inmediato?**

***ADVERTENCIA/PRECAUCIÓN:** A pesar de que es muy poco frecuente, algunas personas pueden sufrir efectos secundarios muy graves, y en ocasiones mortales, al tomar un medicamento. Si su hijo presenta alguno de los siguientes signos o síntomas que pueden estar relacionados con un efecto*

*secundario muy grave, infórmelo al médico de su hijo o busque ayuda médica de inmediato:*

### **Todas las presentaciones:**

- Síntomas de una reacción alérgica tales como sarpullido; urticaria; comezón; piel inflamada, con ampollas o descamada con o sin fiebre; silbido en el pecho; opresión en el pecho o la garganta; problemas para respirar o hablar; ronquera inusual; o hinchazón de la boca, el rostro, los labios, la lengua o la garganta.

### **Cutáneo:**

- Síntomas de azúcar alta en la sangre tales como confusión, somnolencia, más sed, más hambre, orinar más seguido, acaloramiento, respiración acelerada o aliento con olor a fruta.
- Modificaciones en la piel (acné, estrías, curación lenta, crecimiento del vello).
- Dolor.
- Inflamación.
- Irritación severa en la piel.

### **Ojo:**

- Cambios en la visión, dolor en el ojo o irritación ocular grave.

### **Oído:**

- Irritación grave del oído.
- Pérdida auditiva.

## **¿Qué otros efectos secundarios tiene este medicamento?**

*Todos los medicamentos pueden tener efectos secundarios. Sin embargo, muchas personas no padecen ningún efecto secundario o padecen solamente efectos secundarios menores. Llame al médico de su hijo o busque ayuda médica si al niño le molesta alguno de estos efectos secundarios o no desaparece:*

### **Cutáneo:**

- Irritación cutánea.

### **Ojo:**

- Irritación en los ojos.

### **Oído:**

- Ardor.
- Dolor punzante.

*Estos no son todos los efectos secundarios que podrían ocurrir. Si tiene preguntas acerca de los efectos secundarios, llame al médico de su hijo. Llame al médico de su hijo para que lo aconseje acerca de los efectos secundarios.*

*Puede informar los efectos secundarios al organismo de salud de su país.*

## **¿Cuál es la mejor forma de tomarlo?**

*Administre este medicamento según las instrucciones del médico de su hijo. Lea toda la información que se le brinde. Siga todas las instrucciones con atención.*

### **Todas las presentaciones:**

- Adminístrelo según las indicaciones de la receta, aun cuando su hijo se sienta bien.
- Para sacar el mayor provecho de este medicamento, no permita que el niño se salte ninguna dosis.
- Lávese las manos antes y después de usar.

### **Cutáneo:**

- No administre por la boca. Solo para uso cutáneo. No acerque a la boca, la nariz ni los ojos (puede quemar) del niño.
- Limpie la zona afectada antes de usar. Asegúrese de secarla bien.
- Aplique una capa fina en la zona afectada y frote suavemente.
- No lo coloque en la cara, las axilas o en la ingle de su hijo, excepto que se lo indique el médico.
- No cubra el área (con vendas, apósitos, maquillaje) a menos que se lo indique el médico.

### **Ojo:**

- Solo para ojos.

- Agite bien antes de usar.
- No apoye el extremo del envase sobre el ojo, el párpado u otras áreas de la piel del niño.
- Coloque la cabeza del niño hacia atrás y aplique el medicamento en los ojos.
- Luego de aplicar este medicamento dígame al niño que mantenga los ojos cerrados. Aplique presión suave sobre la esquina interior del ojo. Haga esto durante 1 a 2 minutos. Este procedimiento mantiene el medicamento dentro del ojo del niño.

### **Oído:**

- Solo para oídos.
- Acueste al niño sobre un lado con el oído afectado hacia arriba.
- En el caso de los niños menores de 3 años, tire suavemente de la oreja hacia afuera y hacia abajo.
- En el caso de los niños de 3 años y mayores, tire suavemente de la oreja hacia afuera y hacia arriba.
- Coloque las gotas en el oído sin que el gotero toque la oreja.
- Dígame al niño que permanezca de costado durante 2 minutos o introduzca un taponcito de algodón en la oreja.

### **Suspensión:**

- Agite bien antes de usar.



## **¿Qué hago si mi hijo/hija olvida tomar una dosis?**

- Administre la dosis que olvidó lo antes posible.
- Si ya casi es hora de la dosis siguiente, sátese la dosis faltante y continúe con el horario habitual del niño.
- No administre 2 dosis simultáneamente ni administre dosis adicionales.

## **¿Cómo debo guardar y/o desechar este medicamento?**

- Conserve a temperatura ambiente.
- Mantenga todo medicamento fuera del alcance de los niños y las mascotas.
- Pregunte al farmacéutico cómo se deben desechar los medicamentos no utilizados.

## **Afirmaciones generales**

- Si los síntomas o trastornos de su hijo no mejoran o si empeoran, llame al médico de su hijo.
- No comparta el medicamento del niño con otras personas ni le de al niño el medicamento de ninguna otra persona.
- Lleve consigo una lista de todos los medicamentos de su hijo (recetados o de venta libre, productos naturales, vitaminas). Entregue esta lista al médico del niño.
- Hable con el médico de su hijo antes de administrarle cualquier medicamento nuevo, ya sea uno recetado o de venta libre, productos naturales o vitaminas.

- Algunos medicamentos pueden tener otro folleto informativo para el paciente. Si tiene alguna pregunta sobre este medicamento consulte al médico de su hijo, el farmacéutico u otro proveedor de atención médica.
- Si cree que ha habido una sobredosis, llame al centro de toxicología local o busque atención médica de inmediato. Prepárese para responder qué se ingirió, qué cantidad y cuándo.

## **Exención de responsabilidad y uso de la información del consumidor**

*No se debe utilizar esta información para decidir si se debe tomar este medicamento o cualquier otro. Solamente el proveedor de atención médica tiene el conocimiento y la capacitación para decidir qué medicamentos son adecuados para un paciente específico. Esta información no recomienda ningún medicamento como seguro, eficaz o aprobado para tratar a ningún paciente o enfermedad. Es solamente un breve resumen de información general sobre este medicamento. NO incluye toda la información sobre los usos, las instrucciones, las advertencias, las precauciones, las interacciones, los efectos secundarios o los riesgos posibles que podrían aplicarse a este medicamento. Esta información no constituye asesoramiento médico específico y no reemplaza la información que usted recibe de su proveedor de atención médica. Debe hablar con el proveedor de atención médica para obtener información completa sobre los riesgos y los beneficios de tomar este medicamento.*

## Copyright

© 2015 Wolters Kluwer Clinical Drug Information, Inc. y sus licenciados y/o afiliados. Todos los derechos reservados.

Si tiene preguntas, llame a un miembro de su equipo de atención médica directamente. Si es paciente de MSK puede comunicarse con un proveedor de cuidados de la salud después de las 5:00 PM, durante los fines de semana y los feriados, llame al 212-639-2000.

Para obtener más recursos, visite [www.mskcc.org/pe](http://www.mskcc.org/pe) y podrá hacer búsquedas en nuestra biblioteca virtual.

---

Neomycin, Polymyxin B, and Hydrocortisone - Last updated on December 31, 1969

©2019 Memorial Sloan Kettering Cancer Center