



EDUCACIÓN DE PACIENTES Y CUIDADORES

OnabotulinumtoxinA

Esta información de Lexicomp® le explica lo que debe saber sobre este medicamento, por ejemplo, para qué se usa, cómo tomarlo, sus efectos secundarios y cuándo llamar a su proveedor de cuidados de la salud.

Marcas estadounidenses

Botox; Botox Cosmetic

Marcas canadienses

Botox; Botox Cosmetic

Advertencia

- Han ocurrido efectos secundarios muy graves cuando el medicamento se esparce de la zona en donde se estaba utilizando. Estos signos pueden aparecer horas o semanas después de la inyección. Los problemas para tragar y respirar pueden causar la muerte. El riesgo es mayor en niños con problemas musculares. Llame al médico de inmediato si presenta visión borrosa, cambio en la voz, párpados caídos, pérdida de fuerza o debilidad en todo el cuerpo. Llame al médico de inmediato si es incapaz de controlar la vejiga, ve doble o si se le dificulta respirar, hablar o tragar.

¿Para qué se usa este medicamento?

- Este medicamento se utiliza para disminuir las arrugas y líneas de la cara y el cuello.
- Este medicamento se utiliza para disminuir la sudoración en las axilas.
- Este medicamento se utiliza para evitar migrañas.
- Este medicamento se utiliza para tratar problemas musculares en la zona del ojo.
- Este medicamento se utiliza para tratar problemas musculares que producen espasmos.
- Este medicamento se utiliza para tratar espasmos en el cuello.
- Este medicamento se utiliza para tratar la vejiga hiperactiva.
- Este medicamento se utiliza para tratar los espasmos de la vejiga.

¿Qué debo informar al médico ANTES de tomar este medicamento?

Para todos los usos de este medicamento:

- Si es alérgico a la toxina botulínica tipo A, la albúmina o a cualquier otro componente de este medicamento.
- Si es alérgico a algún medicamento como este, a otros medicamentos, alimentos o sustancias. Informe a su médico acerca de esta alergia y qué síntomas ha presentado, tales

como, sarpullido; urticaria; comezón; falta de aire; sibilancia; tos; inflamación de la cara, los labios, la lengua o la garganta o cualquier otro síntoma.

- Si tiene una infección en la zona en la que se aplicará la inyección.

Para la pérdida de control de la vejiga:

- Si tiene una infección en el tracto urinario.
- Si tiene dificultad al orinar.

Esta no es una lista de todos los medicamentos o trastornos que pueden interactuar con este medicamento.

Informe a su médico y farmacéutico acerca de todos los medicamentos que tome (sean estos recetados o de venta libre, productos naturales, vitaminas) y los trastornos que tenga. Debe verificar que sea seguro para usted tomar este medicamento junto con todos sus otros medicamentos y trastornos. No empiece, detenga ni modifique la dosis de ningún medicamento sin consultar antes al médico.

¿Qué debo tener en cuenta al usar este medicamento?

Para todos los usos de este medicamento:

- Avise a todos sus proveedores de atención médica que toma este medicamento. Esto incluye a los médicos, enfermeras, farmacéuticos y dentistas.
- Hable con su médico si ha utilizado un producto con toxina

botulínica en los últimos 3 o 4 meses.

- Evite conducir, realizar tareas o actividades que requieran de su atención completa o de una visión clara hasta que vea cómo lo afecta este medicamento.
- No alterne entre las distintas presentaciones de este medicamento sin consultarlo antes con el médico.
- El uso de este medicamento con fines para los cuales no ha sido aprobado ha ocasionado efectos secundarios muy graves como debilidad extrema y problemas para tragar. A veces, estos efectos secundarios fueron mortales. En la mayoría de los casos, las personas ya tenían problemas para tragar u otros problemas de salud. Consulte al médico.
- Este medicamento está hecho de plasma humano (una parte de la sangre) y puede contener virus que provoquen enfermedades. Este medicamento se evalúa, prueba y trata para reducir las probabilidades de que transmita una infección. Consulte al médico.
- Informe a su médico si está embarazada o tiene intención de embarazarse. Tendrá que hablar acerca de los riesgos y beneficios de utilizar este medicamento mientras esté embarazada.
- Informe a su médico si está amamantando a su bebé. Tendrá que hablar acerca de si hay riesgos para el bebé.

Para la pérdida de control de la vejiga:

- Si tiene 65 años de edad o es mayor, use este medicamento

con cuidado. Puede provocarle más efectos secundarios.

Razones por las que debe llamar a su médico de inmediato.

ADVERTENCIA/PRECAUCIÓN: A pesar de que es muy poco frecuente, algunas personas pueden sufrir efectos secundarios muy graves, que causen incluso la muerte, al tomar un medicamento. Si presenta alguno de los siguientes signos o síntomas que puedan estar relacionados con un efecto secundario muy grave, infórmelo a su médico o busque asistencia médica de inmediato:

Para todos los usos de este medicamento:

- Signos de reacción alérgica tales como sarpullido; urticaria; picazón; piel enrojecida, hinchada, con ampollas o descamada, con o sin fiebre; sibilancia; opresión en el pecho o la garganta; problemas para respirar, tragar o hablar; ronquera inusual; o hinchazón de la boca, el rostro, los labios, la lengua o la garganta.
- Los signos de infección incluyen fiebre, escalofríos, dolor de garganta muy grave, dolor de oídos o senos paranasales, tos, aumento del esputo o cambio en el color del esputo, dolor para orinar, aftas o herida que no cicatriza.
- Dificultad para tragar o hablar.
- Severo dolor muscular o debilidad.
- Cambios en la visión, dolor en el ojo o irritación ocular grave.

- Visión doble.
- Cierre de los párpados.
- Cejas caídas.
- Mareos o desmayos.

Para la pérdida de control de la vejiga:

- Signos de una infección en el tracto urinario (ITU) como sangre en la orina, ardor o dolor al orinar, necesidad de orinar con frecuencia o de inmediato, fiebre, dolor estomacal o dolor pélvico.
- Problemas para orinar.

¿Qué otros efectos secundarios tiene este medicamento?

Todos los medicamentos pueden tener efectos secundarios. Sin embargo, muchas personas no tienen ningún efecto secundario o tienen solamente efectos secundarios menores. Llame a su médico o busque asistencia médica si le molesta alguno de estos efectos secundarios o no desaparece:

- Irritación en la zona en la que se aplicó la inyección.
- Dolor de cuello.
- Dolor de cabeza.
- Menor frecuencia en el parpadeo.
- Ojos secos.
- Boca seca.

- Tos.
- Síntomas similares a los de la gripe.
- Dolor de espalda.
- Goteo nasal.
- Se siente cansado o débil.
- Fiebre leve.
- Náuseas.
- Somnolencia.

Estos no son todos los efectos secundarios que podrían ocurrir. Si tiene preguntas acerca de los efectos secundarios, llame al médico. Llame al médico para que lo aconseje acerca de los efectos secundarios.

Puede informar los efectos secundarios al organismo de salud de su país.

¿Cuál es la mejor forma de tomarlo?

Tome este medicamento según las indicaciones de su médico. Lea toda la información que se le brinde. Siga todas las instrucciones con atención.

- Un proveedor de salud médica le administrará este medicamento.
- Este medicamento se administra por inyección en el músculo(s) que produce el espasmo.
- Este medicamento puede administrarse como inyección en

la piel cerca de las zonas de sudoración.

¿Qué hago si se me olvida tomar una dosis?

- Llame al médico para pedir una cita.

¿Cómo debo conservar este medicamento?

- Si necesita almacenar este medicamento en casa, hable con su médico, enfermera o farmacéutico sobre cómo hacerlo.

Afirmaciones generales

- Si sus síntomas o trastornos no mejoran o si empeoran, llame al médico.
- No comparta su medicamento con otras personas ni tome el medicamento de ninguna otra persona.
- Lleve consigo una lista de todos los medicamentos que toma (recetados, productos naturales, suplementos, vitaminas, medicamentos que obtuvo sin receta). Entregue esta lista al médico.
- Hable con su médico antes de comenzar a tomar cualquier medicamento, ya sea uno recetado o sin receta, productos naturales o vitaminas.
- Guarde los medicamentos en un lugar seguro. Mantenga todo medicamento fuera del alcance de los niños y las mascotas.
- Deseche los medicamentos sin usar o que hayan expirado. No los tire por el retrete ni los vierta al desagüe a menos que así se lo indiquen. Consulte con el farmacéutico si tiene

preguntas sobre la mejor manera de desechar medicamentos. Pueden existir programas de devolución de medicamentos en su área.

- Algunos medicamentos pueden tener otro folleto informativo para el paciente. Si tiene alguna pregunta sobre este medicamento, hable con su médico, enfermera, farmacéutico u otro proveedor de atención médica.
- Si cree que ha habido una sobredosis, llame al centro de toxicología local o busque atención médica de inmediato. Prepárese para responder qué se ingirió, qué cantidad y cuándo.

Exención de responsabilidad y uso de la información del consumidor

No se debe utilizar esta información para decidir si se debe tomar este medicamento o cualquier otro. Solamente el proveedor de atención médica tiene el conocimiento y la capacitación para decidir qué medicamentos son adecuados para un paciente específico. Esta información no recomienda ningún medicamento como seguro, eficaz o aprobado para tratar a ningún paciente o enfermedad. Es solamente un breve resumen de información general sobre este medicamento. NO incluye toda la información sobre los usos, las instrucciones, las advertencias, las precauciones, las interacciones, los efectos secundarios o los riesgos posibles que podrían aplicarse a este medicamento. Esta información no constituye asesoramiento médico específico y no reemplaza la información que usted recibe de su proveedor de atención médica. Debe hablar con el

proveedor de atención médica para obtener información completa sobre los riesgos y los beneficios de tomar este medicamento.

Copyright

© 2019 Wolters Kluwer Clinical Drug Information, Inc. y sus licenciantes y/o afiliados. Todos los derechos reservados.

Si tiene preguntas, llame a un miembro de su equipo de atención médica directamente. Si es paciente de MSK puede comunicarse con un proveedor de cuidados de la salud después de las 5:00 PM, durante los fines de semana y los feriados, llame al 212-639-2000.

Para obtener más recursos, visite www.mskcc.org/pe y podrá hacer búsquedas en nuestra biblioteca virtual.

OnabotulinumtoxinA - Generated on July 16, 2019

©2019 Memorial Sloan Kettering Cancer Center