



EDUCACIÓN DE PACIENTES Y CUIDADORES

Paliperidone

Esta información de Lexicomp® le explica lo que debe saber sobre este medicamento, por ejemplo, para qué se usa, cómo tomarlo, sus efectos secundarios y cuándo llamar a su proveedor de cuidados de la salud.

Marcas estadounidenses

Invega; Invega Sustenna; Invega Trinza

Marcas canadienses

Invega; Invega Sustenna; Invega Trinza

Advertencia

- Hay una probabilidad más alta de muerte en los adultos mayores que toman este medicamento para tratar problemas mentales causados por la demencia. La mayoría de las muertes estuvieron relacionadas con una enfermedad cardíaca o infección. Este medicamento no está aprobado para tratar problemas mentales causados por la demencia.

¿Para qué se usa este medicamento?

- Este medicamento se utiliza para tratar la esquizofrenia.
- Este medicamento se utiliza para tratar el trastorno esquizoafectivo.

- Se le puede recetar este medicamento al niño por otras razones. Consulte al médico.

Inyección:

- Este medicamento no está aprobado para su administración en niños. Sin embargo, el médico puede decidir que los beneficios de tomar este medicamento superan los riesgos. Si el niño ha estado recibiendo este medicamento, pida al médico la información sobre los riesgos y beneficios. Consulte al médico si tiene preguntas sobre el hecho de administrarle este medicamento a su hijo.

¿Qué debo informar al médico ANTES de que mi hijo/hija tome este medicamento?

- Si su hijo tiene alergia a este medicamento o a alguno de sus componentes.
- Si su hijo es alérgico a algún medicamento como este o a otros medicamentos, alimentos o sustancias. Informe al médico acerca de la alergia y qué síntomas presentó su hijo, tales como sarpullido; urticaria; picazón; falta de aire; sibilancias; tos; inflamación de la cara, los labios, la lengua o la garganta o cualquier otro síntoma.
- Si el niño tiene enfermedad renal.
- Si el niño alguna vez ha tenido un QT largo en el ECG u otro latido cardíaco que no sea normal.
- Si el niño toma algún medicamento que pueda producir un determinado tipo de latido cardíaco que no es normal

(prolongación del intervalo QT). Hay muchos medicamentos que pueden hacer esto. Pregunte al médico o al farmacéutico si no está seguro.

- Si su hijo presentó alguna vez algunos de los siguientes problemas de salud: fibrosis quística; estrechamiento del tracto GI (gastrointestinal) u otros problemas GI, como obstrucción intestinal, enfermedad inflamatoria intestinal, síndrome de intestino corto o tránsito lento en el esófago en el tubo digestivo; peritonitis.
- Si el niño está tomando alguno de estos medicamentos: Rifampina o hierba de San Juan.
- Si su hijo está tomando carbamazepina.

Esta no es una lista de todos los medicamentos o trastornos que pueden interactuar con este medicamento.

Informe al médico y al farmacéutico todos los medicamentos que su hijo toma (sean estos recetados o de venta libre, productos naturales o vitaminas) y de los problemas de salud que padece. Debe verificar que sea seguro para su hijo tomar este medicamento con todos sus otros medicamentos y problemas de salud. No empiece, interrumpa ni modifique la dosis de ningún medicamento que tome su hijo sin consultar antes con el médico.

¿Hay algo que deba saber o hacer mientras mi hijo/hija toma este medicamento?

- Avise a todos los proveedores de atención médica de su hijo

que el niño toma este medicamento. Esto incluye a los médicos, enfermeras, farmacéuticos y dentistas del niño.

- El niño debe evitar las tareas o las acciones que requieren un estado de alerta hasta que usted observe cómo este medicamento afecta a su hijo. Estas son actividades como andar en bicicleta, practicar deportes o usar elementos como tijeras, podadoras de césped, motocicletas eléctricas, automóviles de juguete o vehículos motorizados.
- Para reducir la probabilidad de que su hijo se sienta mareado o pierda la conciencia, haga que se levante lentamente si estuvo sentado o recostado. Haga que su hijo tenga cuidado al subir y bajar escaleras.
- Puede tardar varias semanas para ver los efectos completos.
- Se observaron niveles altos de azúcar en sangre o diabetes, colesterol alto y aumento de peso con medicamentos similares a este. Estos cambios pueden aumentar el riesgo de presentar enfermedades cardíacas y de los vasos sanguíneos del cerebro. Consulte al médico.
- Controle el azúcar del niño según le indicó el médico del mismo.
- El alcohol puede interactuar con este medicamento. Asegúrese de que su hijo no beba alcohol.
- Consulte al médico antes de administrarle a su hijo otros medicamentos y productos naturales que puedan retardar sus reacciones.

- El niño debe tener cuidado con el clima cálido o mientras está activo. El niño debe beber mucho líquido para evitar la deshidratación.
- Pueden producirse mareos, somnolencia e inestabilidad con este medicamento. Esto puede ocasionar caídas. Las caídas pueden conllevar a huesos rotos u otros problemas de salud. Consulte con el médico.
- El recuento de células blancas bajo se presenta con el uso de este medicamento. Esto puede derivar en un mayor riesgo a contraer infecciones. Rara vez, se presentan infecciones mortales. Dígale al médico si alguna vez tuvo recuento bajo de células blancas. Llame a su médico de inmediato si tiene síntomas de infección como fiebre, escalofríos o dolor de garganta. Hable con su médico.
- Esto puede afectar la capacidad para quedar embarazada. Este efecto se revierte al suspender el medicamento. Si tiene preguntas, consulte al médico.

Si su hija está embarazada o amamantando a un bebé:

- Informe a su médico si su hija está embarazada o queda embarazada. Deberá hablar acerca de los riesgos y beneficios de que su hija utilice este medicamento durante el embarazo.
- Tomar este medicamento en el tercer trimestre de embarazo puede causar movimientos musculares que no se pueden controlar y síntomas de abstinencia en el recién

nacido. Hable con el médico.

- Informe al médico si está amamantando a su hijo. Deberá hablar acerca de los riesgos para el bebé.

¿Cuáles son los efectos secundarios por los que debo llamar al médico de mi hijo/hija de inmediato?

ADVERTENCIA/PRECAUCIÓN: a pesar de que es muy poco frecuente, algunas personas pueden sufrir efectos secundarios muy graves, y en ocasiones mortales, al tomar un medicamento. Si su hijo presenta alguno de los siguientes signos o síntomas que pueden estar relacionados con un efecto secundario muy grave, infórmelo al médico de su hijo o busque ayuda médica de inmediato:

Todas las presentaciones:

- Signos de reacción alérgica tales como sarpullido; urticaria; picazón; piel enrojecida, hinchada, con ampollas o descamada, con o sin fiebre; sibilancia; opresión en el pecho o la garganta; problemas para respirar, tragar o hablar; ronquera inusual; o hinchazón de la boca, el rostro, los labios, la lengua o la garganta.
- Síntomas de azúcar alta en la sangre tales como confusión, somnolencia, más sed, más hambre, orinar más seguido, acaloramiento, respiración acelerada o aliento con olor a fruta.
- Mareos severos o desmayos.
- Cambios de conducta en el niño.

- Cambios de humor.
- Temblor, dificultad para moverse, entumecimiento.
- Latido cardíaco lento.
- Dificultad para tragar.
- Convulsiones.
- Mayor salivación.
- Hematoma o hemorragia sin motivo aparente.
- Incapacidad para controlar los movimientos oculares.
- No suda durante las actividades físicas ni cuando el tiempo está caluroso.
- Dolor de pecho.
- Agrandamiento de los senos.
- Secreción del pezón.
- Llame al médico de su hijo de inmediato si su hijo tiene una erección (pene duro) dolorosa o una erección que dura más de 4 horas. Si no se trata de inmediato, puede producir problemas sexuales permanentes, y es posible que su hijo no pueda tener relaciones sexuales en el futuro.
- Puede ocurrir un problema de salud grave y, en ocasiones, mortal, llamado síndrome neuroléptico maligno (SNM). Llame al médico de su hijo de inmediato si su hijo tiene fiebre, calambres o rigidez en los músculos, mareos, dolor de cabeza muy intenso, confusión, cambios en el pensamiento, latidos acelerados, latidos que no parecen normales o

sudoración excesiva.

- Algunas personas que toman este medicamento podrían padecer un grave problema muscular llamado discinesia tardía. Este problema muscular puede no desaparecer incluso si se suspende el uso de este medicamento. En ocasiones, los signos pueden disminuir o desaparecer con el tiempo después de suspender este medicamento. El riesgo de padecer discinesia tardía podría incrementarse en personas con diabetes y en adultos mayores, especialmente en mujeres. El riesgo también es mayor mientras más tiempo su hijo tome este medicamento o con dosis más altas. También pueden presentarse problemas musculares luego del uso a corto plazo con dosis bajas. Llame al médico de su hijo de inmediato si su hijo tiene dificultades para controlar los movimientos corporales o si tiene problemas musculares en la lengua, el rostro, la boca o la mandíbula, como lengua que sobresale de la boca, mejillas hinchadas, boca fruncida o masticación.
- Este medicamento puede generar un tipo de ritmo cardíaco que no es normal (intervalo QT prolongado). Llame al médico de inmediato si su hijo tiene latidos cardíacos acelerados o que no parecen normales o si se desmaya.

Si su hijo es sexualmente activo o puede serlo:

- Problemas de desempeño sexual, como disminución del interés sexual o problemas de eyaculación.

Si su hija tiene períodos menstruales:

- En el caso de las mujeres, sin período.

Inyección:

- Irritación severa en el lugar de la inyección.

¿Qué otros efectos secundarios tiene este medicamento?

Todos los medicamentos pueden tener efectos secundarios. Sin embargo, muchas personas no padecen ningún efecto secundario o padecen solamente efectos secundarios menores. Llame al médico de su hijo o busque ayuda médica si al niño le molesta alguno de estos efectos secundarios o no desaparece:

Todas las presentaciones:

- Dolor de cabeza.
- Aumento de peso.
- Estreñimiento.
- Mareos.
- Somnolencia.
- Ansiedad.
- Náusea o vómito.
- Irritación en la nariz y la boca.
- Agitación.
- Se siente cansado o débil.

Tabletas:

- Es posible que vea la cobertura de la tableta en las heces de su hijo. Esto es normal y no es motivo de inquietud.

Inyección:

- Irritación en la zona en la que se aplicó la inyección.

Estos no son todos los efectos secundarios que podrían ocurrir. Si tiene preguntas acerca de los efectos secundarios, llame al médico de su hijo. Llame al médico de su hijo para que le aconseje acerca de los efectos secundarios.

Puede informar los efectos secundarios al organismo de salud de su país.

¿Cuál es la mejor forma de tomarlo?

Administre este medicamento según las instrucciones del médico de su hijo. Lea toda la información que se le brinde. Siga todas las instrucciones con atención.

Tabletas:

- Administre este medicamento con o sin alimentos.
- Administre este medicamento con un vaso de agua completo.
- El niño debe tragarla entera. Anime al niño a no masticar, romper o triturarla.
- Para sacar el mayor provecho de este medicamento, no

permita que el niño se salte ninguna dosis.

- Siga administrando este medicamento a su hijo según se lo indique el médico u otro proveedor de atención médica, aun si el niño se siente bien.
- Si el niño tiene problemas al tragar, hable con un un proveedor de salud médica.

Inyección:

- Este medicamento se administra en forma de inyección intramuscular.

Todas las presentaciones:

- Anime al niño a que beba mucho líquido sin cafeína todos los días, a menos que el médico le indique lo contrario.

¿Qué hago si mi hijo/hija olvida tomar una dosis?

Tabletas:

- Administre la dosis que olvidó lo antes posible.
- Si ya casi es hora de la dosis siguiente, sátese la dosis faltante y continúe con el horario habitual del niño.
- No administre 2 dosis simultáneamente ni administre dosis adicionales.

Inyección:

- Llame al médico de su hijo para obtener instrucciones.

¿Cómo debo guardar y/o desechar este medicamento?

Tabletas:

- Conserve a temperatura ambiente.
- Mantener en un lugar seco. No conservar en un baño.

Inyección:

- Si debe almacenar este medicamento en su hogar, hable con el médico de su hijo, la enfermera o el farmacéutico sobre las condiciones de almacenamiento.

Todas las presentaciones:

- Guarde los medicamentos en un lugar seguro. Mantenga todo medicamento fuera del alcance de los niños y las mascotas.
- Deseche los medicamentos sin usar o que hayan expirado. No los tire por el retrete ni los vierta al desagüe a menos que así se lo indiquen. Consulte con el farmacéutico si tiene preguntas sobre la mejor manera de desechar medicamentos. Pueden existir programas de devolución de medicamentos en su área.

Afirmaciones generales

- Si los síntomas o trastornos de su hijo no mejoran o si empeoran, llame al médico de su hijo.
- No comparta el medicamento del niño con otras personas ni le de al niño el medicamento de ninguna otra persona.
- Lleve consigo una lista de todos los medicamentos que el

niño toma (recetados, productos naturales, vitaminas, medicamentos que obtuvo sin receta). Entregue esta lista al médico del niño.

- Hable con el médico de su hijo antes de administrarle cualquier medicamento nuevo, ya sea uno recetado o de venta libre, productos naturales o vitaminas.
- Algunos medicamentos pueden tener otro folleto informativo para el paciente. Si tiene alguna pregunta sobre este medicamento, hable con su médico, enfermera, farmacéutico u otro proveedor de atención médica.
- Si cree que ha habido una sobredosis, llame al centro de toxicología local o busque atención médica de inmediato. Prepárese para responder qué se ingirió, qué cantidad y cuándo.

Exención de responsabilidad y uso de la información del consumidor

No se debe utilizar esta información para decidir si se debe tomar este medicamento o cualquier otro. Solamente el proveedor de atención médica tiene el conocimiento y la capacitación para decidir qué medicamentos son adecuados para un paciente específico. Esta información no recomienda ningún medicamento como seguro, eficaz o aprobado para tratar a ningún paciente o enfermedad. Es solamente un breve resumen de información general sobre este medicamento. NO incluye toda la información sobre los usos, las instrucciones, las advertencias, las precauciones, las interacciones, los efectos

secundarios o los riesgos posibles que podrían aplicarse a este medicamento. Esta información no constituye asesoramiento médico específico y no reemplaza la información que usted recibe de su proveedor de atención médica. Debe hablar con el proveedor de atención médica para obtener información completa sobre los riesgos y los beneficios de tomar este medicamento.

Copyright

© 2019 Wolters Kluwer Clinical Drug Information, Inc. y sus licenciantes y/o afiliados. Todos los derechos reservados.

Si tiene preguntas, llame a un miembro de su equipo de atención médica directamente. Si es paciente de MSK puede comunicarse con un proveedor de cuidados de la salud después de las 5:00 PM, durante los fines de semana y los feriados, llame al 212-639-2000.

Para obtener más recursos, visite www.mskcc.org/pe y podrá hacer búsquedas en nuestra biblioteca virtual.

Paliperidone - Last updated on September 22, 2019

©2019 Memorial Sloan Kettering Cancer Center