



EDUCACIÓN DE PACIENTES Y CUIDADORES

# Peginterferon Beta-1a

Esta información de Lexicomp® le explica lo que debe saber sobre este medicamento, por ejemplo, para qué se usa, cómo tomarlo, sus efectos secundarios y cuándo llamar a su proveedor de cuidados de la salud.

## Marcas estadounidenses

Plegridy; Plegridy Starter Pack

## ¿Para qué se usa este medicamento?

- Este medicamento se utiliza para tratar la esclerosis múltiple.

## ¿Qué debo informar al médico ANTES de tomar este medicamento?

- Si es alérgico al interferón beta-1a o cualquier otro componente de este medicamento.
- Si es alérgico a algún medicamento como este, a otros medicamentos, alimentos o sustancias. Informe a su médico acerca de esta alergia y qué síntomas ha presentado, tales como, sarpullido; urticaria; comezón; falta de aire; sibilancia; tos; inflamación de la cara, los labios, la lengua o la garganta o cualquier otro síntoma.

Este medicamento puede interactuar con otros medicamentos o trastornos.

Informe a su médico y farmacéutico acerca de todos los medicamentos que tome (sean estos recetados o de venta libre, productos naturales, vitaminas) y los trastornos que tenga. Debe verificar que sea seguro para usted tomar este medicamento junto con todos sus otros medicamentos y trastornos. No empiece, detenga ni modifique la dosis de ningún medicamento sin consultar antes al médico.

## ¿Qué debo tener en cuenta al usar este medicamento?

- Avise a todos sus proveedores de atención médica que toma este medicamento. Esto incluye a los médicos, enfermeras, farmacéuticos y dentistas.
- Controle la función sanguínea según le indique el médico. Consulte al médico.
- Consulte a su médico antes de beber alcohol.
- En muchos casos, las reacciones suceden en el sitio donde se aplicó la inyección. A veces, pueden producirse reacciones graves. Consulte con su médico si tiene cualquier reacción que le produce molestias o no desaparece. Llame a su médico de inmediato si tiene alguna lesión en la piel, cambios de color (azul o negro), inflamación o drenaje de líquido en el sitio donde se aplicó la inyección.
- Problemas de salud muy graves como púrpura trombocitopénica trombótica/síndrome hemolítico urémico (PTT/SHU) se han presentado con el uso de medicamentos como este. En ocasiones, este problema resultó mortal. Esto ha ocurrido varias semanas o años luego de iniciar el tratamiento. Llame a su médico de inmediato si se siente muy cansado o débil, tiene hematomas o hemorragias, cambios en el equilibrio, cambios en la visión, cambios en la cantidad de orina, orina oscura, fiebre, piel pálida, dificultades para hablar o pensar, debilidad de 1 lado del cuerpo o piel u ojos amarillos.
- Informe a su médico si está embarazada o tiene intención de embarazarse. Tendrá que hablar acerca de los riesgos y beneficios de utilizar este medicamento mientras esté embarazada.
- Informe a su médico si está amamantando a su bebé. Tendrá que hablar acerca de si hay riesgos para el bebé.

## Razones por las que debe llamar a su médico de inmediato.

**ADVERTENCIA/PRECAUCIÓN:** A pesar de que es muy poco frecuente, algunas personas pueden sufrir efectos secundarios muy graves, que causen incluso la muerte, al tomar un medicamento. Si presenta alguno de los siguientes signos o síntomas que puedan estar relacionados con un efecto

secundario muy grave, infórmelo a su médico o busque asistencia médica de inmediato:

- Signos de reacción alérgica tales como sarpullido; urticaria; picazón; piel enrojecida, hinchada, con ampollas o descamada, con o sin fiebre; sibilancia; opresión en el pecho o la garganta; problemas para respirar, tragar o hablar; ronquera inusual; o hinchazón de la boca, el rostro, los labios, la lengua o la garganta.
- Signos o síntomas de depresión, ideas de suicidio, nervios, irregularidades emocionales, pensamiento anormal, ansiedad, falta de interés en la vida.
- Síntomas de problemas cardíacos como dolor en el pecho, ritmo cardíaco acelerado, ritmo cardíaco anormal o falta de aire.
- Signos de problemas de tiroides como cambios en el peso sin proponérselo, sensación de nervios y excitación, sensación de intranquilidad, sensación de debilidad intensa, debilitamiento del cabello, falta de ánimo (depresión), hinchazón en el cuello, incapacidad para concentrarse, incapacidad para manejar el calor o el frío, cambios en el período (menstrual), temblores o sudoración.
- Falta de aire, mucho aumento peso, inflamación en los brazos o piernas.
- Convulsiones.
- Mareos severos o desmayos.
- Algunas personas que tomaron este medicamento presentaron problemas de hígado muy graves, y a veces mortales. Llame a su médico de inmediato si tiene síntomas de problemas en el hígado como orina oscura, cansancio, falta de apetito, malestar o dolor estomacal, heces de color claro, vómitos o piel u ojos amarillentos.
- Este medicamento ha causado un recuento bajo de glóbulos. Si los recuentos de glóbulos disminuyen demasiado, esto puede provocar problemas de hemorragia, infecciones o anemia. Llame al médico de inmediato si presenta signos de infección como fiebre, escalofríos o dolor de garganta, hematomas o hemorragias inexplicables o si se siente muy cansado o débil.

**¿Qué otros efectos secundarios tiene este**

## **medicamento?**

Todos los medicamentos pueden tener efectos secundarios. Sin embargo, muchas personas no tienen ningún efecto secundario o tienen solamente efectos secundarios menores. Llame a su médico o busque asistencia médica si le molesta alguno de estos efectos secundarios o no desaparece:

- Síntomas de tipo gripal. Entre otros: dolor de cabeza, debilidad, fiebre, temblores, dolores y sudoración. Un medicamento suave para el dolor puede ayudar.
- Náusea o vómito.
- Dolor en los músculos o las articulaciones.
- Irritación en la zona en la que se aplicó la inyección.

Estos no son todos los efectos secundarios que podrían ocurrir. Si tiene preguntas acerca de los efectos secundarios, llame al médico. Llame al médico para que lo aconseje acerca de los efectos secundarios.

Puede informar los efectos secundarios al organismo de salud de su país.

## **¿Cuál es la mejor forma de tomarlo?**

Tome este medicamento según las indicaciones de su médico. Lea toda la información que se le brinde. Siga todas las instrucciones con atención.

- Este medicamento se administra por inyección en la parte grasa de la piel, en la parte superior del muslo, en la zona abdominal o en la parte superior de brazo.
- Si se inyectará solo, el médico o enfermera le indicarán cómo aplicar la inyección.
- Siga las instrucciones cuidadosamente si usted o un familiar aplicará la inyección en casa.
- Se pueden administrar otros medicamentos antes de este para evitar los efectos secundarios.
- No utilizar si la solución se ve turbia, pierde o contiene partículas.
- No aplique sobre la piel irritada, con hematomas, enrojecimiento, infección o cicatrices.

- Lávese las manos antes y después de usar.
- Antes de usar este medicamento, retírelo del refrigerador y déjelo a temperatura ambiente durante 30 minutos.
- No lo caliente ni lo coloque en el microondas.
- Cambie el lugar donde se aplica la inyección con cada inyección.
- Deseche la jeringa luego de utilizarla una vez. No utilice la misma jeringa más de una vez.
- Deseche las agujas en la caja para agujas y objetos cortantes. No vuelva a utilizar agujas ni otros suministros. Cuando la caja esté llena, siga todos los procedimientos locales para desecharla. Si tiene preguntas, consulte al médico o farmacéutico.

## **¿Qué hago si se me olvida tomar una dosis?**

- Tome la dosis que se saltó lo antes posible y continúe con el horario habitual.
- Si ya casi es hora de la dosis siguiente, sátese la dosis faltante y continúe con el horario habitual.
- No tome dos dosis al mismo tiempo ni tome dosis adicionales.
- Si no está seguro qué hacer si se salta una dosis, llame a su médico.

## **¿Cómo debo conservar este medicamento?**

- Conserve en el refrigerador. No congelar.
- Conserve en el envase de cartón para protegerlo de la luz.
- No utilice el producto si se congeló.
- Si es necesario, se puede almacenar a temperatura ambiente hasta 30 días. Si se almacena a temperatura ambiente y no se utiliza en un plazo de 30 días, deseche el medicamento.
- Si este medicamento se retira del refrigerador, puede volver a guardarse si fuera necesario. La cantidad total de días que puede estar fuera del refrigerador no puede superar los 30 días.
- Guarde los medicamentos en un lugar seguro. Mantenga todo medicamento

fuera del alcance de los niños y las mascotas.

- Deseche los medicamentos sin usar o que hayan expirado. No los tire por el retrete ni los vierta al desagüe a menos que así se lo indiquen. Consulte con el farmacéutico si tiene preguntas sobre la mejor manera de desechar medicamentos. Pueden existir programas de devolución de medicamentos en su área.

## **Afirmaciones generales**

- Si sus síntomas o trastornos no mejoran o si empeoran, llame al médico.
- No comparta su medicamento con otras personas ni tome el medicamento de ninguna otra persona.
- Lleve consigo una lista de todos los medicamentos que toma (recetados, productos naturales, suplementos, vitaminas, medicamentos que obtuvo sin receta). Entregue esta lista al médico.
- Hable con su médico antes de comenzar a tomar cualquier medicamento, ya sea uno recetado o sin receta, productos naturales o vitaminas.
- Algunos medicamentos pueden tener otro folleto informativo para el paciente. Si tiene alguna pregunta sobre este medicamento, hable con su médico, enfermera, farmacéutico u otro proveedor de atención médica.
- Si cree que ha habido una sobredosis, llame al centro de toxicología local o busque atención médica de inmediato. Prepárese para responder qué se ingirió, qué cantidad y cuándo.

## **Exención de responsabilidad y uso de la información del consumidor**

No se debe utilizar esta información para decidir si se debe tomar este medicamento o cualquier otro. Solamente el proveedor de atención médica tiene el conocimiento y la capacitación para decidir qué medicamentos son adecuados para un paciente específico. Esta información no recomienda ningún medicamento como seguro, eficaz o aprobado para tratar a ningún paciente o enfermedad. Es solamente un breve resumen de información general sobre este medicamento. NO incluye toda la información sobre los usos, las instrucciones, las advertencias, las precauciones, las interacciones, los efectos secundarios o los riesgos posibles que podrían aplicarse a este medicamento. Esta información

no constituye asesoramiento médico específico y no reemplaza la información que usted recibe de su proveedor de atención médica. Debe hablar con el proveedor de atención médica para obtener información completa sobre los riesgos y los beneficios de tomar este medicamento.

## Copyright

© 2019 Wolters Kluwer Clinical Drug Information, Inc. y sus licenciantes y/o afiliados. Todos los derechos reservados.

Si tiene preguntas, llame a un miembro de su equipo de atención médica directamente. Si es paciente de MSK puede comunicarse con un proveedor de cuidados de la salud después de las 5:00 PM, durante los fines de semana y los feriados, llame al 212-639-2000.

Para obtener más recursos, visite [www.mskcc.org/pe](http://www.mskcc.org/pe) y podrá hacer búsquedas en nuestra biblioteca virtual.

---

Peginterferon Beta-1a - Generated on July 19, 2019

©2019 Memorial Sloan Kettering Cancer Center