



EDUCACIÓN PARA PACIENTES Y CUIDADORES

Información sobre los implantes de pene

En esta información se explican los implantes de pene, incluidos los beneficios, los riesgos y las posibles complicaciones. Lea esta información atentamente antes de decidir si quiere hacerse un implante de pene. Si tiene preguntas, hable con su proveedor de cuidados de la salud.

Implantes de pene

Un implante de pene es un dispositivo inflable que se coloca dentro del pene. Lo ayuda a tener una erección (que el pene se ponga duro para tener relaciones sexuales). Los implantes de pene se usan para tratar la impotencia (la incapacidad para tener una erección o mantenerla). Esto también se llama disfunción eréctil.

El implante de pene se coloca mediante una cirugía y queda completamente dentro del cuerpo. Para usar el implante, usted deberá presionar una bomba ubicada dentro del escroto. El escroto envía líquido hacia el interior del implante que se encuentra dentro del pene. Esto hace que el pene se ponga lo suficientemente duro como para tener relaciones sexuales. Cuando haya terminado con la erección, puede desinflar el implante. Su proveedor de cuidados de la salud le dará más información durante su consulta. Después de la cirugía se le programará una sesión de entrenamiento para usar el implante de pene.

Puede ser conveniente que considere un implante de pene si:

- Probó otros tratamientos para la disfunción eréctil, pero no funcionaron. Otros tratamientos incluyen medicamentos, inyecciones y dispositivos de vacío.

- Probó otros tratamientos, pero tuvo efectos secundarios.

Los implantes de pene no aumentan la longitud ni la circunferencia (medida alrededor) del pene.

Beneficios de los implantes de pene

- El implante de pene puede hacer que el pene se ponga duro, de manera similar a una erección natural.
- No es necesario que tome ningún medicamento para que funcione.

Riesgos de los implantes de pene

- El implante debe colocarse durante una cirugía. Toda cirugía tiene riesgos. Su proveedor de cuidados de la salud hablará sobre los riesgos de esta cirugía con usted.
- La cirugía de implante de pene es irreversible. Esto significa que el implante no puede retirarse si usted ya no desea tenerlo. Ningún otro tratamiento para la disfunción eréctil le funcionará.

Posibles complicaciones

Si bien las complicaciones tras una cirugía de implante de pene son poco frecuentes, pueden ocurrir. Algunas posibles complicaciones tienen más probabilidades de ocurrir inmediatamente después de la cirugía, entre ellas:

- Hematoma del escroto.
 - Esto es hinchazón y moretones en el escroto, la parte baja del abdomen (la barriga) y la parte interna de los muslos.
 - El riesgo de que aparezca hematoma del escroto es mayor en las primeras semanas posteriores a la cirugía.
 - Su proveedor de cuidados de la salud le dará instrucciones sobre cómo evitar el hematoma del escroto. Usted también recibirá ropa interior

especial para usar después de su cirugía.

- Infección.
 - El riesgo de infección aumenta en las primeras 8 semanas después de la cirugía, aunque puede producirse una infección hasta 1 año después de esta.
 - Usted tiene más posibilidades de tener una infección si es su segunda cirugía de implante de pene.
 - Si el implante se infecta, será necesario retirarlo y reemplazarlo. Es posible que deba permanecer en el hospital si hay que administrarle antibióticos por vía intravenosa (IV) para detener la infección.

También puede tener algunos problemas meses o años después de la cirugía, entre ellos:

- Su implante deja de funcionar. Si esto ocurre, será necesario repararlo o reemplazarlo.
- Su implante puede desgastarse con el paso del tiempo. Si esto ocurre, deberá someterse a otra cirugía. El cirujano determinará si el dispositivo puede repararse o si hay que reemplazarlo.
- El implante se infla solo. Si esto ocurre, avise a su equipo de atención médica.
- Las siguientes son otras complicaciones menos comunes que pueden ocurrir:
 - Erosión, que es cuando el implante traspasa la piel. Esto es más probable que ocurra si usted ha tenido una infección. Si esto ocurre, será necesario retirar el implante.
 - Migración, que es cuando el implante se sale de lugar. Si esto ocurre, quizás deba someterse a otra cirugía.

El equipo de atención médica analizará todos los riesgos, beneficios y posibles complicaciones con usted durante las consultas.

Qué esperar después de la cirugía

- La mayoría de las personas dejan el hospital pocas horas después de la cirugía. Algunas deben permanecer una noche en el hospital. Su proveedor de cuidados de la salud le dirá cuándo puede planear su salida del hospital.
- No puede masturbarse ni realizar ningún tipo de actividad sexual durante 6 semanas después de la cirugía. Esto incluye relaciones sexuales por vía vaginal, oral y anal.
- Le recomendamos que se tome al menos 7 días libres en su trabajo para recuperarse.
- Puede tener dolor e inflamación durante unas 2 semanas después de la cirugía.
- Es posible que deban transcurrir más de 6 meses para que el pene vuelva a sentirse normal.
- No debería haber ningún cambio en la calidad de la eyaculación ni en el orgasmo.

Seguimiento

- Tendrá una cita de seguimiento 2 semanas después de la cirugía para examinar su progreso. Se le programará esa cita.
- Tendrá otra cita de seguimiento 6 semanas después de la cirugía para aprender a usar el implante de pene.

Si tiene preguntas o inquietudes después de la cirugía, llame a su equipo de atención médica.

Si tiene preguntas o inquietudes, contáctese con su proveedor de cuidados de la salud. Un integrante de su equipo de atención le responderá de lunes a viernes de 9 a. m. a 5 p. m. Fuera de ese horario, puede dejar un mensaje o hablar con otro proveedor de MSK. Siempre hay un médico o un enfermero de guardia. Si no está seguro de cómo comunicarse con su proveedor de cuidados de la salud, llame al 212-639-2000.

Para obtener más recursos, visite www.mskcc.org/pe y busque en nuestra biblioteca virtual.

About Penile Implants - Last updated on August 24, 2023

Todos los derechos son propiedad y se reservan a favor de Memorial Sloan Kettering Cancer Center