



EDUCACIÓN PARA PACIENTES Y CUIDADORES

Pautas sobre la vacuna neumocócica para adultos con cáncer

En esta información se explica qué son las vacunas neumocócicas y cuándo debe recibirlas.

Las vacunas neumocócicas ayudan a prevenir la infección por bacterias neumocócicas. Estas bacterias pueden causar neumonía (infección pulmonar), meningitis (inflamación de las membranas que rodean el cerebro) y otras enfermedades graves que pueden provocar la muerte.

Existen 2 tipos de vacunas neumocócicas: Prevnar 13[®] y Pneumovax[®]23. Estas dos vacunas protegen contra varias cepas de la bacteria. Se administran como inyección (pinchazo) en el músculo.

Cronograma de vacunas

Si nunca recibió una vacuna neumocócica y tiene más de 18 años, recomendamos que reciba las siguientes vacunas:

- Prevnar 13 en su próxima cita con su proveedor de cuidados de la salud.
- Pneumovax 23 al menos 8 semanas después de Prevnar 13.

Si ya recibió Pneumovax 23, espere a que transcurra 1 año para darse Prevnar 13.

Hable con su proveedor de cuidados de la salud si tiene alguna duda sobre las vacunas neumocócicas.

Si tiene preguntas o inquietudes, contáctese con su proveedor de cuidados de la salud. Un integrante de su equipo de atención le responderá de lunes a viernes de 9 a. m. a 5 p. m. Fuera de ese horario, puede dejar un mensaje o hablar con otro proveedor de MSK. Siempre hay un médico o un enfermero de guardia. Si no está seguro de cómo comunicarse con su proveedor de cuidados de la salud, llame al 212-639-2000.

Para obtener más recursos, visite www.mskcc.org/pe y busque en nuestra biblioteca virtual.

Pneumococcal Vaccination Guidelines for Adults with Cancer - Last updated on September 28, 2021

Todos los derechos son propiedad y se reservan a favor de Memorial Sloan Kettering Cancer Center