



## EDUCACIÓN PARA PACIENTES Y CUIDADORES

# Priapismo (erección que persiste demasiado tiempo)

En esta información se le explica lo que debe hacer si presenta priapismo.

## Información sobre el priapismo.

El priapismo es una erección que persiste demasiado tiempo. El priapismo se presenta sin estimulación sexual y no desaparece después del orgasmo. Hay riesgo de tener priapismo después de una terapia con inyección en el pene.

Si se presenta una erección total, no fluye sangre fresca al pene. Esto significa que el pene no está recibiendo oxígeno, lo que puede dañar el tejido y causar disfunción eréctil (ED) permanente.

## Información sobre Pseudoephedrine HCl (Sudafed®)

Si tiene priapismo, le puede ayudar tomar pseudoephedrine HCl (Sudafed®). Puede comprar pseudoephedrine HCl en la farmacia local sin receta, pero

las cajas se guardan detrás del mostrador de la farmacia.

Para comprar pseudoephedrine HCL, llévele la tarjeta de pseudoephedrine HCl que se encuentra en el estante al farmacéutico (véase la figura 1).

Deberá mostrar una identificación con foto antes de que el farmacéutico le entregue la caja para comprarla. No compre pseudoephedrine HCL que esté en estante. Es

phenylephrine y no es un medicamento adecuado para tratar el priapismo.

Si tiene problemas cardíacos, pregúntele a su cardiólogo si es seguro tomar pseudoephedrine HCl.

Si se coloca inyecciones en el pene, asegúrese de tener pseudoephedrine HCl durante todo el tiempo que se las ponga.

## Si presenta priapismo

- Si tiene una erección con rigidez de penetración (un 6 o más en la escala de rigidez de la erección) que persista 2 horas, tome 4 tabletas (30 mg) de pseudoephedrine HCl



Figura 1. Pseudoephedrine HCl (Sudafed)

(Sudafed). No tome tabletas de liberación prolongada o de acción prolongada, como Sudafed 12 hour. Consulte a un farmacéutico o a un proveedor de práctica avanzada (APP) si tiene preguntas. La farmacia le enviará la pseudoephedrine HCl junto con la ampolla de medicamento y las jeringas, o bien puede comprarla en la farmacia local.

- Si la rigidez de la erección se vuelve menor a rigidez de penetración luego de una hora de tomar pseudoephedrine HCl, llame al consultorio de su proveedor de cuidados de la salud al día siguiente para hablar con su APP. No debe seguir inyectándose la misma dosis si tomó pseudoephedrine HCl para una erección prolongada. El profesional especializado realizará cambios a la dosis de la terapia de inyecciones en el pene. No se inyecte nuevamente hasta que hable con su proveedor de cuidados de la salud.
- **Si tiene una erección que persista 3 horas (si todavía tiene una erección 1 hora después de tomar pseudoephedrine HCl), llame al profesional especializado.**
  - Puede llamar al profesional especializado de lunes a viernes entre 9:00 a.m. y 5:00 p.m.

- Entre las 5:00 p.m. y las 9:00 a.m., durante los fines de semana y los días feriados, llame al 212-639-2000 y pida hablar con el urólogo de guardia.
- Diríjase al Centro de Atención de Urgencia de MSK en el Memorial Hospital (1275 York Avenue, entre las calles East 67<sup>th</sup> y East 68 ) si se encuentra a menos de 30 minutos de distancia. El profesional especializado llamará al Centro de Atención de Urgencia para que lo esperen. El profesional especializado le dará más instrucciones durante su llamada.
- **Si tiene una erección que persista 4 horas y no ha hablado con el profesional especializado, entonces se trata de una emergencia médica. Así que debe tratarla con la misma urgencia que un ataque al corazón. Las erecciones que persisten por más de 4 horas pueden causar daño permanente al tejido de erección.**
  - Diríjase al Centro de Atención de Urgencia de MSK si se encuentra a menos de 30 minutos de distancia. Pregúntele al guardia que esté en la entrada del hospital cómo llegar allí.
  - Diríjase a la sala de emergencias local si está a más de 30 minutos del Memorial Hospital.
  - Dígame al personal del Centro de Atención de Urgencia o de la sala de emergencias que ha tenido una

erección por 4 horas. Un proveedor de cuidados de la salud debe atenderlo de inmediato. Si no recibe tratamiento rápidamente, es posible que sufra ED permanente.

- Muéstrela al proveedor de cuidados de la salud la tarjeta de priapismo que le dieron para llevarla en la billetera. También puede pedirle al proveedor de cuidados de la salud que nos llame a los números que figuran más arriba.

Si tiene preguntas o inquietudes, contáctese con su proveedor de cuidados de la salud. Un integrante de su equipo de atención le responderá de lunes a viernes de 9 a. m. a 5 p. m. Fuera de ese horario, puede dejar un mensaje o hablar con otro proveedor de MSK. Siempre hay un médico o un enfermero de guardia. Si no está seguro de cómo comunicarse con su proveedor de cuidados de la salud, llame al 212-639-2000.

Para obtener más recursos, visite [www.mskcc.org/pe](http://www.mskcc.org/pe) y busque en nuestra biblioteca virtual.

Priapism (An Erection that Lasts Too Long) - Last updated on May 6, 2021

Todos los derechos son propiedad y se reservan a favor de Memorial Sloan Kettering Cancer Center