



EDUCACIÓN PARA PACIENTES Y CUIDADORES

Priapismo (erección que persiste demasiado tiempo)

En esta información se le explica lo que debe hacer si presenta priapismo.

Información sobre el priapismo.

El priapismo es una erección que persiste demasiado tiempo. El priapismo se presenta sin estimulación sexual y no desaparece después del orgasmo. Hay riesgo de tener priapismo después de una terapia con inyección en el pene.

Si se presenta una erección total, no fluye sangre fresca al pene. Esto significa que el pene no está recibiendo oxígeno, lo que puede dañar el tejido y causar disfunción eréctil (ED) permanente.

Información sobre Pseudoephedrine HCl (Sudafed®)

Si tiene priapismo, le puede ayudar tomar pseudoephedrine HCl. Puede comprar pseudoephedrine HCl en la farmacia local sin receta, pero las cajas se guardan detrás del mostrador de la

farmacia.

Para comprar pseudoephedrine HCl, llévele la tarjeta de pseudoephedrine HCl que se encuentra en el estante al farmacéutico (véase la figura 1).

Deberá mostrar una identificación con foto antes de que el farmacéutico le entregue la caja para comprarla.

Si tiene problemas cardíacos, pregúntele a su cardiólogo si es seguro tomar pseudoephedrine HCl.

Si se coloca inyecciones en el pene, asegúrese de tener pseudoephedrine HCl durante todo el tiempo que se las ponga.

Si presenta priapismo

- **Si tiene una erección con rigidez de penetración (un 6 o más en la escala de rigidez de la erección) que persista 2 horas, tome 4 tabletas (30 mg) de pseudoephedrine HCl (Sudafed).** No tome tabletas de liberación prolongada o de acción prolongada, como Sudafed 12 hour. Acuda a un farmacéutico o a un profesional especializado si tiene preguntas. La farmacia le enviará la



Figura 1. Pseudoephedrine HCl (Sudafed)

pseudoephedrine HCl junto con la ampolla de medicamento y las jeringas, o bien puede comprarla en la farmacia local.

- Si la rigidez de la erección se vuelve menor a rigidez de penetración luego de una hora de tomar pseudoephedrine HCl, llame al consultorio del médico al siguiente día para hablar con el profesional especializado. No debe seguir inyectándose la misma dosis si tomó pseudoephedrine HCl por tener una erección prolongada. El profesional especializado realizará cambios a la dosis de la terapia de inyecciones en el pene.
- **Si tiene una erección que persista 3 horas (si todavía tiene una erección 1 hora después de tomar pseudoephedrine HCl), llame al profesional especializado.**
 - Puede llamar al profesional especializado de lunes a viernes entre 9:00 AM y 5:00 PM.
 - Número de teléfono:

 - Entre las 5:00 PM y las 9:00 AM, durante los fines de semana y los días feriados, llame al 212-639-2000 y pida hablar con el urólogo de guardia.
 - Diríjase al Centro de Atención de Urgencia de MSK en el Memorial Hospital (1275 York Avenue, entre las calles East 67th y East 68th) si se encuentra a menos de 30 minutos de

distancia. El profesional especializado llamará al Centro de Atención de Urgencia para que lo esperen. El profesional especializado le dará más instrucciones durante su llamada.

- **Si tiene una erección que persista 4 horas y no ha hablado con el profesional especializado, entonces se trata de una emergencia médica** Así que debe tratarla con la misma urgencia que un ataque al corazón. Las erecciones que persisten por más de 4 horas pueden causar daño permanente al tejido de erección.
 - Diríjase al Centro de Atención de Urgencia de MSK si se encuentra a menos de 30 minutos de distancia. Pregúntele al guardia que esté en la entrada del hospital cómo llegar allí.
 - Diríjase a la sala de emergencias local si está a más de 30 minutos del Memorial Hospital.
 - Dígale al personal del Centro de Atención de Urgencia o de la sala de emergencias que ha tenido una erección por 4 horas. Un médico o enfermero debe verlo de inmediato. Si no recibe tratamiento rápidamente, es posible que sufra ED permanente.
 - Muéstrela al médico o enfermero la tarjeta de priapismo que le dieron para llevarla en la billetera. También puede pedirle al médico o enfermero que nos llame a los números que figuran a continuación.

Si tiene preguntas, contacte a un integrante del equipo de atención médica directamente. Si es paciente de MSK y necesita comunicarse con un proveedor después de las 5:00 PM, durante el fin de semana o un día feriado, llame al 212-639-2000.

Para obtener más recursos, visite www.mskcc.org/pe y busque en nuestra biblioteca virtual.

Priapism (An Erection that Lasts Too Long) - Last updated on April 17, 2019

Todos los derechos son propiedad y se reservan a favor de Memorial Sloan Kettering Cancer Center