

EDUCACIÓN PARA PACIENTES Y CUIDADORES

Ramipril

Esta información de Lexicomp® le explica lo que debe saber sobre este medicamento, por ejemplo, para qué se usa, cómo tomarlo, sus efectos secundarios y cuándo llamar a su proveedor de cuidados de la salud.

Marcas estadounidenses

Altace

Marcas canadienses

ACT Ramipril; Altace; Apo-Ramipril; Auro-Ramipri; Dom-Ramipril; JAMP-Ramipril; Mar-Ramipril; Mint-Ramipril; Mylan-Ramipril; PMS-Ramipril; Pro-Ramipril; RAN-Ramipril; Sandoz-Ramipril; Teva-Ramipril; Van-Ramipril

Advertencia

Si su hija está o podría estar embarazada.

- No le administre este medicamento a su hija si está embarazada. El uso durante el embarazo puede causar defectos de nacimiento o la pérdida del feto. Si su hija queda embarazada o planea hacerlo mientras toma este medicamento, llame al médico de inmediato.

¿Para qué se usa este medicamento?

- Este medicamento se utiliza para tratar la insuficiencia cardíaca (corazón debilitado).
- Este medicamento se utiliza para tratar la presión arterial alta.
- Este medicamento se utiliza para mejorar la función cardíaca luego de un ataque al corazón.
- Se utiliza para prevenir ataques cardíacos.
- Este medicamento se utiliza para evitar los accidentes cerebrovasculares.
- Se le puede recetar este medicamento al niño por otras razones. Consulte al médico.

¿Qué debo informar al médico ANTES de que mi hijo/hija tome este medicamento?

- Si su hijo tiene alergia a este medicamento o a alguno de sus componentes.
- Si su hijo es alérgico a algún medicamento como este o a otros medicamentos, alimentos o sustancias. Informe al médico acerca de la alergia y qué síntomas presentó su hijo, tales como sarpullido; urticaria; picazón; falta de aire; sibilancias; tos; inflamación de la cara, los labios, la lengua o la garganta o cualquier otro síntoma.
- Si alguna vez el niño ha tenido una reacción muy grave o

potencialmente mortal llamada angioedema. Los signos pueden ser hinchazón de las manos, la cara, los labios, los ojos, la lengua o la garganta; problemas para respirar; problemas para tragar y una ronquera inusual.

- Si el niño toma un medicamento que contiene aliskiren y además tiene niveles altos de azúcar en la sangre (diabetes) o problemas renales. Consulte con el médico o el farmacéutico si no está seguro si un medicamento que tome el niño contiene aliskiren.
- Si su hijo está tomando telmisartán.

Esta no es una lista de todos los medicamentos o trastornos que pueden interactuar con este medicamento.

Informe al médico y al farmacéutico todos los medicamentos que su hijo toma (sean estos recetados o de venta libre, productos naturales o vitaminas) y de los problemas de salud que padece. Debe verificar que sea seguro para su hijo tomar este medicamento con todos sus otros medicamentos y problemas de salud. No empiece, interrumpa ni modifique la dosis de ningún medicamento que tome su hijo sin consultar antes con el médico.

¿Hay algo que deba saber o hacer mientras mi hijo/hija toma este medicamento?

- Avise a todos los proveedores de atención médica de su hijo que el niño toma este medicamento. Esto incluye a los

médicos, enfermeras, farmacéuticos y dentistas del niño.

- El niño debe evitar las tareas o las acciones que requieren un estado de alerta hasta que usted observe cómo este medicamento afecta a su hijo. Estas son actividades como andar en bicicleta, practicar deportes o usar elementos como tijeras, podadoras de césped, motocicletas eléctricas, automóviles de juguete o vehículos motorizados.
- Para reducir la probabilidad de sentirse mareado o perder la conciencia, procure que su hijo se levante lentamente después de unos pocos minutos cuando se siente o se recuesta. Los niños deben tener mayor cuidado al subir las escaleras.
- Tómele la presión arterial a su hijo con frecuencia. Hable con el médico de su hijo.
- Pida que le hagan análisis de sangre de control al niño. Hable con el médico del niño.
- Si el niño consume sustitutos de la sal que contengan potasio, diuréticos ahorradores de potasio o potasio adicional, consulte al médico.
- Si su hijo sigue una dieta baja en sal o sin sal, consulte a su médico.
- Se han producido recuentos bajos de glóbulos blancos con el captopril, un medicamento parecido a este. Esto puede derivar en una mayor probabilidad de contraer una infección. La mayoría de las veces, esto ha sucedido en personas con

problemas de riñón, principalmente si tienen otros problemas de salud determinados. Llame al médico de inmediato si el niño tiene signos de una infección como fiebre, escalofríos y dolor de garganta. Consulte al médico.

- Si el niño está tomando este medicamento y tiene presión alta, consulte al médico antes de usar productos de venta libre que pueden elevar la presión. Algunos de ellos son: remedios para la tos y el resfriado, pastillas dietéticas, estimulantes, ibuprofeno o productos similares y ciertos productos naturales o suplementos.
- El alcohol puede interactuar con este medicamento. Asegúrese de que su hijo no beba alcohol.
- El niño debe tener cuidado con el clima cálido o mientras está activo. El niño debe beber mucho líquido para evitar la deshidratación.
- Informe al médico si el niño tiene demasiada sudoración, pérdida de líquido, vómitos o diarrea. Esto puede derivar en presión baja.
- Es posible que este medicamento no tenga la misma efectividad en los pacientes de raza negra. Consulte al médico.
- Este medicamento ha causado una reacción muy grave llamada angioedema. En ocasiones, este problema resultó mortal. La probabilidad de tener angioedema puede ser más alta en los pacientes de raza negra. Consulte con el médico.

Si su hija está amamantando a un bebé:

- Informe al médico si está amamantando a su hijo. Deberá hablar acerca de los riesgos para el bebé.

¿Cuáles son los efectos secundarios por los que debo llamar al médico de mi hijo/hija de inmediato?

ADVERTENCIA/PRECAUCIÓN: *a pesar de que es muy poco frecuente, algunas personas pueden sufrir efectos secundarios muy graves, y en ocasiones mortales, al tomar un medicamento. Si su hijo presenta alguno de los siguientes signos o síntomas que pueden estar relacionados con un efecto secundario muy grave, infórmelo al médico de su hijo o busque ayuda médica de inmediato:*

- Síntomas de una reacción alérgica tales como sarpullido; urticaria; comezón; piel inflamada, con ampollas o descamada con o sin fiebre; silbido en el pecho; opresión en el pecho o la garganta; problemas para respirar o hablar; ronquera inusual; o hinchazón de la boca, el rostro, los labios, la lengua o la garganta.
- Signos de problemas renales como la incapacidad de orinar, cambios en la cantidad de orina, sangre en la orina o un aumento de peso importante.
- Síntomas de un nivel alto de potasio tales como un latido cardíaco que no parece normal; cambios en la manera de pensar con claridad y lógica; sensación de debilidad, mareos o

vértigo; sensación de desmayo; entumecimiento u hormigueo; o falta de aire.

- Mareos severos o desmayos.
- Tos persistente.
- Dolor de pecho.
- Dolor severo de panza.
- Las náuseas y los vómitos severos.
- Se han presentado problemas de hígado muy graves y, en ocasiones, mortales con este medicamento. Llame al médico de su hijo de inmediato si el niño presenta signos de problemas hepáticos como orina oscura, cansancio, falta de apetito, malestar o dolor estomacal, heces de color claro, vómitos o piel u ojos amarillentos.

¿Qué otros efectos secundarios tiene este medicamento?

Todos los medicamentos pueden tener efectos secundarios. Sin embargo, muchas personas no padecen ningún efecto secundario o padecen solamente efectos secundarios menores. Llame al médico de su hijo o busque ayuda médica si al niño le molesta alguno de estos efectos secundarios o no desaparece:

- Mareos.
- Dolor de cabeza.
- Tos.

- Se siente cansado o débil.

Estos no son todos los efectos secundarios que podrían ocurrir. Si tiene preguntas acerca de los efectos secundarios, llame al médico de su hijo. Llame al médico de su hijo para que le aconseje acerca de los efectos secundarios.

Puede informar los efectos secundarios al organismo de salud de su país.

¿Cuál es la mejor forma de tomarlo?

Administre este medicamento según las instrucciones del médico de su hijo. Lea toda la información que se le brinde. Siga todas las instrucciones con atención.

- Administre este medicamento con o sin alimentos.
- Administre este medicamento aproximadamente a la misma hora del día.
- Siga administrando este medicamento a su hijo según se lo indique el médico u otro proveedor de atención médica, aun si el niño se siente bien.
- Para sacar el mayor provecho de este medicamento, no permita que el niño se salte ninguna dosis.
- El niño debe tragarla entera. Anime al niño a no masticar, romper o triturarla.
- Puede dispersar el contenido de la cápsula en puré de

manzanas o en jugo de manzanas. No permita que su hijo lo mastique.

- Puede esparcir el contenido de la cápsula en un vaso de agua.
- Luego de mezclar, administre la dosis de inmediato. No almacene para un uso posterior.
- Anime al niño a que beba mucho líquido sin cafeína todos los días, a menos que el médico le indique lo contrario.

¿Qué hago si mi hijo/hija olvida tomar una dosis?

- Administre la dosis que olvidó lo antes posible.
- Si ya casi es hora de la dosis siguiente, sátese la dosis faltante y continúe con el horario habitual del niño.
- No administre 2 dosis simultáneamente ni administre dosis adicionales.

¿Cómo debo guardar y/o desechar este medicamento?

- Conserve a temperatura ambiente.
- Mantener en un lugar seco. No conservar en un baño.
- Guarde los medicamentos en un lugar seguro. Mantenga todo medicamento fuera del alcance de los niños y las mascotas.
- Pregunte al farmacéutico cómo se deben desechar los medicamentos no utilizados.

Afirmaciones generales

- Si los síntomas o trastornos de su hijo no mejoran o si empeoran, llame al médico de su hijo.
- No comparta el medicamento del niño con otras personas ni le de al niño el medicamento de ninguna otra persona.
- Lleve consigo una lista de todos los medicamentos de su hijo (recetados o de venta libre, productos naturales, vitaminas). Entregue esta lista al médico del niño.
- Hable con el médico de su hijo antes de administrarle cualquier medicamento nuevo, ya sea uno recetado o de venta libre, productos naturales o vitaminas.
- Algunos medicamentos pueden tener otro folleto informativo para el paciente. Si tiene alguna pregunta sobre este medicamento, hable con el médico de su hijo, enfermera, farmacéutico u otro proveedor de atención médica.
- Si cree que ha habido una sobredosis, llame al centro de toxicología local o busque atención médica de inmediato. Prepárese para responder qué se ingirió, qué cantidad y cuándo.

Exención de responsabilidad y uso de la información del consumidor

No se debe utilizar esta información para decidir si se debe tomar este medicamento o cualquier otro. Solamente el proveedor de atención médica tiene el conocimiento y la capacitación para decidir qué medicamentos son adecuados

para un paciente específico. Esta información no recomienda ningún medicamento como seguro, eficaz o aprobado para tratar a ningún paciente o enfermedad. Es solamente un breve resumen de información general sobre este medicamento. NO incluye toda la información sobre los usos, las instrucciones, las advertencias, las precauciones, las interacciones, los efectos secundarios o los riesgos posibles que podrían aplicarse a este medicamento. Esta información no constituye asesoramiento médico específico y no reemplaza la información que usted recibe de su proveedor de atención médica. Debe hablar con el proveedor de atención médica para obtener información completa sobre los riesgos y los beneficios de tomar este medicamento.

Copyright

© 2017 Wolters Kluwer Clinical Drug Information, Inc. y sus licenciados y/o afiliados. Todos los derechos reservados.

Si tiene preguntas, contacte a un integrante del equipo de atención médica directamente. Si es paciente de MSK y necesita comunicarse con un proveedor después de las 5:00 PM, durante el fin de semana o un día feriado, llame al 212-639-2000.

Para obtener más recursos, visite www.mskcc.org/pe y busque en nuestra biblioteca virtual.

Ramipril - Last updated on December 31, 1969

Todos los derechos son propiedad y se reservan a favor de Memorial Sloan Kettering Cancer Center