



## EDUCACIÓN DE PACIENTES Y CUIDADORES

# Ranitidine

Esta información de Lexicomp® le explica lo que debe saber sobre este medicamento, por ejemplo, para qué se usa, cómo tomarlo, sus efectos secundarios y cuándo llamar a su proveedor de cuidados de la salud.

### **Marcas estadounidenses**

Acid Reducer [OTC]; GoodSense Acid Reducer [OTC]; raNITidine 150 Max Strength [OTC]; raNITidine Acid Reducer [OTC]; Zantac; Zantac 150 Maximum Strength [OTC]; Zantac 75 [OTC]

### **Marcas canadienses**

Acid Reducer; ACT Ranitidine; Apo-Ranitidine; Dom-Ranitidine; Myl-Ranitidine; Mylan-Ranitidine; PHL-Ranitidine; PMS-Ranitidine; RAN-Ranitidine; Ranitidine Injection, USP; Riva-Ranitidine; Sandoz-Ranitidine; Teva-Ranitidine; Zantac; Zantac 75; Zantac Maximum Strength Non-Prescription

### **¿Para qué se usa este medicamento?**

- Se utiliza para tratar la enfermedad del reflujo gastroesofágico (ERGE, reflujo de ácido).
- Este medicamento se utiliza para tratar o evitar úlceras

gastrointestinales.

- Este medicamento se utiliza para tratar el ardor de estómago, la indigestión ácida y la acidez estomacal.
- Este medicamento se utiliza para tratar los síndromes provocados por la cantidad elevada de ácidos estomacales.
- Se le puede recetar este medicamento por otras razones. Consulte con su médico.

### **¿Qué debo informar al médico ANTES de tomar este medicamento?**

- Si es alérgico al hidrocloreto de ranitidina o cualquier otro componente de este medicamento.
- Si es alérgico a algún medicamento como este, a otros medicamentos, alimentos o sustancias. Informe a su médico acerca de esta alergia y qué síntomas ha presentado, tales como, sarpullido; urticaria; comezón; falta de aire; sibilancia; tos; inflamación de la cara, los labios, la lengua o la garganta o cualquier otro síntoma.
- Si alguna vez tuvo porfiria.

Esta no es una lista de todos los medicamentos o trastornos que pueden interactuar con este medicamento.

Informe a su médico y farmacéutico acerca de todos los medicamentos que tome (sean estos recetados o de venta libre, productos naturales, vitaminas) y los trastornos que tenga. Debe verificar que sea seguro para usted tomar este

medicamento junto con todos sus otros medicamentos y trastornos. No empiece, detenga ni modifique la dosis de ningún medicamento sin consultar antes al médico.

### **¿Qué debo tener en cuenta al usar este medicamento?**

- Avise a todos sus proveedores de atención médica que toma este medicamento. Esto incluye a los médicos, enfermeras, farmacéuticos y dentistas.
- Este medicamento puede afectar ciertas pruebas de laboratorio. Avise a todos sus proveedores de atención médica y bioquímicos que toma este medicamento.
- Dígale a su médico si tiene heces de color negro con aspecto alquitranado o sanguinolentas, vómitos con sangre o vómito que parece granos de café.
- Si consume warfarina, consulte con su médico. Es posible que deban controlar sus análisis de sangre con mayor atención mientras se le administra este medicamento.
- Este medicamento evita la absorción de otros medicamentos. Si toma otros medicamentos, consulte al médico o al farmacéutico para saber si necesita tomarlos en un momento distinto al que toma este medicamento.
- Este medicamento ha provocado problemas hepáticos. La mayoría de las veces, los problemas hepáticos desaparecieron luego de suspender el medicamento. En muy pocas ocasiones, los problemas hepáticos provocaron la muerte. Si tiene preguntas, consulte al médico.

- Si tiene 65 años de edad o es mayor, use este medicamento con cuidado. Puede provocarle más efectos secundarios.
- Informe a su médico si está embarazada o tiene intención de embarazarse. Tendrá que hablar acerca de los riesgos y beneficios de utilizar este medicamento mientras esté embarazada.
- Informe a su médico si está amamantando a su bebé. Tendrá que hablar acerca de si hay riesgos para el bebé.

### **Razones por las que debe llamar a su médico de inmediato.**

**ADVERTENCIA/PRECAUCIÓN:** A pesar de que es muy poco frecuente, algunas personas pueden sufrir efectos secundarios muy graves, que causen incluso la muerte, al tomar un medicamento. Si presenta alguno de los siguientes signos o síntomas que puedan estar relacionados con un efecto secundario muy grave, infórmelo a su médico o busque asistencia médica de inmediato:

- Signos de reacción alérgica tales como sarpullido; urticaria; picazón; piel enrojecida, hinchada, con ampollas o descamada, con o sin fiebre; sibilancia; opresión en el pecho o la garganta; problemas para respirar, tragar o hablar; ronquera inusual; o hinchazón de la boca, el rostro, los labios, la lengua o la garganta.
- Síntomas de problemas en el hígado como orina oscura, cansancio, falta de apetito, malestar o dolor estomacal, heces de color claro, vómitos o piel o ojos amarillentos.

## **¿Qué otros efectos secundarios tiene este medicamento?**

Todos los medicamentos pueden tener efectos secundarios. Sin embargo, muchas personas no tienen ningún efecto secundario o tienen solamente efectos secundarios menores. Llame a su médico o busque asistencia médica si le molesta alguno de estos efectos secundarios o no desaparece:

### **Todas las presentaciones:**

- Dolor de cabeza.
- Náusea o vómito.
- Estreñimiento.
- Diarrea.
- Dolor abdominal.

### **Inyección:**

- Irritación en el lugar en que se aplicó el medicamento.

Estos no son todos los efectos secundarios que podrían ocurrir. Si tiene preguntas acerca de los efectos secundarios, llame al médico. Llame al médico para que lo aconseje acerca de los efectos secundarios.

Puede informar los efectos secundarios al organismo de salud de su país.

## **¿Cuál es la mejor forma de tomarlo?**

Tome este medicamento según las indicaciones de su médico.

Lea toda la información que se le brinde. Siga todas las instrucciones con atención.

### **Todos los productos orales:**

- Se puede administrar con o sin alimentos. Se debe administrar con alimentos si provoca malestar estomacal.
- Si toma este medicamento una vez al día, tómelo a la hora de acostarse.

### **Todos los productos líquidos:**

- Mida cuidadosamente las dosis del líquido. Utilice el medidor que viene con este medicamento. Si el medicamento no lo trae, pídale al farmacéutico un dispositivo para medir este medicamento.

### **Líquido (suspensión):**

- Agite bien antes de usar.

### **Inyección:**

- Este medicamento se administra por inyección intramuscular o intravenosa.

### **¿Qué hago si se me olvida tomar una dosis?**

### **Todos los productos orales:**

- Tome la dosis que se saltó lo antes posible.
- Si ya casi es hora de la dosis siguiente, sátese la dosis faltante y continúe con el horario habitual.

- No tome dos dosis al mismo tiempo ni tome dosis adicionales.

### **Inyección:**

- Llame al médico para obtener instrucciones.

### **¿Cómo debo conservar este medicamento?**

#### **Líquido (suspensión):**

- Conserve en el refrigerador. No congelar.
- Deseche la porción que no utilice luego de 8 semanas.

#### **Todos los demás productos orales:**

- Conserve a temperatura ambiente.
- Mantener en un lugar seco. No conservar en un baño.
- Proteja de la luz.

### **Inyección:**

- Si necesita almacenar este medicamento en casa, hable con su médico, enfermera o farmacéutico sobre cómo hacerlo.

#### **Todas las presentaciones:**

- Guarde los medicamentos en un lugar seguro. Mantenga todo medicamento fuera del alcance de los niños y las mascotas.
- Deseche los medicamentos sin usar o que hayan expirado. No los tire por el retrete ni los vierta al desagüe a menos que

así se lo indiquen. Consulte con el farmacéutico si tiene preguntas sobre la mejor manera de desechar medicamentos. Pueden existir programas de devolución de medicamentos en su área.

## **Afirmaciones generales**

- Si sus síntomas o trastornos no mejoran o si empeoran, llame al médico.
- No comparta su medicamento con otras personas ni tome el medicamento de ninguna otra persona.
- Lleve consigo una lista de todos los medicamentos que toma (recetados, productos naturales, suplementos, vitaminas, medicamentos que obtuvo sin receta). Entregue esta lista al médico.
- Hable con su médico antes de comenzar a tomar cualquier medicamento, ya sea uno recetado o sin receta, productos naturales o vitaminas.
- Algunos medicamentos pueden tener otro folleto informativo para el paciente. Si tiene alguna pregunta sobre este medicamento, hable con su médico, enfermera, farmacéutico u otro proveedor de atención médica.
- Si cree que ha habido una sobredosis, llame al centro de toxicología local o busque atención médica de inmediato. Prepárese para responder qué se ingirió, qué cantidad y cuándo.

## **Exención de responsabilidad y uso de la información**



## **del consumidor**

No se debe utilizar esta información para decidir si se debe tomar este medicamento o cualquier otro. Solamente el proveedor de atención médica tiene el conocimiento y la capacitación para decidir qué medicamentos son adecuados para un paciente específico. Esta información no recomienda ningún medicamento como seguro, eficaz o aprobado para tratar a ningún paciente o enfermedad. Es solamente un breve resumen de información general sobre este medicamento. NO incluye toda la información sobre los usos, las instrucciones, las advertencias, las precauciones, las interacciones, los efectos secundarios o los riesgos posibles que podrían aplicarse a este medicamento. Esta información no constituye asesoramiento médico específico y no reemplaza la información que usted recibe de su proveedor de atención médica. Debe hablar con el proveedor de atención médica para obtener información completa sobre los riesgos y los beneficios de tomar este medicamento.

## **Copyright**

© 2019 Wolters Kluwer Clinical Drug Information, Inc. y sus licenciados y/o afiliados. Todos los derechos reservados.

Si tiene preguntas, llame a un miembro de su equipo de atención médica directamente. Si es paciente de MSK puede comunicarse con un proveedor de cuidados de la salud después de las 5:00 PM, durante los fines de semana y los feriados, llame al 212-639-2000.

Para obtener más recursos, visite [www.mskcc.org/pe](http://www.mskcc.org/pe) y podrá hacer búsquedas en nuestra biblioteca virtual.

---

Ranitidine - Generated on July 20, 2019

©2019 Memorial Sloan Kettering Cancer Center