

Ravulizumab

Esta información de Lexicomp® le explica lo que debe saber sobre este medicamento, por ejemplo, para qué se usa, cómo tomarlo, sus efectos secundarios y cuándo llamar a su proveedor de cuidados de la salud.

Nombres comerciales: EE. UU.

Ultomiris

Nombres comerciales: Canadá

Ultomiris

Advertencia

- Se han presentado infecciones meningocócicas potencialmente mortales con la administración de este medicamento. Este tipo de infección puede tornarse potencialmente mortal muy rápido y puede ser mortal si no se trata a tiempo. Se deberá administrar a su hijo una vacuna contra el meningococo como mínimo 2 semanas antes de comenzar el tratamiento con este medicamento, a menos que el médico indique lo contrario. Si su hijo ha recibido una vacuna antimeningocócica anteriormente, es posible que deba recibir otra. Consulte con el médico si tiene alguna pregunta.
- Las vacunas antimeningocócicas disminuyen el riesgo de infecciones meningocócicas; puede que no eliminen el riesgo de contraer estas infecciones. Si tiene preguntas, consulte al médico.

¿Para qué se utiliza este medicamento?

- Se utiliza para tratar una enfermedad de la sangre y el riñón denominada síndrome hemolítico urémico atípico (SHUa).

- Si su hijo ha estado recibiendo este medicamento por alguna otra razón, consulte con su médico sobre los riesgos y beneficios. Consulte con su médico si tiene preguntas o dudas sobre el hecho de administrarle este medicamento a su hijo.

¿Qué necesito decirle al médico ANTES de que mi hijo tome este medicamento?

- Si su hijo es alérgico a este medicamento, a algún componente de este medicamento, o a otros medicamentos, alimentos o sustancias. Informe a su médico acerca de esta alergia y qué síntomas ha presentado su hijo.
- Si el niño no ha recibido una vacuna meningocócica.
- Si el niño tiene una infección meningocócica.

Si su hija está amamantando a un bebé:

- Asegúrese de que su hija no amamante a un bebé mientras tome este medicamento y durante 8 meses después de la última dosis.

Esta no es una lista de todos los medicamentos o trastornos que pueden interactuar con este medicamento.

Informe al médico y al farmacéutico todos los medicamentos que su hijo toma (sean estos recetados o de venta libre, productos naturales o vitaminas) y de los problemas de salud que padece. Debe verificar que sea seguro administrarle a su hijo este medicamento con todos sus otros medicamentos y problemas de salud. No empiece, interrumpa ni modifique la dosis de ningún medicamento que tome su hijo sin consultar antes con el médico.

¿Qué debo saber o hacer mientras mi hijo toma este medicamento?

- Avise a todos los proveedores de atención médica de su hijo que el niño toma este medicamento. Esto incluye a los médicos, enfermeras, farmacéuticos y dentistas del niño.

- Es posible que el niño tenga mayor riesgo de presentar infecciones. Haga que el niño se lave las manos con frecuencia. Evite las multitudes y a personas con infecciones, resfriados o gripe.
- La posibilidad de contraer gonorrea puede aumentar en algunas personas. Hable con el médico de su hijo para saber si él/ella posee un riesgo mayor de contraer gonorrea, cómo prevenirla y si es necesario que se realice una prueba.
- Asegúrese de que su hijo esté al día con todas las vacunas antes de comienzo del tratamiento con este medicamento.
- Tenga consigo la tarjeta de seguridad del paciente de su hijo en todo momento y durante 8 meses después de la suspensión del medicamento.
- Controle la función sanguínea según le indique el médico. Consulte al médico.
- Si el peso de su hijo cambia, consulte al médico. Es posible que deba cambiarse la dosis de este medicamento.
- Algunas personas experimentaron efectos secundarios durante la infusión. Informe al médico si tiene algún efecto secundario durante la infusión.
- Algunos problemas de salud pueden tener lugar después de suspender el uso de este medicamento. Se deberá observar de cerca a su hijo durante varias semanas o meses luego de suspender este medicamento. Acuda a evaluación médica. Llame al médico de inmediato si su hijo presenta un cambio en la cantidad de orina, orina oscura, hinchazón, calor o dolor en la pierna o brazo, dolor o presión en el pecho, tos con sangre, dificultad para respirar o tragar, hematomas o hemorragia sin causa aparente, convulsiones o dolor estomacal grave, mareos graves o desmayos. Llame al médico de inmediato si su hijo se siente confundido, muy cansado o débil, o si tiene debilidad en un lado del cuerpo, dificultad para hablar o pensar, cambios en el equilibrio, caída en un lado de la cara o cambios en la visión. Llame al médico de inmediato si su hijo no puede tener o mantener una erección.
- Si el paciente es un niño, use este medicamento con cuidado. El riesgo de ciertas infecciones graves puede aumentar en los niños.

Si su hijo es sexualmente activo o puede serlo:

- Es posible que su hija deba utilizar un método anticonceptivo mientras toma este medicamento y durante algo más de tiempo luego de su última dosis. Consulte con el médico para saber si su hija necesita usar un método anticonceptivo.

Si su hija está embarazada:

- Informe a su médico si su hija está embarazada o queda embarazada. Deberá hablar acerca de los riesgos y beneficios de que su hija utilice este medicamento durante el embarazo.

¿Cuáles son los efectos secundarios por los que debo llamar al médico de mi hijo de inmediato?

ADVERTENCIA/PRECAUCIÓN: a pesar de que es muy poco frecuente, algunas personas pueden sufrir efectos secundarios muy graves, y en ocasiones mortales, al tomar un medicamento. Si su hijo presenta alguno de los siguientes signos o síntomas que pueden estar relacionados con un efecto secundario muy grave, infórmelo al médico de su hijo o busque ayuda médica de inmediato:

- Signos de reacción alérgica tales como sarpullido; urticaria; picazón; piel enrojecida, hinchada, con ampollas o descamada, con o sin fiebre; sibilancia; opresión en el pecho o la garganta; problemas para respirar, tragar o hablar; ronquera inusual; o hinchazón de la boca, el rostro, los labios, la lengua o la garganta.
- Los signos de infección incluyen fiebre, escalofríos, dolor de garganta muy grave, dolor de oídos o senos paranasales, tos, aumento del esputo o cambio en el color del esputo, dolor para orinar, aftas o herida que no cicatriza.
- Los signos de una infección meningocócica como dolor de cabeza muy intenso con o sin malestar estomacal, vómitos, fiebre o rigidez del cuello o la espalda; confusión; fiebre alta; fiebre con sarpullido; sensación de molestia frente a la luz; o dolores musculares muy intensos o dolor con o sin síntomas de tipo gripal.
- Signos de presión arterial alta o baja como dolores de cabeza o mareos muy graves, desmayos o cambios en la visión.

- Síntomas de niveles bajos de potasio tales como dolor o debilidad en los músculos, calambres musculares o pulso que no se siente normal.
- Dolor de pecho.
- Falta de aire.
- Hinchazón en los brazos o las piernas.
- Dolor de espalda.
- Dolor e irritación en la zona en la que el medicamento entra al cuerpo.
- Glándula inflamada.

¿Qué otros efectos secundarios tiene este medicamento?

Todos los medicamentos pueden tener efectos secundarios. Sin embargo, muchas personas no padecen ningún efecto secundario o padecen solamente efectos secundarios menores. Llame al médico de su hijo o busque ayuda médica si al niño le molesta alguno de estos efectos secundarios o no desaparece:

- Signos de un resfrío común.
- Dolor de cabeza.
- Estreñimiento, diarrea, malestar o dolor estomacal, vómitos o falta de apetito.
- Dolor en los brazos o las piernas.
- Se siente mareado, cansado o débil.
- Dolor en los músculos o las articulaciones.
- Espasmo muscular.
- Ansiedad.
- Pérdida del pelo.
- Piel seca.

Estos no son todos los efectos secundarios que podrían ocurrir. Si tiene preguntas acerca de los efectos secundarios, llame al médico de su hijo. Llame al médico de su hijo para que le aconseje acerca de los efectos secundarios.

Puede informar los efectos secundarios al organismo de salud de su país.

¿Cómo se administra mejor este medicamento?

Administre este medicamento según las instrucciones del médico de su hijo. Lea toda la información que se le brinde. Siga todas las instrucciones con atención.

- Este medicamento se administra como una infusión en una vena por un periodo de tiempo.

¿Qué debo hacer si mi hijo no toma una dosis?

- Llame al médico de su hijo para obtener instrucciones.

¿Cómo almaceno o descarto este medicamento?

- Si debe almacenar este medicamento en su hogar, hable con el médico de su hijo, la enfermera o el farmacéutico sobre las condiciones de almacenamiento.

Datos generales sobre el medicamento

- Si los síntomas o trastornos de su hijo no mejoran o si empeoran, llame al médico de su hijo.
- No comparta el medicamento del niño con otras personas ni le de al niño el medicamento de ninguna otra persona.
- Guarde los medicamentos en un lugar seguro. Mantenga todo medicamento fuera del alcance de los niños y las mascotas.
- Deseche los medicamentos sin usar o que hayan expirado. No los tire por el retrete ni los vierta al desagüe a menos que así se lo indiquen. Consulte con el farmacéutico si tiene preguntas sobre la mejor manera de desechar medicamentos. Pueden existir programas de devolución de medicamentos en su área.
- Algunos medicamentos pueden tener otro folleto informativo para el paciente. Si tiene alguna pregunta sobre este medicamento, hable con el médico de su hijo, enfermera, farmacéutico u otro proveedor de atención médica.

- Si cree que ha habido una sobredosis, llame al centro de toxicología local o busque atención médica de inmediato. Prepárese para responder qué se ingirió, qué cantidad y cuándo.

Uso de la información por el consumidor y exención de responsabilidad

No se debe utilizar esta información para decidir si se debe tomar este medicamento o cualquier otro. Solamente el proveedor de atención médica tiene el conocimiento y la capacitación para decidir qué medicamentos son adecuados para un paciente específico. Esta información no recomienda ningún medicamento como seguro, eficaz o aprobado para tratar a ningún paciente o enfermedad. Es solamente un breve resumen de información general sobre este medicamento. NO incluye toda la información sobre los usos, las instrucciones, las advertencias, las precauciones, las interacciones, los efectos secundarios o los riesgos posibles que podrían aplicarse a este medicamento. Esta información no constituye asesoramiento médico específico y no reemplaza la información que usted recibe de su proveedor de atención médica. Debe hablar con el proveedor de atención médica para obtener información completa sobre los riesgos y los beneficios de tomar este medicamento. El uso de esta información se rige por el Acuerdo de licencia de usuario final de Lexicomp, disponible en <https://www.wolterskluwer.com/en/solutions/lexicomp/about/eula>.

Derechos de autor

© 2021 UpToDate, Inc. y sus licenciantes y/o afiliados. Todos los derechos reservados.

Si tienes preguntas, contacta a un integrante del equipo de atención médica directamente. Si eres paciente de MSK y necesitas comunicarte con un proveedor después de las 5:00 PM, durante el fin de semana o un día feriado, llama al 212-639-2000.

Para obtener más recursos, visita www.mskcc.org/pe y busca en nuestra biblioteca virtual.

Ravulizumab - Last updated on October 20, 2021

Todos los derechos son propiedad y se reservan a favor de Memorial Sloan Kettering Cancer Center



Memorial Sloan Kettering
Cancer Center