



EDUCACIÓN DE PACIENTES Y CUIDADORES

Rho(D) Immune Globulin

Esta información de Lexicomp® le explica lo que debe saber sobre este medicamento, por ejemplo, para qué se usa, cómo tomarlo, sus efectos secundarios y cuándo llamar a su proveedor de cuidados de la salud.

Marcas estadounidenses

HyperRHO S/D; MICRhoGAM Ultra-Filtered Plus; RhoGAM Ultra-Filtered Plus; Rhophylac; WinRho SDF

Marcas canadienses

Hyperrho S/D Full Dose; HypRho-D; WinRho SDF

Advertencia

Inyección (si se aplica en la vena):

- Los pacientes con trombocitopenia inmune (PTI) pueden tener una reacción muy grave, y a veces mortal, a los glóbulos rojos. Consulte con el médico si su hijo tiene orina oscura, dolor de espalda, fiebre, escalofríos o temblores.
- También se han informado problemas renales muy graves, anemia y otros problemas de la sangre. Hable con su médico.
- Su médico controlará cuidadosamente al niño.

¿Para qué se usa este medicamento?

- Este medicamento se utiliza para tratar la púrpura trombocitopénica inmune (ITP).
- Este medicamento se utiliza para tratar la enfermedad hemolítica por Rh.
- Se le puede recetar este medicamento al niño por otras razones. Consulte al médico.

¿Qué debo informar al médico ANTES de que mi hijo/hija tome este medicamento?

- Si su hijo tiene alergia a este medicamento o a alguno de sus componentes.
- Si su hijo es alérgico a algún medicamento como este o a otros medicamentos, alimentos o sustancias. Informe al médico acerca de la alergia y qué síntomas presentó su hijo, tales como sarpullido; urticaria; picazón; falta de aire; sibilancias; tos; inflamación de la cara, los labios, la lengua o la garganta o cualquier otro síntoma.
- Si su hijo presenta algunos de los siguientes problemas de salud: anemia, otros problemas de hemorragia o de la sangre o si se le ha extirpado el bazo a su hijo.
- si el niño tiene deficiencia de IgA.
- Si a su hijo/a le administraron una vacuna viva recientemente.
- Si su hijo/a es recién nacido/a. Algunas marcas comerciales de este medicamento no deben utilizarse en recién nacidos.

Esta no es una lista de todos los medicamentos o trastornos que pueden interactuar con este medicamento.

Informe al médico y al farmacéutico todos los medicamentos que su hijo toma (sean estos recetados o de venta libre, productos naturales o vitaminas) y de los problemas de salud que padece. Debe verificar que sea seguro para su hijo tomar este medicamento con todos sus otros medicamentos y problemas de salud. No empiece, interrumpa ni modifique la dosis de ningún medicamento que tome su hijo sin consultar antes con el médico.

¿Hay algo que deba saber o hacer mientras mi hijo/hija toma este medicamento?

- Avise a todos los proveedores de atención médica de su hijo que el niño toma este medicamento. Esto incluye a los médicos, enfermeras, farmacéuticos y dentistas del niño.
- El niño debe evitar las tareas o las acciones que requieren un estado de alerta o una visión clara hasta que usted observe cómo este medicamento afecta a su hijo. Estas son actividades como andar en bicicleta, practicar deportes o usar elementos como tijeras, podadoras de césped, motocicletas eléctricas, automóviles de juguete o vehículos motorizados.
- Controle la función sanguínea según le indique el médico. Consulte al médico.
- Este medicamento puede afectar ciertas pruebas de

laboratorio. Avise a todos los proveedores de atención médica y bioquímicos de su hijo que su hijo toma este medicamento.

- Si el niño tiene un nivel elevado de azúcar en la sangre (diabetes), consulte al médico sobre las mejores pruebas de glucosa a aplicar.
- La posibilidad de producir coágulos de sangre puede aumentar con la administración de este medicamento. La posibilidad puede ser mayor en las personas mayores, si su hijo debe permanecer en la cama o en una silla durante mucho tiempo, si toma estrógeno o si tiene determinados catéteres. Algunos problemas médicos como la sangre viscosa, los problemas cardíacos o los antecedentes de coágulos de sangre aumentan la posibilidad de producir coágulos de sangre. Se pueden producir coágulos de sangre aun si su hijo no presenta ninguno de estos problemas médicos. Llame al médico de inmediato si su hijo siente entumecimiento o debilidad de 1 lado del cuerpo; dolor, enrojecimiento, sensibilidad, calor o hinchazón en los brazos o las piernas; cambio de color de un brazo o una pierna; dolor o presión en el pecho; falta de aire; pulso acelerado o tos con sangre. Consulte al médico de su hijo.
- Este medicamento ha provocado problemas renales con la inmunoglobulina humana. En algunos casos, estos problemas han sido mortales. Los problemas renales son más comunes en las personas que utilizan productos que tienen sacarosa. La mayoría de los productos con inmunoglobulina no

contienen sacarosa. La posibilidad puede ser mayor si el niño tiene problemas renales, niveles de azúcar en sangre elevados (diabetes), pérdida de líquidos (deshidratación) o un volumen bajo de sangre, una infección en la sangre o proteínas en la sangre que no son normales. La posibilidad puede ser mayor si el niño toma otros medicamentos que puedan dañar los riñones. Consulte con el médico de su hijo si tiene preguntas sobre esta información o sobre si su producto tiene sacarosa.

- Deberá estar seguro de que su hijo no esté deshidratado antes de administrarse este medicamento. Consulte con el médico para averiguar si necesita asegurarse de que su hijo beba más líquido antes de administrarle este medicamento.
- Este medicamento está hecho de plasma humano (una parte de la sangre) y puede contener virus que provoquen enfermedades. Este medicamento se evalúa, prueba y trata para reducir las probabilidades de que transmita una infección. Consulte al médico.
- El niño no debe recibir ninguna vacuna por tres meses después del tratamiento con globulina inmune sin antes hablar con un proveedor de salud médica.

Si su hija está embarazada o amamantando a un bebé:

- Consulte al médico si su hija está embarazada, queda embarazada o está amamantando a un bebé. Tendrá que hablar acerca de los riesgos y beneficios para su hija y el bebé.

¿Cuáles son los efectos secundarios por los que debo llamar al médico de mi hijo/hija de inmediato?

ADVERTENCIA/PRECAUCIÓN: a pesar de que es muy poco frecuente, algunas personas pueden sufrir efectos secundarios muy graves, y en ocasiones mortales, al tomar un medicamento. Si su hijo presenta alguno de los siguientes signos o síntomas que pueden estar relacionados con un efecto secundario muy grave, infórmelo al médico de su hijo o busque ayuda médica de inmediato:

- Signos de reacción alérgica tales como sarpullido; urticaria; picazón; piel enrojecida, hinchada, con ampollas o descamada, con o sin fiebre; sibilancia; opresión en el pecho o la garganta; problemas para respirar, tragar o hablar; ronquera inusual; o hinchazón de la boca, el rostro, los labios, la lengua o la garganta.
- Signos de presión arterial alta o baja como dolores de cabeza o mareos muy graves, desmayos o cambios en la visión.
- Signos de problemas renales como la incapacidad de orinar, cambios en la cantidad de orina, sangre en la orina o un aumento de peso importante.
- Dolor de espalda.
- Dolor abdominal.
- Orina oscura o piel/ojos amarillentos.
- Náusea o vómito.
- Falta de aire, mucho aumento peso, inflamación en los

brazos o piernas.

- Se siente muy cansado o débil.
- Fiebre o escalofríos.
- Piel pálida.
- Hematoma o hemorragia sin motivo aparente.
- Escalofríos.
- Espasmo muscular.

¿Qué otros efectos secundarios tiene este medicamento?

Todos los medicamentos pueden tener efectos secundarios. Sin embargo, muchas personas no padecen ningún efecto secundario o padecen solamente efectos secundarios menores. Llame al médico de su hijo o busque ayuda médica si al niño le molesta alguno de estos efectos secundarios o no desaparece:

- Dolor de cabeza.
- Mareos.
- Somnolencia.
- Se siente cansado o débil.
- Dolor en la zona de la inyección.
- Irritación o inflamación en la zona en la que se aplicó la inyección.
- Diarrea.
- Dolor en los músculos o las articulaciones.

Estos no son todos los efectos secundarios que podrían ocurrir. Si tiene preguntas acerca de los efectos secundarios, llame al médico de su hijo. Llame al médico de su hijo para que le aconseje acerca de los efectos secundarios.

Puede informar los efectos secundarios al organismo de salud de su país.

¿Cuál es la mejor forma de tomarlo?

Administre este medicamento según las instrucciones del médico de su hijo. Lea toda la información que se le brinde. Siga todas las instrucciones con atención.

- Este medicamento se administra por inyección.

¿Qué hago si mi hijo/hija olvida tomar una dosis?

- Llame al médico de su hijo para obtener instrucciones.

¿Cómo debo guardar y/o desechar este medicamento?

- Si debe almacenar este medicamento en su hogar, hable con el médico de su hijo, la enfermera o el farmacéutico sobre las condiciones de almacenamiento.

Afirmaciones generales

- Si los síntomas o trastornos de su hijo no mejoran o si empeoran, llame al médico de su hijo.
- No comparta el medicamento del niño con otras personas ni le de al niño el medicamento de ninguna otra persona.
- Lleve consigo una lista de todos los medicamentos de su hijo

(recetados o de venta libre, productos naturales, vitaminas).
Entregue esta lista al médico del niño.

- Hable con el médico de su hijo antes de administrarle cualquier medicamento nuevo, ya sea uno recetado o de venta libre, productos naturales o vitaminas.
- Guarde los medicamentos en un lugar seguro. Mantenga todo medicamento fuera del alcance de los niños y las mascotas.
- Deseche los medicamentos sin usar o que hayan expirado. No los tire por el retrete ni los vierta al desagüe a menos que así se lo indiquen. Consulte con el farmacéutico si tiene preguntas sobre la mejor manera de desechar medicamentos. Pueden existir programas de devolución de medicamentos en su área.
- Algunos medicamentos pueden tener otro folleto informativo para el paciente. Si tiene alguna pregunta sobre este medicamento, hable con el médico de su hijo, enfermera, farmacéutico u otro proveedor de atención médica.
- Si cree que ha habido una sobredosis, llame al centro de toxicología local o busque atención médica de inmediato. Prepárese para responder qué se ingirió, qué cantidad y cuándo.

Exención de responsabilidad y uso de la información del consumidor

No se debe utilizar esta información para decidir si se debe

tomar este medicamento o cualquier otro. Solamente el proveedor de atención médica tiene el conocimiento y la capacitación para decidir qué medicamentos son adecuados para un paciente específico. Esta información no recomienda ningún medicamento como seguro, eficaz o aprobado para tratar a ningún paciente o enfermedad. Es solamente un breve resumen de información general sobre este medicamento. NO incluye toda la información sobre los usos, las instrucciones, las advertencias, las precauciones, las interacciones, los efectos secundarios o los riesgos posibles que podrían aplicarse a este medicamento. Esta información no constituye asesoramiento médico específico y no reemplaza la información que usted recibe de su proveedor de atención médica. Debe hablar con el proveedor de atención médica para obtener información completa sobre los riesgos y los beneficios de tomar este medicamento.

Copyright

© 2019 Wolters Kluwer Clinical Drug Information, Inc. y sus licenciados y/o afiliados. Todos los derechos reservados.

Si tiene preguntas, llame a un miembro de su equipo de atención médica directamente. Si es paciente de MSK puede comunicarse con un proveedor de cuidados de la salud después de las 5:00 PM, durante los fines de semana y los feriados, llame al 212-639-2000.

Para obtener más recursos, visite www.mskcc.org/pe y podrá hacer búsquedas en nuestra biblioteca virtual.

Rho(D) Immune Globulin - Last updated on October 21, 2019
©2019 Memorial Sloan Kettering Cancer Center