



## EDUCACIÓN DE PACIENTES Y CUIDADORES

# Ribavirin (Systemic)

Esta información de Lexicomp® le explica lo que debe saber sobre este medicamento, por ejemplo, para qué se usa, cómo tomarlo, sus efectos secundarios y cuándo llamar a su proveedor de cuidados de la salud.

## Marcas estadounidenses

Copegus [DSC]; Moderiba 1200 Dose Pack [DSC]; Moderiba 800 Dose Pack [DSC]; Moderiba [DSC]; Rebetol; Ribasphere; Ribasphere RibaPak; RibaTab [DSC]

## Marcas canadienses

Ibavyr

## Advertencia

- El niño no debe tomar únicamente este medicamento para tratar una infección de hepatitis C.
- Este medicamento puede causar un problema en la sangre muy grave llamado anemia hemolítica. Esto puede hacer que la enfermedad cardíaca empeore y cause ataques cardíacos muy graves y, a veces, mortales. Informe al médico si alguna vez ha tenido problemas cardíacos. No tome este medicamento si alguna vez tuvo una enfermedad cardíaca muy grave o problemas cardíacos que no están tratados. Llame al médico de inmediato si tiene dolor de pecho mientras toma este medicamento.

## Si su hija está embarazada:

- No le administre este medicamento a su hija si está embarazada. El uso durante el embarazo puede causar defectos de nacimiento o la pérdida del feto. Si su hija queda embarazada o planea hacerlo mientras toma este medicamento, llame al médico de inmediato.

## **Si su hijo es sexualmente activo o puede serlo:**

- Se requiere de cuidado especial para asegurar que su hija o la pareja de su hijo no queden embarazadas. Se necesitan dos métodos anticonceptivos durante el tratamiento y durante 6 meses después de su última dosis.
- No administre este medicamento a su hijo si su pareja está embarazada. Consulte al médico.
- Llame al médico de inmediato si su hija o la pareja de su hijo queda embarazada mientras toma este medicamento o dentro de 6 meses luego de interrumpirlo.

## **¿Para qué se usa este medicamento?**

- Este medicamento se utiliza para tratar la hepatitis C.

## **¿Qué debo informar al médico ANTES de que mi hijo/hija tome este medicamento?**

- Si su hijo tiene alergia a este medicamento o a alguno de sus componentes.
- Si su hijo es alérgico a algún medicamento como este o a otros medicamentos, alimentos o sustancias. Informe al médico acerca de la alergia y qué síntomas presentó su hijo, tales como sarpullido; urticaria; picazón; falta de aire; sibilancias; tos; inflamación de la cara, los labios, la lengua o la garganta o cualquier otro síntoma.
- Si su hijo presenta alguno de los siguientes problemas de salud: Hepatitis autoinmune, otros problemas hepáticos aparte de la hepatitis C, problemas renales, anemia falciforme o talasemia mayor.
- Si su hijo alguna vez tuvo insuficiencia cardiaca muy grave o que no están controlados.
- Si su hija está en edad fértil pero no utiliza 2 métodos anticonceptivos o si su hija planea quedar embarazada durante el tratamiento o dentro de los 6 meses después de su última dosis.
- Si su hijo toma didanosina.

## **Si su hija está amamantando a un bebé:**

- Consulte al médico si su hija amamanta o planea hacerlo.

Esta no es una lista de todos los medicamentos o trastornos que pueden interactuar con este medicamento.

Informe al médico y al farmacéutico todos los medicamentos que su hijo toma (sean estos recetados o de venta libre, productos naturales o vitaminas) y de los problemas de salud que padece. Debe verificar que sea seguro para su hijo tomar este medicamento con todos sus otros medicamentos y problemas de salud. No empiece, interrumpa ni modifique la dosis de ningún medicamento que tome su hijo sin consultar antes con el médico.

## **¿Hay algo que deba saber o hacer mientras mi hijo/hija toma este medicamento?**

- Avise a todos los proveedores de atención médica de su hijo que el niño toma este medicamento. Esto incluye a los médicos, enfermeras, farmacéuticos y dentistas del niño.
- El niño debe evitar las tareas o las acciones que requieren un estado de alerta hasta que usted observe cómo este medicamento afecta a su hijo. Estas son actividades como andar en bicicleta, practicar deportes o usar elementos como tijeras, podadoras de césped, motocicletas eléctricas, automóviles de juguete o vehículos motorizados.
- Controle la función sanguínea según le indique el médico. Consulte al médico.
- Es posible que su hijo necesite un electrocardiograma (ECG) mientras toma este medicamento. Consulte al médico.
- Haga que el niño se someta a un examen de la vista según las indicaciones del médico.
- Controle la función pulmonar de su hijo según le haya indicado el médico. Consulte con el médico.
- Si el niño tiene diabetes, consulte al médico. Este medicamento puede aumentar el contenido de azúcar en la sangre.
- Si el niño recibió el trasplante de un órgano, consulte al médico.
- Este medicamento no detiene la propagación de enfermedades como el VIH

o la hepatitis que se contagian a través de la sangre. Asegúrese de que las agujas y otros objetos, como cepillos de dientes y afeitadoras, no se compartan. Hable con el médico.

- Esté atento a la aparición de ataques de gota.
- El alcohol puede interactuar con este medicamento. Asegúrese de que su hijo no beba alcohol.
- Cuide la dentadura del niño. Visite regularmente al dentista.
- Es posible que el niño tenga mayor riesgo de presentar infecciones. Haga que el niño se lave las manos con frecuencia. Evite las multitudes y a personas con infecciones, resfriados o gripe.
- Este medicamento puede afectar el crecimiento de niños y adolescentes en algunos casos. Es posible que necesiten controles de crecimiento periódicos. Consulte al médico.
- Si le administra este medicamento a su hijo, es posible que deba modificar la dosis a medida que el peso de su hijo cambia. Controle el peso de su hijo con frecuencia. Consulte al médico antes de cambiarle la dosis a su hijo.
- Si su hija es una mujer en edad fértil, debe hacerse una prueba de embarazo cada mes mientras toma este medicamento y durante 6 meses después de su última dosis.

### **Si su hijo es sexualmente activo o puede serlo:**

- Este medicamento no detiene la propagación de enfermedades como el VIH o la hepatitis que se contagian a través de las relaciones sexuales. Asegúrese de que su hijo no tenga ningún tipo de relación sexual sin usar un condón de látex o poliuretano. Hable con el médico.
- Si su hijo es varón y tiene una pareja que puede quedar embarazada, tendrá que hacerse una prueba de embarazo cada mes durante el tratamiento y durante 6 meses después de su última dosis.
- Llame al médico de inmediato si su hija tiene relaciones sexuales sin usar 2 tipos de métodos anticonceptivos y usted piensa que puede estar embarazada, o si no ha tenido menstruación.

### **¿Cuáles son los efectos secundarios por los que debo**

## llamar al médico de mi hijo/hija de inmediato?

**ADVERTENCIA/PRECAUCIÓN:** a pesar de que es muy poco frecuente, algunas personas pueden sufrir efectos secundarios muy graves, y en ocasiones mortales, al tomar un medicamento. Si su hijo presenta alguno de los siguientes signos o síntomas que pueden estar relacionados con un efecto secundario muy grave, infórmelo al médico de su hijo o busque ayuda médica de inmediato:

- Signos de reacción alérgica tales como sarpullido; urticaria; picazón; piel enrojecida, hinchada, con ampollas o descamada, con o sin fiebre; sibilancia; opresión en el pecho o la garganta; problemas para respirar, tragar o hablar; ronquera inusual; o hinchazón de la boca, el rostro, los labios, la lengua o la garganta.
- Síntomas de un problema en el páncreas (pancreatitis) como dolor estomacal muy fuerte, dolor de espalda muy fuerte o malestar estomacal muy grave o vómitos.
- Cambio en la vista.
- Pérdida de la visión.
- Piel pálida.
- Confusión.
- Algunas personas que tomaron este medicamento presentaron problemas pulmonares muy graves, y a veces mortales. Llame al médico de inmediato si su hijo tiene problemas pulmonares o respiratorios como problemas para respirar, falta de aire, o si tiene tos reciente o que empeoró.
- Medicamentos como este elevan la posibilidad de tener ideas o acciones suicidas en niños y adultos menores. El riesgo puede ser mayor en las personas que han tenido estas ideas o realizado estas acciones en el pasado. Todas las personas que reciban este medicamento deben recibir vigilancia cuidadosa. Llame al médico de inmediato si sufre signos como depresión, nerviosismo, agitación, mal humor, ataques de pánico, cambios de humor, o acciones que son nuevas o empeoran. Llame al médico de inmediato si tiene algún pensamiento o realiza alguna acción suicida.
- Puede producirse una reacción cutánea grave (síndrome de Stevens-Johnson/necrólisis epidérmica tóxica). Puede ocasionar problemas de salud graves que no desaparecen y, en ocasiones, la muerte. Obtenga ayuda

médica de inmediato si su hijo presenta signos como enrojecimiento, inflamación, ampollas o descamación en la piel (con o sin fiebre); enrojecimiento o irritación en los ojos; o heridas en la boca, la garganta, la nariz o los ojos.

- La capacidad de la médula de producir las células sanguíneas puede disminuir. Esto puede provocar problemas de hemorragia o infecciones muy graves. Informe al médico de inmediato si su hijo presenta signos de infección como fiebre, escalofríos o dolor de garganta; hematomas o hemorragias; sensación de mucho cansancio o debilidad.

## **¿Qué otros efectos secundarios tiene este medicamento?**

Todos los medicamentos pueden tener efectos secundarios. Sin embargo, muchas personas no padecen ningún efecto secundario o padecen solamente efectos secundarios menores. Llame al médico de su hijo o busque ayuda médica si al niño le molesta alguno de estos efectos secundarios o no desaparece:

- Síntomas similares a los de la gripe.
- Dolor de cabeza.
- Incapacidad para dormir.
- Náusea o vómito.
- Diarrea.
- No tiene apetito.
- Dolor abdominal.
- Pérdida del pelo.
- Se siente cansado o débil.
- Dolor en los músculos o las articulaciones.
- Mareos.
- Piel seca.
- Boca seca.

Estos no son todos los efectos secundarios que podrían ocurrir. Si tiene

preguntas acerca de los efectos secundarios, llame al médico de su hijo. Llame al médico de su hijo para que le aconseje acerca de los efectos secundarios.

Puede informar los efectos secundarios al organismo de salud de su país.

## ¿Cuál es la mejor forma de tomarlo?

Administre este medicamento según las instrucciones del médico de su hijo. Lea toda la información que se le brinde. Siga todas las instrucciones con atención.

- Administre este medicamento con alimentos.
- Anime al niño a que beba mucho líquido sin cafeína todos los días, a menos que el médico le indique lo contrario.
- Siga administrando este medicamento a su hijo según se lo indique el médico u otro proveedor de atención médica, aun si el niño se siente bien.
- Es importante que el niño no olvide u omita una dosis de este medicamento durante el tratamiento.
- No permita que su hijo lo use durante más tiempo que el indicado por su médico.
- Este medicamento puede utilizarse en combinación con interferón o peginterferón. En caso de que su hijo este utilizando alguno de estos medicamentos, lea el prospecto que viene adjunto.

### **Tableta:**

- Si el niño tiene problemas al tragar, hable con un un proveedor de salud médica.

### **Cápsula:**

- El niño debe tragarla entera. Anime al niño a no masticar, romper o triturarla.

### **Solución oral:**

- Mida cuidadosamente las dosis del líquido. Utilice el medidor que viene con este medicamento. Si el medicamento no lo trae, pídale al farmacéutico un dispositivo para medir este medicamento.

## ¿Qué hago si mi hijo/hija olvida tomar una dosis?

- Administre la dosis que olvidó lo antes posible.
- Si ya casi es hora de la dosis siguiente, sáltese la dosis faltante y continúe con el horario habitual del niño.
- No tome dos dosis al mismo tiempo ni tome dosis adicionales.
- Si no está seguro qué hacer si omite darle una dosis al niño, llame al médico.

## ¿Cómo debo guardar y/o desechar este medicamento?

### Tabletas y cápsulas:

- Conserve a temperatura ambiente.

### Solución oral:

- Conserve el líquido (solución) a temperatura ambiente o en el refrigerador. No congelar.

### Todos los productos orales:

- Mantener en un lugar seco. No conservar en un baño.
- Mantenga la tapa cerrada herméticamente.
- Guarde los medicamentos en un lugar seguro. Mantenga todo medicamento fuera del alcance de los niños y las mascotas.
- Deseche los medicamentos sin usar o que hayan expirado. No los tire por el retrete ni los vierta al desagüe a menos que así se lo indiquen. Consulte con el farmacéutico si tiene preguntas sobre la mejor manera de desechar medicamentos. Pueden existir programas de devolución de medicamentos en su área.

## Afirmaciones generales

- Si los síntomas o trastornos de su hijo no mejoran o si empeoran, llame al médico de su hijo.
- No comparta el medicamento del niño con otras personas ni le de al niño el medicamento de ninguna otra persona.



- Lleve consigo una lista de todos los medicamentos de su hijo (recetados o de venta libre, productos naturales, vitaminas). Entregue esta lista al médico del niño.
- Hable con el médico de su hijo antes de administrarle cualquier medicamento nuevo, ya sea uno recetado o de venta libre, productos naturales o vitaminas.
- Algunos medicamentos pueden tener otro folleto informativo para el paciente. Si tiene alguna pregunta sobre este medicamento, hable con el médico de su hijo, enfermera, farmacéutico u otro proveedor de atención médica.
- Si cree que ha habido una sobredosis, llame al centro de toxicología local o busque atención médica de inmediato. Prepárese para responder qué se ingirió, qué cantidad y cuándo.

## **Exención de responsabilidad y uso de la información del consumidor**

No se debe utilizar esta información para decidir si se debe tomar este medicamento o cualquier otro. Solamente el proveedor de atención médica tiene el conocimiento y la capacitación para decidir qué medicamentos son adecuados para un paciente específico. Esta información no recomienda ningún medicamento como seguro, eficaz o aprobado para tratar a ningún paciente o enfermedad. Es solamente un breve resumen de información general sobre este medicamento. NO incluye toda la información sobre los usos, las instrucciones, las advertencias, las precauciones, las interacciones, los efectos secundarios o los riesgos posibles que podrían aplicarse a este medicamento. Esta información no constituye asesoramiento médico específico y no reemplaza la información que usted recibe de su proveedor de atención médica. Debe hablar con el proveedor de atención médica para obtener información completa sobre los riesgos y los beneficios de tomar este medicamento.

## **Copyright**

© 2019 Wolters Kluwer Clinical Drug Information, Inc. y sus licenciantes y/o afiliados. Todos los derechos reservados.

Si tiene preguntas, llame a un miembro de su equipo de atención médica directamente. Si es paciente de MSK puede comunicarse con un proveedor de cuidados de la salud después de las 5:00 PM, durante los fines de semana y los feriados, llame al 212-639-2000.

Para obtener más recursos, visite [www.mskcc.org/pe](http://www.mskcc.org/pe) y podrá hacer búsquedas en nuestra biblioteca virtual.

---

Ribavirin (Systemic) - Generated on July 20, 2019

©2019 Memorial Sloan Kettering Cancer Center