



EDUCACIÓN DE PACIENTES Y CUIDADORES

Salicylic Acid

Esta información de Lexicomp® le explica lo que debe saber sobre este medicamento, por ejemplo, para qué se usa, cómo tomarlo, sus efectos secundarios y cuándo llamar a su proveedor de cuidados de la salud.

Marcas estadounidenses

Bensal HP; Betasal [OTC]; Clear Away 1-Step Wart Remover [OTC]; Corn Remover One Step [OTC]; Corn Remover Ultra Thin [OTC] [DSC]; Exuviance Blemish Treatment [OTC] [DSC]; Gordofilm; Ionil [OTC]; Keralyt; Keralyt 5 [OTC] [DSC]; Keralyt Scalp; Keralyt [OTC]; Mediplast [OTC]; Neutrogena Oil-Free Acne Wash [OTC]; One Step Callus Remover [OTC] [DSC]; P & S [OTC]; Psoriasisin [OTC]; Sal-Plant [OTC]; SalAc [OTC]; Salactic Film [OTC]; Salacyn [DSC]; Salex; Salicylic Acid Wart Remover; Salimez; Salimez Forte; Salisol Forte [DSC]; Salisol [DSC]; Salitech Forte [DSC]; Salitech [DSC]; Salvax; Scalpicin 2 in 1 [OTC] [DSC]; Sebasorb [OTC] [DSC]; Stri-Dex Maximum Strength [OTC]; Stri-Dex Sensitive Skin [OTC]; Stridex Essential [OTC]; UltraSal-ER; Virasal; Xalix

Marcas canadienses

Duofilm; Duoforte 27; Occlusal-HP; Sebcur; Soluver; Soluver Plus; Trans-Plantar; Trans-Ver-Sal

¿Para qué se usa este medicamento?

- Este medicamento se utiliza para tratar el acné.
- Este medicamento se utiliza para eliminar callos, callos en los dedos y verrugas.
- Este medicamento se utiliza para tratar la psoriasis.
- Este medicamento se utiliza para controlar la dermatitis seborreica.
- Se le puede recetar este medicamento por otras razones. Consulte con su médico.

¿Qué debo informar al médico ANTES de que mi hijo/hija tome este medicamento?

Para todos los usos de este medicamento:

- Si su hijo tiene alergia a este medicamento o a alguno de sus componentes.
- Si su hijo es alérgico a algún medicamento como este o a otros medicamentos, alimentos o sustancias. Informe al médico acerca de la alergia y qué síntomas presentó su hijo, tales como sarpullido; urticaria; picazón; falta de aire; sibilancias; tos; inflamación de la cara, los labios, la lengua o la garganta o cualquier otro síntoma.

Para callosidades, callos o verrugas:

- Si su hijo tiene alguno de los siguientes problemas de salud: hiperglucemia (diabetes) o mala circulación.

Esta no es una lista de todos los medicamentos o trastornos que pueden interactuar con este medicamento.

Informe al médico y al farmacéutico todos los medicamentos que su hijo toma (sean estos recetados o de venta libre, productos naturales o vitaminas) y de los problemas de salud que padece. Debe verificar que sea seguro para su hijo tomar este medicamento con todos sus otros medicamentos y problemas de salud. No empiece, interrumpa ni modifique la dosis de ningún medicamento que tome su hijo sin consultar antes con el médico.

¿Hay algo que deba saber o hacer mientras mi hijo/hija toma este medicamento?

- Avise a todos los proveedores de atención médica de su hijo que el niño toma este medicamento. Esto incluye a los médicos, enfermeras, farmacéuticos y dentistas del niño.
- Tenga cuidado con la piel si el área afectada es muy extensa. Hable con el médico.
- No utilice este medicamento sobre manchas de nacimiento, lunares o verrugas con crecimiento capilar; ni en verrugas cervicales, genitales u orales.
- No aplique sobre heridas abiertas, cortes o piel irritada.
- Si el niño utiliza este medicamento con demasiada frecuencia, el problema de la piel podría empeorar.
- El uso de otros productos cutáneos mientras tome este medicamento puede aumentar la irritación.

- Hable con el médico del niño antes de usar otro medicamento o producto sobre la piel de su hijo.
- Este medicamento puede afectar ciertas pruebas de laboratorio. Asegúrese de que el médico y los bioquímicos sepan que su hijo toma este medicamento.
- Algunos de estos medicamentos pueden prenderse fuego. No lo utilice cerca de una llama abierta o mientras fuma.
- Este medicamento puede causar daño si se traga. Si traga este medicamento, llame a un médico o un centro de toxicología de inmediato.
- No debe administrarse a niños ni adolescentes que padezcan o se están recuperando de síntomas de gripe, varicela u otras infecciones virales debido al riesgo de padecer síndrome de Reye. El síndrome de Reye causa graves daños cerebrales y hepáticos.
- Ciertos productos contra el acné que contienen peróxido de benzoílo o ácido salicílico muy pocas veces provocan irritación muy grave o reacciones alérgicas graves y que a veces ponen en riesgo la vida. Antes del primero uso, debe tomar ciertas medidas para asegurarse de que el niño no sufrirá una reacción alérgica. Aplique este medicamento según las instrucciones del médico o lea el prospecto del envase. Consulte al médico.
- Úselo con precaución en los niños. Hable con el médico.
- Es posible que se utilicen diferentes marcas de este medicamento para niños de diferentes edades. Consulte al

médico antes de administrar este medicamento a un niño.

Si su hija está embarazada o amamantando a un bebé:

- Consulte al médico si su hija está embarazada, queda embarazada o está amamantando a un bebé. Tendrá que hablar acerca de los riesgos y beneficios para su hija y el bebé.

¿Cuáles son los efectos secundarios por los que debo llamar al médico de mi hijo/hija de inmediato?

ADVERTENCIA/PRECAUCIÓN: a pesar de que es muy poco frecuente, algunas personas pueden sufrir efectos secundarios muy graves, y en ocasiones mortales, al tomar un medicamento. Si su hijo presenta alguno de los siguientes signos o síntomas que pueden estar relacionados con un efecto secundario muy grave, infórmelo al médico de su hijo o busque ayuda médica de inmediato:

- Signos de reacción alérgica tales como sarpullido; urticaria; picazón; piel enrojecida, hinchada, con ampollas o descamada, con o sin fiebre; sibilancia; opresión en el pecho o la garganta; problemas para respirar, tragar o hablar; ronquera inusual; o hinchazón de la boca, el rostro, los labios, la lengua o la garganta.
- Cambios de humor.
- Respiración acelerada.
- Náusea o vómito.

- Zumbido en los oídos, pérdida de la audición o cualquier otro cambio en la audición.
- Mareos.
- Se siente muy cansado o débil.
- Diarrea.

¿Qué otros efectos secundarios tiene este medicamento?

Todos los medicamentos pueden tener efectos secundarios. Sin embargo, muchas personas no padecen ningún efecto secundario o padecen solamente efectos secundarios menores. Llame al médico de su hijo o busque ayuda médica si al niño le molesta alguno de estos efectos secundarios o no desaparece:

- Irritación cutánea.
- Piel seca.
- Ardor.
- Dolor punzante.
- Descamación:

Estos no son todos los efectos secundarios que podrían ocurrir. Si tiene preguntas acerca de los efectos secundarios, llame al médico de su hijo. Llame al médico de su hijo para que le aconseje acerca de los efectos secundarios.

Puede informar los efectos secundarios al organismo de salud de su país.

¿Cuál es la mejor forma de tomarlo?

Administre este medicamento según las instrucciones del médico de su hijo. Lea toda la información que se le brinde. Siga todas las instrucciones con atención.

Para todos los usos de este medicamento:

- No administre por la boca. Solo para uso cutáneo. No acerque a la boca, la nariz ni los ojos (puede quemar) del niño.
- Asegúrese de que su hijo no inhale los vapores.
- Si este medicamento entra en sus ojos, enjuague con agua fría.
- Lávese las manos antes y después de usar.
- Limpie la zona afectada antes de usar. Asegúrese de secarla bien.

Espuma:

- Ceba la bomba antes del primer uso.
- Algunos de estos medicamentos deben agitarse antes de utilizarse. Asegúrese de saber si es necesario agitar este producto antes de usarlo.
- Aplique sobre la zona afectada y frote suavemente.

Para acné:

Crema, gel, líquido o loción:

- Aplique una capa fina sobre la zona afectada, frote hasta que haga espuma y enjuague.
- Algunos de estos medicamentos deben agitarse antes de utilizarse. Asegúrese de saber si es necesario agitar este producto antes de usarlo.

Almohadilla:

- Utilice una almohadilla para aplicar una capa fina de ácido salicílico al área afectada.
- No deje el apósito en la piel.

Para callosidades, callos o verrugas:

- Puede dejar el área afectada en remojo por 5 minutos.
- Es posible que deba cubrirlo con un vendaje en caso de que así lo indique el médico.

Gel y líquido:

- Aplique sobre la zona afectada y deje secar.

Crema, loción:

- Aplique una capa fina en la piel afectada y frote suavemente.

Para psoriasis o dermatitis seborreica:

Crema, gel, líquido, loción y ungüento:

- Aplique una capa fina en la piel afectada y frote suavemente.

- Si el producto se debe usar en el cuero cabelludo, siga las instrucciones de uso como se le indicó o como las leyó en el prospecto del envase.

Champú:

- A veces este medicamento se coloca en el cabello mojado. A veces es necesario ponerlo sobre el cabello seco. Asegúrese de saber cómo utilizar este medicamento. Consulte con el médico o farmacéutico si no está seguro.
- Repita el tratamiento según le indicó su médico.

Champú con kit de gel:

- Para usar el champú como tratamiento para el cuero cabelludo, **no** moje el pelo. Colóquelo en las áreas afectadas con un aplicador. Déjeselo puesto de acuerdo con las instrucciones. Enjuague bien con agua. Si lo desea, puede lavar nuevamente el cabello con un champú no medicinal.
- Para usar gel sobre el cuero cabelludo, colóquelo en las áreas afectadas con un aplicador. Déjeselo puesto de acuerdo con las instrucciones. Enjuague con un champú medicinal o con agua tibia.
- Para usar gel sobre la piel, úselo al acostarse. Remoje el área durante al menos 5 minutos antes de usar este medicamento. Coloque una capa delgada y frote suavemente. Cubra con un apósito según las instrucciones. Enjuague por la mañana.

¿Qué hago si mi hijo/hija olvida tomar una dosis?

- Aplique la dosis que olvidó lo antes posible.
- Si ya casi es hora de la dosis siguiente, sátese la dosis faltante y continúe con el horario habitual del niño.
- No administre 2 dosis al mismo tiempo ni tome dosis adicionales.

¿Cómo debo guardar y/o desechar este medicamento?

Todas las presentaciones:

- Conserve a temperatura ambiente. No congelar.
- Proteja del calor o del fuego.
- Mantenga la tapa cerrada herméticamente.
- Guarde los medicamentos en un lugar seguro. Mantenga todo medicamento fuera del alcance de los niños y las mascotas.
- Deseche los medicamentos sin usar o que hayan expirado. No los tire por el retrete ni los vierta al desagüe a menos que así se lo indiquen. Consulte con el farmacéutico si tiene preguntas sobre la mejor manera de desechar medicamentos. Pueden existir programas de devolución de medicamentos en su área.

Espuma:

- Guarde en posición vertical con la tapa puesta.
- No perforo.

Afirmaciones generales

- Si los síntomas o trastornos de su hijo no mejoran o si empeoran, llame al médico de su hijo.
- No comparta el medicamento del niño con otras personas ni le de al niño el medicamento de ninguna otra persona.
- Lleve consigo una lista de todos los medicamentos de su hijo (recetados o de venta libre, productos naturales, vitaminas). Entregue esta lista al médico del niño.
- Hable con el médico de su hijo antes de administrarle cualquier medicamento nuevo, ya sea uno recetado o de venta libre, productos naturales o vitaminas.
- Algunos medicamentos pueden tener otro folleto informativo para el paciente. Si tiene alguna pregunta sobre este medicamento, hable con el médico de su hijo, enfermera, farmacéutico u otro proveedor de atención médica.
- Si cree que ha habido una sobredosis, llame al centro de toxicología local o busque atención médica de inmediato. Prepárese para responder qué se ingirió, qué cantidad y cuándo.

Exención de responsabilidad y uso de la información del consumidor

No se debe utilizar esta información para decidir si se debe tomar este medicamento o cualquier otro. Solamente el proveedor de atención médica tiene el conocimiento y la capacitación para decidir qué medicamentos son adecuados

para un paciente específico. Esta información no recomienda ningún medicamento como seguro, eficaz o aprobado para tratar a ningún paciente o enfermedad. Es solamente un breve resumen de información general sobre este medicamento. NO incluye toda la información sobre los usos, las instrucciones, las advertencias, las precauciones, las interacciones, los efectos secundarios o los riesgos posibles que podrían aplicarse a este medicamento. Esta información no constituye asesoramiento médico específico y no reemplaza la información que usted recibe de su proveedor de atención médica. Debe hablar con el proveedor de atención médica para obtener información completa sobre los riesgos y los beneficios de tomar este medicamento.

Copyright

© 2019 Wolters Kluwer Clinical Drug Information, Inc. y sus licenciantes y/o afiliados. Todos los derechos reservados.

Si tiene preguntas, llame a un miembro de su equipo de atención médica directamente. Si es paciente de MSK puede comunicarse con un proveedor de cuidados de la salud después de las 5:00 PM, durante los fines de semana y los feriados, llame al 212-639-2000.

Para obtener más recursos, visite www.mskcc.org/pe y podrá hacer búsquedas en nuestra biblioteca virtual.

Salicylic Acid - Generated on July 21, 2019

©2019 Memorial Sloan Kettering Cancer Center