



## EDUCACIÓN DE PACIENTES Y CUIDADORES

# Selegiline

Esta información de Lexicomp® le explica lo que debe saber sobre este medicamento, por ejemplo, para qué se usa, cómo tomarlo, sus efectos secundarios y cuándo llamar a su proveedor de cuidados de la salud.

## Marcas estadounidenses

Eldepryl; Emsam; Zelapar

## Marcas canadienses

Apo-Selegiline; Dom-Selegiline; Mylan-Selegiline; PMS-Selegiline; Teva-Selegiline

## Advertencia

### Parche cutáneo:

- Los niños y adolescentes que toman este medicamento pueden correr un mayor riesgo de tener ideas o acciones suicidas. Los adultos también podrían correr ese riesgo. El riesgo puede ser mayor en las personas que han tenido estas ideas o acciones en el pasado. Vigile atentamente a las personas que toman este medicamento. Llame al médico de inmediato si hay signos de depresión, nerviosismo, agitación, mal humor, ataques de pánico o cambios de humor o acciones que son nuevas o empeoran. Llame al médico de inmediato si tiene alguna idea o acción de suicidio.
- No administre este medicamento a niños menores de 12 años. Los niños menores de 12 años pueden tener un mayor riesgo de sufrir presión arterial alta muy grave y que, en ocasiones, puede poner en riesgo la vida.

## ¿Para qué se usa este medicamento?

- Este medicamento se utiliza para tratar la depresión.
- Se le puede recetar este medicamento al niño por otras razones. Consulte al

médico.

## ¿Qué debo informar al médico ANTES de que mi hijo/hija tome este medicamento?

### Todas las presentaciones:

- Si su hijo tiene alergia a este medicamento o a alguno de sus componentes.
- Si su hijo es alérgico a algún medicamento como este o a otros medicamentos, alimentos o sustancias. Informe al médico acerca de la alergia y qué síntomas presentó su hijo, tales como sarpullido; urticaria; picazón; falta de aire; sibilancias; tos; inflamación de la cara, los labios, la lengua o la garganta o cualquier otro síntoma.
- si el niño tiene feocromocitoma.
- Si su hijo está tomando otro medicamento que tiene el mismo fármaco en su composición.
- Si su hijo toma medicamentos (recetado o de venta libre, productos naturales, vitaminas) que no deben tomarse junto con este, como ciertos medicamentos que se utilizan para tratar los problemas del estado de ánimo (depresión) u otros problemas relacionados, dolor, convulsiones, pérdida de peso y resfríos comunes. Hay muchos medicamentos que no deben combinarse con este.

### Tableta de disolución oral:

- Si su hijo tiene alguno de estos problemas de salud: enfermedad renal o hepática.

*Esta no es una lista de todos los medicamentos o trastornos que pueden interactuar con este medicamento.*

*Informe al médico y al farmacéutico todos los medicamentos que su hijo toma (sean estos recetados o de venta libre, productos naturales o vitaminas) y de los problemas de salud que padece. Debe verificar que sea seguro para su hijo tomar este medicamento con todos sus otros medicamentos y problemas de salud. No empiece, interrumpa ni modifique la dosis de ningún medicamento que tome su hijo sin consultar antes con el médico.*

# ¿Hay algo que deba saber o hacer mientras mi hijo/hija toma este medicamento?

## Todas las presentaciones:

- Avise a todos los proveedores de atención médica de su hijo que el niño toma este medicamento. Esto incluye a los médicos, enfermeras, farmacéuticos y dentistas del niño.
- Pida que le controlen la presión sanguínea y el pulso con regularidad al niño. Hable con el médico del niño.
- El niño debe evitar las tareas o las acciones que requieren un estado de alerta hasta que usted observe cómo este medicamento afecta a su hijo. Estas son actividades como andar en bicicleta, practicar deportes o usar elementos como tijeras, podadoras de césped, motocicletas eléctricas, automóviles de juguete o vehículos motorizados.
- Para reducir la probabilidad de sentirse mareado o perder la conciencia, procure que su hijo se levante lentamente después de unos pocos minutos cuando se siente o se recueste. Los niños deben tener mayor cuidado al subir las escaleras.
- No deje de administrar este medicamento a su hijo de forma repentina sin consultar al médico. Su hijo puede tener un mayor riesgo de padecer efectos secundarios. Si su hijo debe dejar de tomar este medicamento, debe hacerlo paulatinamente, según lo indique el médico.
- Cuando se administran dosis más altas de este medicamento, algunos alimentos y bebidas como el queso y el vino tinto pueden provocar efectos muy graves y, en ocasiones, mortales como presión arterial alta repentina. Consulte al médico sobre el riesgo del niño de tener estos efectos. Obtenga una lista de los alimentos que debe evitar darle al niño.
- Algunos tipos de este medicamento se utilizan para tratar la enfermedad de Parkinson. Puede aumentar la posibilidad de un tipo de cáncer de piel denominado melanoma en personas con enfermedad de Parkinson. Se desconoce si este medicamento también puede aumentar esa posibilidad. Es posible que el niño requiera que se le realicen exámenes de piel mientras que toma este medicamento. Consulte con el médico.
- El alcohol puede interactuar con este medicamento. Asegúrese de que su

hijo no beba alcohol.

- Algunas personas que toman la forma oral de este medicamento se han quedado dormidas durante la realización de actividades como conducir, comer o caminar. Algunas personas no sentían somnolencia y se sentían alertas antes de quedarse dormidas. Esto ha sucedido hasta 1 año después de que se comenzó a tomar este medicamento. Si el niño se queda dormido cuando realiza actividades, asegúrese de que el niño evite realizar actividades o tareas que requieran un estado de alerta mientras toma este medicamento. Llame al médico de inmediato si le sucede esto o si el niño siente mucho sueño.
- Este medicamento puede provocar un problema de salud muy grave y a veces mortal llamado síndrome de serotonina si el niño lo toma junto con antidepresivos, medicamentos para la migraña o con algunos medicamentos en particular. Llame al médico de inmediato si el niño tiene agitación, modificación del equilibrio, confusión, alucinaciones, fiebre, latidos anormales o rápidos, acaloramiento, contracciones musculares o entumecimiento, convulsiones, escalofríos o temblores, sudoración excesiva, diarrea grave, malestar estomacal o vómitos o dolor de cabeza muy intenso.

### **Si su hija está embarazada o amamantando a un bebé:**

- Consulte al médico si su hija está embarazada, queda embarazada o está amamantando a un bebé. Tendrá que hablar acerca de los beneficios y los riesgos de utilizar este medicamento.

### **Tableta de disolución oral:**

- Si el niño tiene fenilcetonuria (PKU), consulte al médico. Algunos productos contienen fenilalanina.

### **Parche cutáneo:**

- Dígale al niño que evite usar fuentes de calor (como las lámparas solares, camas solares, almohadillas y mantas calentadoras, lámparas calentadoras, saunas, tinas de agua caliente y camas de agua con calentador). Evite los baños prolongados y tomar sol. Es posible que la temperatura del niño se eleve y produzca un exceso en la liberación del medicamento al organismo.

## ¿Cuáles son los efectos secundarios por los que debo llamar al médico de mi hijo/hija de inmediato?

**ADVERTENCIA/PRECAUCIÓN:** a pesar de que es muy poco frecuente, algunas personas pueden sufrir efectos secundarios muy graves, y en ocasiones mortales, al tomar un medicamento. Si su hijo presenta alguno de los siguientes signos o síntomas que pueden estar relacionados con un efecto secundario muy grave, infórmelo al médico de su hijo o busque ayuda médica de inmediato:

### Todas las presentaciones:

- Síntomas de una reacción alérgica tales como sarpullido; urticaria; comezón; piel inflamada, con ampollas o descamada con o sin fiebre; silbido en el pecho; opresión en el pecho o la garganta; problemas para respirar o hablar; ronquera inusual; o hinchazón de la boca, el rostro, los labios, la lengua o la garganta.
- Problemas para controlar los movimientos corporales, contracciones musculares, cambios en el equilibrio, problemas para tragar o hablar.
- Temblor, dificultad para movilizarse, entumecimiento.
- Confusión.
- Cambios de humor.
- Cambios en la manera de actuar.
- Alucinaciones (ver o escuchar cosas que no están allí).
- Necesidad urgente de hacer algo que no puede controlar (comer, apostar, tener sexo o gastar dinero).
- Crecimiento o bulto en la piel.
- Cambios de color o tamaño del lunar.
- Dolor o presión en el pecho.
- Dolor muscular o debilidad.
- Rigidez del cuello.
- Mareos severos o desmayos.
- Severo dolor de cabeza.

## **Tableta de disolución oral:**

- Lesiones en la boca.
- Dolor severo al tragar.

## **Parche cutáneo:**

- Irritación severa en la piel.

## **¿Qué otros efectos secundarios tiene este medicamento?**

*Todos los medicamentos pueden tener efectos secundarios. Sin embargo, muchas personas no padecen ningún efecto secundario o padecen solamente efectos secundarios menores. Llame al médico de su hijo o busque ayuda médica si al niño le molesta alguno de estos efectos secundarios o no desaparece:*

## **Todas las presentaciones:**

- Mareos.
- Somnolencia.
- Dolor de cabeza.
- Náusea o vómito.
- Incapacidad para dormir.
- Boca seca.
- Diarrea o materia fecal blanda.
- Dolor de espalda.
- Goteo nasal.
- Nariz tapada.

## **Tableta de disolución oral:**

- Irritación en la boca.

## **Parche cutáneo:**

- Irritación cutánea.

*Estos no son todos los efectos secundarios que podrían ocurrir. Si tiene preguntas acerca de los efectos secundarios, llame al médico de su hijo. Llame al médico de su hijo para que le aconseje acerca de los efectos secundarios.*

*Puede informar los efectos secundarios al organismo de salud de su país.*

## **¿Cuál es la mejor forma de tomarlo?**

*Administre este medicamento según las instrucciones del médico de su hijo. Lea toda la información que se le brinde. Siga todas las instrucciones con atención.*

### **Todas las presentaciones:**

- Siga administrando este medicamento a su hijo según se lo indique el médico u otro proveedor de atención médica, aun si el niño se siente bien.

### **Tabletas y cápsulas:**

- Administre este medicamento con alimentos.

### **Tableta de disolución oral:**

- Administre el medicamento antes del desayuno.
- No retire la tableta del blister hasta que esté listo para administrarle el medicamento a su hijo. Administre la tableta de inmediato después de abrir el blister. No guarde la tableta para uso futuro.
- Al abrirla, no empuje la tableta fuera de la envoltura de aluminio. Use las manos secas para sacarla de la envoltura de aluminio. Colóquela en la lengua del niño y déjela disolver. No se necesita agua. No deje que el niño la trague entera. No deje que el niño la mastique, parta ni triture.
- No permita que su hijo coma ni beba durante al menos 5 minutos antes o después de tomar este medicamento.

### **Parche cutáneo:**

- Lávese las manos antes y después de usar.
- Aplique el parche sobre la piel limpia, seca y sana en la zona superior de la espalda del niño. En los niños mayores también se puede usar el pecho, o bien la parte superior de la pierna o del brazo.

- No utilice parches que estén dañados o cortados.
- Coloque el parche en una área nueva cada vez que lo cambie.
- No aplique más de un parche a la vez.
- Si el parche se desprende, reemplácelo por uno nuevo y colóquelo en una zona distinta.
- Al quitar un parche cutáneo, asegúrese de doblar los bordes adhesivos y pegarlos entre sí.

## **¿Qué hago si mi hijo/hija olvida tomar una dosis?**

- Administre la dosis que olvidó lo antes posible.
- Si ya casi es hora de la dosis siguiente, sáltese la dosis faltante y continúe con el horario habitual del niño.
- No administre 2 dosis simultáneamente ni administre dosis adicionales.

## **¿Cómo debo guardar y/o desechar este medicamento?**

### **Todas las presentaciones:**

- Conserve a temperatura ambiente.
- Mantener en un lugar seco. No conservar en un baño.
- Guarde los medicamentos en un lugar seguro. Mantenga todo medicamento fuera del alcance de los niños y las mascotas.
- Pregunte al farmacéutico cómo se deben desechar los medicamentos no utilizados.

### **Tableta de disolución oral:**

- Utilice la pastillas orales desintegrantes en los 3 meses después de abrir la bolsa.

### **Parche cutáneo:**

- Guarde en la bolsa protectora hasta que se vaya a usar.

## **Afirmaciones generales**



- Si los síntomas o trastornos de su hijo no mejoran o si empeoran, llame al médico de su hijo.
- No comparta el medicamento del niño con otras personas ni le de al niño el medicamento de ninguna otra persona.
- Lleve consigo una lista de todos los medicamentos de su hijo (recetados o de venta libre, productos naturales, vitaminas). Entregue esta lista al médico del niño.
- Hable con el médico de su hijo antes de administrarle cualquier medicamento nuevo, ya sea uno recetado o de venta libre, productos naturales o vitaminas.
- Algunos medicamentos pueden tener otro folleto informativo para el paciente. Si tiene alguna pregunta sobre este medicamento, hable con el médico de su hijo, enfermera, farmacéutico u otro proveedor de atención médica.
- Si cree que ha habido una sobredosis, llame al centro de toxicología local o busque atención médica de inmediato. Prepárese para responder qué se ingirió, qué cantidad y cuándo.

## **Exención de responsabilidad y uso de la información del consumidor**

*No se debe utilizar esta información para decidir si se debe tomar este medicamento o cualquier otro. Solamente el proveedor de atención médica tiene el conocimiento y la capacitación para decidir qué medicamentos son adecuados para un paciente específico. Esta información no recomienda ningún medicamento como seguro, eficaz o aprobado para tratar a ningún paciente o enfermedad. Es solamente un breve resumen de información general sobre este medicamento. NO incluye toda la información sobre los usos, las instrucciones, las advertencias, las precauciones, las interacciones, los efectos secundarios o los riesgos posibles que podrían aplicarse a este medicamento. Esta información no constituye asesoramiento médico específico y no reemplaza la información que usted recibe de su proveedor de atención médica. Debe hablar con el proveedor de atención médica para obtener información completa sobre los riesgos y los beneficios de tomar este medicamento.*

## **Copyright**

© 2017 Wolters Kluwer Clinical Drug Information, Inc. y sus licenciantes y/o

*afiliados. Todos los derechos reservados.*

Si tiene preguntas, llame a un miembro de su equipo de atención médica directamente. Si es paciente de MSK puede comunicarse con un proveedor de cuidados de la salud después de las 5:00 PM, durante los fines de semana y los feriados, llame al 212-639-2000.

Para obtener más recursos, visite [www.mskcc.org/pe](http://www.mskcc.org/pe) y podrá hacer búsquedas en nuestra biblioteca virtual.

---

Selegiline - Last updated on December 31, 1969

©2019 Memorial Sloan Kettering Cancer Center