

EDUCACIÓN PARA PACIENTES Y CUIDADORES

Sodium Picosulfate, Magnesium Oxide, and Citric Acid

Esta información de Lexicomp® le explica lo que debe saber sobre este medicamento, por ejemplo, para qué se usa, cómo tomarlo, sus efectos secundarios y cuándo llamar a su proveedor de cuidados de la salud.

Marcas estadounidenses

Clenpiq; Prepopik [DSC]

Marcas canadienses

Oral Purgative; Pico-Salax; Picodan; Picoflo; Purg-Odan

¿Para qué se usa este medicamento?

- Este medicamento se utiliza para limpiar el tubo digestivo.

¿Qué debo informar al médico ANTES de que mi hijo/hija tome este medicamento?

- Si su hijo es alérgico a este medicamento, a algún componente de este medicamento, o a otros medicamentos, alimentos o sustancias. Informe a su médico acerca de esta alergia y qué síntomas ha presentado su hijo.

- Si su hijo tiene cualquiera de los siguientes problemas de salud: obstrucción del intestino, deshidratación, problemas de electrolitos (como sodio, potasio, fosfato), hinchazón del colon, orificio en el tracto gastrointestinal (GI) o tracto gastrointestinal (GI) de tránsito lento.
- Si el niño tiene enfermedad renal.
- Si el niño toma otros laxantes.

Esta no es una lista de todos los medicamentos o trastornos que pueden interactuar con este medicamento.

Informe al médico y al farmacéutico todos los medicamentos que su hijo toma (sean estos recetados o de venta libre, productos naturales o vitaminas) y de los problemas de salud que padece. Debe verificar que sea seguro administrarle a su hijo este medicamento con todos sus otros medicamentos y problemas de salud. No empiece, interrumpa ni modifique la dosis de ningún medicamento que tome su hijo sin consultar antes con el médico.

¿Hay algo que deba saber o hacer mientras mi hijo/hija toma este medicamento?

- Avise a todos los proveedores de atención médica de su hijo que el niño toma este medicamento. Esto incluye a los médicos, enfermeras, farmacéuticos y dentistas del niño.
- No debe administrarse otros laxantes ni ablandadores de heces , a menos que así se lo indique el médico del niño.

- El alcohol puede interactuar con este medicamento. Asegúrese de que su hijo no beba alcohol.

Si su hija está embarazada o amamantando a un bebé:

- Consulte al médico si su hija está embarazada, queda embarazada o está amamantando a un bebé. Tendrá que hablar acerca de los riesgos y beneficios para su hija y el bebé.

¿Cuáles son los efectos secundarios por los que debo llamar al médico de mi hijo/hija de inmediato?

ADVERTENCIA/PRECAUCIÓN: a pesar de que es muy poco frecuente, algunas personas pueden sufrir efectos secundarios muy graves, y en ocasiones mortales, al tomar un medicamento. Si su hijo presenta alguno de los siguientes signos o síntomas que pueden estar relacionados con un efecto secundario muy grave, infórmelo al médico de su hijo o busque ayuda médica de inmediato:

- Signos de reacción alérgica tales como sarpullido; urticaria; picazón; piel enrojecida, hinchada, con ampollas o descamada, con o sin fiebre; sibilancia; opresión en el pecho o la garganta; problemas para respirar, tragar o hablar; ronquera inusual; o hinchazón de la boca, el rostro, los labios, la lengua o la garganta.
- Dolor de estómago.
- Hinchazón de estómago.

- Hinchazón del vientre.
- Cólicos abdominales.
- Vomitar sangre o vómito que parece granos de café.
- Materia fecal oscura, negra o con sangre.
- Sangramiento del recto o dolor en el recto.
- Dificultad para tragar.
- Es posible que este medicamento le produzca deshidratación o problemas de electrolitos a su hijo. En raras ocasiones, esto puede ser severo o mortal. Informe al médico de su hijo de inmediato si su hijo se marea, se desmaya, siente cansancio o debilidad o no puede orinar. Informe al médico de su hijo de inmediato si su hijo tiene una frecuencia cardíaca acelerada o anormal, convulsiones, dolor de cabeza, cambios de humor, confusión, dolor o debilidad muscular, tiene más sed, no tiene apetito, tiene la boca o los ojos secos, sufre de malestar estomacal intenso o vómitos o experimenta cambios en la cantidad de orina producida.

¿Qué otros efectos secundarios tiene este medicamento?

Todos los medicamentos pueden tener efectos secundarios. Sin embargo, muchas personas no padecen ningún efecto secundario o padecen solamente efectos secundarios menores. Llame al médico de su hijo o busque ayuda médica si al niño le molesta alguno de estos efectos secundarios o no desaparece:

- Náusea o vómito.
- Dolor de cabeza.

Estos no son todos los efectos secundarios que podrían ocurrir. Si tiene preguntas acerca de los efectos secundarios, llame al médico de su hijo. Llame al médico de su hijo para que le aconseje acerca de los efectos secundarios.

Puede informar los efectos secundarios al organismo de salud de su país.

¿Cuál es la mejor forma de tomarlo?

Administre este medicamento según las instrucciones del médico de su hijo. Lea toda la información que se le brinde. Siga todas las instrucciones con atención.

Todas las presentaciones:

- Administre este medicamento según le indique su médico. Siga cuidadosamente todas las instrucciones recibidas. Esto incluye cuándo administrar el medicamento, los alimentos y bebidas que su hijo/a debe evitar antes del examen, y cuándo su hijo/a debe comenzar el ayuno líquido y sólido antes del examen. Consulte con su médico si tiene preguntas.
- No permita que su hijo ingiera alimentos sólidos ni tome leche mientras esté tomando este medicamento.
- Asegúrese de que su hijo beba mucha cantidad de líquidos

después de cada dosis de este medicamento, a menos que el médico de su hijo le indique beber menos líquido.

- Asegúrese de que su hijo beba líquidos claros antes, durante y luego de tomar este medicamento. No permita que su hijo beba líquidos que sean de color púrpura o rojo.
- Asegúrese que su hijo deja de beber líquidos al menos 2 horas antes del examen, a menos que el médico de su hijo le indique lo contrario.
- Si su hijo tiene dolor de estómago grave, inflamación o hinchazón después de la primera dosis, no le administre la segunda dosis hasta que estos síntomas desaparezcan. Consulte con el médico de su hijo si tiene preguntas.
- No administre otros medicamentos por vía oral durante la hora anterior a cada dosis de este medicamento. Es posible que algunos medicamentos deban aplazarse por más tiempo después de este medicamento. Consulte con el médico sobre cómo administrarle a su hijo otros medicamentos junto con este.

Polvo para solución:

- Mezcle con agua como se le indicó antes de administrar este medicamento. Asegúrese de que su hijo/a no trague el polvo seco.
- Luego de mezclar, administre la dosis a su hijo de inmediato.

No almacene para usar posteriormente.

- No agregue hielo a la solución mezclada.

Líquido (solución):

- Este medicamento está listo para beberse. No es necesario diluir este medicamento antes de proporcionarlo.
- La solución es transparente y es posible que vea algunas partículas en ella. Esto es normal.

¿Qué hago si mi hijo/hija olvida tomar una dosis?

- Llame al médico de su hijo para obtener instrucciones.
- Llame al médico si su hijo no puede terminar este medicamento antes del examen.

¿Cómo debo guardar y/o desechar este medicamento?

Polvo para solución:

- Conserve a temperatura ambiente.
- Después de mezclar, no refrigere.

Líquido (solución):

- Conserve a temperatura ambiente. No refrigerar ni congelar.

Todas las presentaciones:

- Mantener en un lugar seco. No conservar en un baño.

- Guarde los medicamentos en un lugar seguro. Mantenga todo medicamento fuera del alcance de los niños y las mascotas.
- Deseche los medicamentos sin usar o que hayan expirado. No los tire por el retrete ni los vierta al desagüe a menos que así se lo indiquen. Consulte con el farmacéutico si tiene preguntas sobre la mejor manera de desechar medicamentos. Pueden existir programas de devolución de medicamentos en su área.

Afirmaciones generales

- Si los síntomas o trastornos de su hijo no mejoran o si empeoran, llame al médico de su hijo.
- No comparta el medicamento del niño con otras personas ni le de al niño el medicamento de ninguna otra persona.
- Algunos medicamentos pueden tener otro folleto informativo para el paciente. Si tiene alguna pregunta sobre este medicamento, hable con el médico de su hijo, enfermera, farmacéutico u otro proveedor de atención médica.
- Si cree que ha habido una sobredosis, llame al centro de toxicología local o busque atención médica de inmediato. Prepárese para responder qué se ingirió, qué cantidad y cuándo.

Exención de responsabilidad y uso de la información del consumidor

No se debe utilizar esta información para decidir si se debe

tomar este medicamento o cualquier otro. Solamente el proveedor de atención médica tiene el conocimiento y la capacitación para decidir qué medicamentos son adecuados para un paciente específico. Esta información no recomienda ningún medicamento como seguro, eficaz o aprobado para tratar a ningún paciente o enfermedad. Es solamente un breve resumen de información general sobre este medicamento. NO incluye toda la información sobre los usos, las instrucciones, las advertencias, las precauciones, las interacciones, los efectos secundarios o los riesgos posibles que podrían aplicarse a este medicamento. Esta información no constituye asesoramiento médico específico y no reemplaza la información que usted recibe de su proveedor de atención médica. Debe hablar con el proveedor de atención médica para obtener información completa sobre los riesgos y los beneficios de tomar este medicamento.

Copyright

© 2020 UpToDate, Inc. y sus licenciantes y/o afiliados. Todos los derechos reservados.

Si tiene preguntas, contacte a un integrante del equipo de atención médica directamente. Si es paciente de MSK y necesita comunicarse con un proveedor después de las 5:00 PM, durante el fin de semana o un día feriado, llame al 212-639-2000.

Para obtener más recursos, visite www.mskcc.org/pe y busque en nuestra biblioteca virtual.

Sodium Picosulfate, Magnesium Oxide, and Citric Acid - Last updated on January 12, 2021

Todos los derechos son propiedad y se reservan a favor de Memorial Sloan Kettering Cancer Center