



EDUCACIÓN PARA PACIENTES Y CUIDADORES

Somapacitan

Esta información de Lexicomp® le explica lo que debe saber sobre este medicamento, por ejemplo, para qué se usa, cómo tomarlo, sus efectos secundarios y cuándo llamar a su proveedor de cuidados de la salud.

¿Para qué se utiliza este medicamento?

- Se usa para tratar la insuficiencia de la hormona del crecimiento.

¿Qué necesito decirle a mi médico ANTES de tomar este medicamento?

- Si es alérgico a este medicamento, a algún componente de este medicamento, o a otros medicamentos, alimentos o sustancias. Informe a su médico acerca de esta alergia y qué síntomas ha presentado.
- Si tiene enfermedad hepática.
- Si tiene cualquiera de los siguientes problemas de salud: problemas para respirar como apnea del sueño; cáncer u otros tumores como un tumor cerebral; enfermedad diabética del ojo; o enfermedad poco después de cirugía a corazón abierto, cirugía de estómago o lesión accidental.

Esta no es una lista de todos los medicamentos o trastornos que pueden interactuar con este medicamento.

Informe a su médico y farmacéutico acerca de todos los medicamentos que tome (sean estos recetados o de venta libre, productos naturales, vitaminas) y los trastornos que tenga. Debe verificar que sea seguro para usted tomar este medicamento junto con todos sus otros medicamentos y trastornos. No empiece, detenga ni modifique la dosis de ningún medicamento sin consultar antes al médico.

¿Qué debo saber o hacer mientras tomo este medicamento?

- Avise a todos sus proveedores de atención médica que toma este medicamento. Esto incluye a los médicos, enfermeras, farmacéuticos y dentistas.
- Controle la función sanguínea según le indique el médico. Consulte al médico.
- Realícese un examen de la vista según las indicaciones de su médico.
- Se han presentado casos de niveles altos de azúcar en la sangre con este medicamento. Esto incluye diabetes nueva o que empeora.
- Vigile el azúcar de su sangre según las indicaciones del médico.
- No comparta este medicamento con otra persona. Esto incluye agujas y jeringas, incluso si se cambió la aguja. Es posible

contagiar infecciones de una persona a otra al compartir estos dispositivos. Esto incluye infecciones que usted podría desconocer.

- Si tiene cáncer o un tumor, o alguna vez ha tenido cáncer o un tumor, consulte al médico. La probabilidad de tener cáncer o un crecimiento de tumores aumenta con la administración de este medicamento. La probabilidad de tener nuevos tumores también puede aumentar en algunos pacientes.
- Si tiene niveles bajos de hormonas tiroideas, consulte con el médico. Es posible que este medicamento no sea tan eficaz en las personas que tienen niveles bajos de hormonas tiroideas. Llame al médico de inmediato si tiene signos de niveles bajos de hormonas tiroideas, como estreñimiento; incapacidad para regular la baja temperatura corporal; problemas de memoria; cambios de estado de ánimo; o una sensación de ardor, adormecimiento u hormigueo que no es normal.
- Si tiene 65 años o más, use este medicamento con cuidado. Puede provocarle más efectos secundarios.
- Informe a su médico si está embarazada, tiene intención de embarazarse o está amamantando. Tendrá que hablar acerca de los riesgos y beneficios para usted y el bebé.

¿Cuáles son los efectos secundarios por los que debo llamar a mi médico de inmediato?

ADVERTENCIA/PRECAUCIÓN: A pesar de que es muy poco frecuente, algunas personas pueden sufrir efectos secundarios muy

graves, que causen incluso la muerte, al tomar un medicamento. Si presenta alguno de los siguientes signos o síntomas que puedan estar relacionados con un efecto secundario muy grave, infórmelo a su médico o busque asistencia médica de inmediato:

- Signos de reacción alérgica tales como sarpullido; urticaria; picazón; piel enrojecida, hinchada, con ampollas o descamada, con o sin fiebre; sibilancia; opresión en el pecho o la garganta; problemas para respirar, tragar o hablar; ronquera inusual; o hinchazón de la boca, el rostro, los labios, la lengua o la garganta.
- Síntomas de azúcar alta en la sangre tales como confusión, somnolencia, más sed, más hambre, orinar más seguido, acaloramiento, respiración acelerada o aliento con olor a fruta.
- Síntomas de un problema en el páncreas (pancreatitis) como dolor estomacal muy fuerte, dolor de espalda muy fuerte o malestar estomacal muy grave o vómitos.
- Síntomas de una glándula suprarrenal débil como náuseas o vómitos muy fuertes, mareos fuertes o desmayos, debilidad muscular, sensación de cansancio, cambios de humor, falta de apetito o pérdida de peso.
- Signos de alta presión como dolores de cabeza o mareos muy graves, desmayos o cambios en la visión.
- Mareos o desmayos.
- Latidos cardíacos anormales o acelerados.
- Sudoración excesiva.

- Cambios en el color de la piel.
- Cambios de color o tamaño del lunar.
- Crecimiento o bulto en la piel.
- Inflamación.
- Dolor en los músculos o las articulaciones.
- Ardor, entumecimiento, dolor u hormigueo en las manos, los brazos, las piernas o los pies.
- Irritación o inflamación en la zona en la que se aplicó la inyección.
- Ruptura de la piel en el lugar en que se aplicó el medicamento.
- Amígdalas agrandadas.
- Se siente muy cansado o débil.
- Este medicamento rara vez provocó un aumento de la presión en la cabeza. La mayoría de las veces, los signos aparecieron dentro de las primeras 8 semanas después de comenzar a tomar este medicamento. Llame al médico de inmediato si tiene algún cambio en la visión, dolor de cabeza intenso, malestar estomacal o vómitos.

¿Qué otros efectos secundarios tiene este medicamento?

Todos los medicamentos pueden tener efectos secundarios. Sin embargo, muchas personas no tienen ningún efecto secundario o tienen solamente efectos secundarios menores. Llame a su médico o busque asistencia médica si le molesta alguno de estos efectos

secundarios o no desaparece:

- Dolor de espalda.
- Ardor de estómago.
- Problemas para dormir.
- Vómitos.
- Aumento de peso.

Estos no son todos los efectos secundarios que podrían ocurrir. Si tiene preguntas acerca de los efectos secundarios, llame al médico. Llame al médico para que lo aconseje acerca de los efectos secundarios.

Puede informar los efectos secundarios al organismo de salud de su país.

Puede informar sobre los efectos secundarios a la FDA al 1-800-332-1088. También puede informar sobre los efectos secundarios en <https://www.fda.gov/medwatch>.

¿Cómo se toma mejor este medicamento?

Tome este medicamento según las indicaciones de su médico. Lea toda la información que se le brinde. Siga todas las instrucciones con atención.

- Este medicamento se administra por inyección en la capa grasa de la piel en la parte superior del muslo o en el vientre.
- Si se inyectará solo, el médico o enfermera le indicarán cómo

aplicar la inyección.

- Cambie el lugar donde se aplica la inyección con cada inyección.
- Retire todas las cubiertas de las agujas de los cartuchos antes de inyectar una dosis (puede haber 2). Consulte al médico si no está seguro del tipo de aguja que debe usar con el cartucho.
- Este producto puede producir chasquidos mientras prepara la dosis. No prepare la dosis contando los chasquidos. Hacer esto puede ocasionar que se utilice una dosis incorrecta.
- Vuelva a tapar después de tomar la dosis.
- No utilizar si la solución se ve turbia, pierde o contiene partículas.
- Este medicamento tiene un aspecto entre incoloro y amarillento. No administre si la solución cambia de color.
- Quite la aguja después de cada inyección. No almacene este dispositivo si está colocada la aguja.
- Deseche las agujas en la caja para agujas y objetos cortantes. No vuelva a utilizar agujas ni otros suministros. Cuando la caja esté llena, siga todos los procedimientos locales para desecharla. Si tiene preguntas, consulte al médico o farmacéutico.

¿Qué debo hacer si no tomo una dosis?

- Tome la dosis que se saltó lo antes posible.
- Si se olvida de la dosis durante más de 3 días, sátese la dosis olvidada. Tome la próxima dosis el día habitual.

¿Cómo almaceno o descarto este medicamento?

- Conserve en el refrigerador. No congelar.
- Conservar en el envase original para proteger de la luz.
- Deseche la porción que no utilice 6 semanas después de abrir el medicamento.
- No utilice el producto si se congeló.
- Si fuera necesario, este medicamento puede permanecer a temperatura ambiente durante 72 horas como máximo. Este medicamento se puede volver a guardar en el refrigerador. Deseche el medicamento si se lo ha dejado a temperatura ambiente durante más de 72 horas.
- Proteja del calor y de la luz solar.
- Deseche el medicamento si se guardó a una temperatura superior a 86 °F (30 °C).
- Guarde los medicamentos en un lugar seguro. Mantenga todo medicamento fuera del alcance de los niños y las mascotas.
- Deseche los medicamentos sin usar o que hayan expirado. No los tire por el retrete ni los vierta al desagüe a menos que así se lo indiquen. Consulte con el farmacéutico si tiene preguntas sobre la mejor manera de desechar medicamentos. Pueden existir programas de devolución de medicamentos en su área.

Datos generales sobre el medicamento

- Si sus síntomas o trastornos no mejoran o si empeoran, llame al

médico.

- No comparta su medicamento con otras personas ni tome el medicamento de ninguna otra persona.
- Algunos medicamentos pueden tener otro folleto informativo para el paciente. Si tiene alguna pregunta sobre este medicamento, hable con su médico, enfermera, farmacéutico u otro proveedor de atención médica.
- Algunos medicamentos pueden tener otro folleto informativo para el paciente. Consulte al farmacéutico. Si tiene alguna pregunta sobre este medicamento, hable con su médico, enfermera, farmacéutico u otro proveedor de atención médica.
- Si cree que ha habido una sobredosis, llame al centro de toxicología local o busque atención médica de inmediato. Prepárese para responder qué se ingirió, qué cantidad y cuándo.

Uso de la información por el consumidor y exención de responsabilidad

No se debe utilizar esta información para decidir si se debe tomar este medicamento o cualquier otro. Solamente el proveedor de atención médica tiene el conocimiento y la capacitación para decidir qué medicamentos son adecuados para un paciente específico. Esta información no recomienda ningún medicamento como seguro, eficaz o aprobado para tratar a ningún paciente o enfermedad. Es solamente un breve resumen de información general sobre este medicamento. NO incluye toda la información sobre los usos, las instrucciones, las advertencias, las precauciones,

las interacciones, los efectos secundarios o los riesgos posibles que podrían aplicarse a este medicamento. Esta información no constituye asesoramiento médico específico y no reemplaza la información que usted recibe de su proveedor de atención médica. Debe hablar con el proveedor de atención médica para obtener información completa sobre los riesgos y los beneficios de tomar este medicamento. El uso de esta información se rige por el Acuerdo de licencia de usuario final de Lexicomp, disponible en <https://www.wolterskluwer.com/en/solutions/lexicomp/about/eula>.

Derechos de autor

© 2021 UpToDate, Inc. y sus licenciantes y/o afiliados. Todos los derechos reservados.

Si tienes preguntas, contacta a un integrante del equipo de atención médica directamente. Si eres paciente de MSK y necesitas comunicarte con un proveedor después de las 5:00 PM, durante el fin de semana o un día feriado, llama al 212-639-2000.

Para obtener más recursos, visita www.mskcc.org/pe y busca en nuestra biblioteca virtual.

Somapacitan - Last updated on August 31, 2021

Todos los derechos son propiedad y se reservan a favor de Memorial Sloan Kettering Cancer Center