

Thioridazine

Esta información de Lexicomp® le explica lo que debe saber sobre este medicamento, por ejemplo, para qué se usa, cómo tomarlo, sus efectos secundarios y cuándo llamar a su proveedor de cuidados de la salud.

Advertencia

- Este medicamento ha provocado frecuencia cardíaca perjudicial que no es normal (QT largo en un ECG). Las personas que tomaron este medicamento rara vez presentaron muerte súbita. Consulte al médico.
- Este medicamento solo debe usarse cuando no puedan utilizarse otros medicamentos, o estos no hayan funcionado. Consulte al médico de su hijo para asegurarse de que los beneficios de este medicamento sean más que los riesgos.
- Hay una probabilidad más alta de muerte en los adultos mayores que toman este medicamento para tratar problemas mentales causados por la demencia. La mayoría de las muertes estuvieron relacionadas con una enfermedad cardíaca o infección. Este medicamento no está aprobado para tratar problemas mentales causados por la demencia.

¿Para qué se usa este medicamento?

- Este medicamento se utiliza para tratar la esquizofrenia.
- Se le puede recetar este medicamento al niño por otras razones. Consulte al médico.

¿Qué debo informar al médico ANTES de que mi hijo/hija tome este medicamento?

- Si su hijo es alérgico a este medicamento, a algún componente de este medicamento, o a otros medicamentos, alimentos o sustancias. Informe a su médico acerca de esta alergia y qué síntomas ha presentado su hijo.
- Si su hijo tiene problemas del corazón.
- Si el niño alguna vez ha tenido un QT largo en el ECG u otro latido cardíaco que no sea normal.
- Si el niño tiene niveles bajos de potasio, hable con un proveedor de salud médica.
- Si su hijo está muy somnoliento.
- Si su hijo ha bebido alcohol o ha tomado una gran cantidad de medicamentos que podrían retardar las reacciones de su hijo, como por ejemplo fenobarbital o analgésicos como oxicodona.
- Si su hijo está tomando alguno de los siguientes medicamentos: fluoxetina, fluvoxamina, paroxetina, pindolol o propranolol.
- Si el niño toma algún medicamento que pueda producir un determinado tipo de latido cardíaco que no es normal (prolongación del intervalo QT). Hay muchos medicamentos que pueden hacer esto. Pregunte al médico o al farmacéutico si no está seguro.

Esta no es una lista de todos los medicamentos o trastornos que pueden interactuar con este medicamento.

Informe al médico y al farmacéutico todos los medicamentos que su hijo toma (sean estos recetados o de venta libre, productos naturales o vitaminas) y de los problemas de salud que padece. Debe verificar que sea seguro administrarle a su hijo este medicamento con todos sus otros medicamentos y problemas de salud. No empiece, interrumpa ni modifique la dosis de ningún medicamento que tome su hijo sin consultar antes con el médico.

¿Hay algo que deba saber o hacer mientras mi hijo/hija toma este medicamento?

- Avise a todos los proveedores de atención médica de su hijo que el niño toma

este medicamento. Esto incluye a los médicos, enfermeras, farmacéuticos y dentistas del niño.

- El niño debe evitar las tareas o las acciones que requieren un estado de alerta hasta que usted observe cómo este medicamento afecta a su hijo. Estas son actividades como andar en bicicleta, practicar deportes o usar elementos como tijeras, podadoras de césped, motocicletas eléctricas, automóviles de juguete o vehículos motorizados.
- Para reducir la probabilidad de que su hijo se sienta mareado o pierda la conciencia, haga que se levante lentamente si estuvo sentado o recostado. Haga que su hijo tenga cuidado al subir y bajar escaleras.
- El alcohol puede interactuar con este medicamento. Asegúrese de que su hijo no beba alcohol.
- Consulte con el médico antes de que su hijo consuma marihuana, otras formas de cannabis, o medicamentos recetados o de venta libre que puedan ralentizar sus reacciones.
- Se han presentado recuentos bajos de glóbulos blancos con el uso de este medicamento. Esto puede generar mayor riesgo de infección. En pocas ocasiones, las infecciones han sido mortales. Informe al médico si, en alguna oportunidad, el niño ha presentado un recuento bajo de glóbulos blancos. Comuníquese con el médico de inmediato si el niño tiene síntomas de infección como fiebre, escalofríos o dolor de garganta.
- Antes de comenzar a tomar este medicamento y durante el tratamiento, su hijo deberá hacerse un ECG. Hable con el médico.
- Pida que le hagan análisis de sangre de control con frecuencia al niño. Hable con el médico del niño.
- El niño debe tener cuidado con el clima cálido o mientras está activo. El niño debe beber mucho líquido para evitar la deshidratación.
- Pueden producirse mareos, somnolencia e inestabilidad con este medicamento. Esto puede provocar caídas, lo que puede causar fracturas de huesos u otros problemas de salud.
- Si su hijo va a estar cerca de insecticidas fosforosos, hable con el médico.

Si su hija está embarazada o amamantando a un bebé:

- Consumir este medicamento en el tercer trimestre del embarazo puede causar movimientos musculares no controlados y abstinencia en el recién nacido.
- Consulte al médico si su hija está embarazada, queda embarazada o está amamantando a un bebé. Tendrá que hablar acerca de los riesgos y beneficios para su hija y el bebé.

¿Cuáles son los efectos secundarios por los que debo llamar al médico de mi hijo/hija de inmediato?

ADVERTENCIA/PRECAUCIÓN: a pesar de que es muy poco frecuente, algunas personas pueden sufrir efectos secundarios muy graves, y en ocasiones mortales, al tomar un medicamento. Si su hijo presenta alguno de los siguientes signos o síntomas que pueden estar relacionados con un efecto secundario muy grave, infórmelo al médico de su hijo o busque ayuda médica de inmediato:

- Signos de reacción alérgica tales como sarpullido; urticaria; picazón; piel enrojecida, hinchada, con ampollas o descamada, con o sin fiebre; sibilancia; opresión en el pecho o la garganta; problemas para respirar, tragar o hablar; ronquera inusual; o hinchazón de la boca, el rostro, los labios, la lengua o la garganta.
- Problemas para controlar los movimientos corporales, contracciones musculares, cambios en el equilibrio, problemas para tragar o hablar.
- Temblor, dificultad para movilizarse, entumecimiento.
- Mareos o desmayos.
- Latidos cardíacos anormales o acelerados.
- Dolor o presión en el pecho.
- Confusión.
- Cambios de humor.
- Convulsiones.
- Hinchazón en los brazos o las piernas.

- Cambio en la vista.
- Se siente muy cansado o débil.
- Agitación.
- Piel pálida.
- Aumento de tamaño de los pechos o secreción del pezón.
- Algunas personas pueden tener un problema muscular grave llamado discinesia tardía. Este problema puede disminuir o desaparecer después de suspender este medicamento, pero es posible que no desaparezca. El riesgo es mayor en personas con diabetes y adultos mayores, especialmente en mujeres mayores. El riesgo es mayor con el uso prolongado o dosis más altas, pero también puede ocurrir después del uso a corto plazo en dosis bajas. Llame al médico de su hijo de inmediato si tiene dificultades para controlar los movimientos corporales o problemas con la lengua, el rostro, la boca o la mandíbula, como lengua que sobresale de la boca, mejillas hinchadas, boca fruncida o masticación.
- Puede ocurrir un problema de salud grave y, en ocasiones, mortal, llamado síndrome neuroléptico maligno (SNM). Llame al médico de su hijo de inmediato si su hijo tiene fiebre, calambres o rigidez en los músculos, mareos, dolor de cabeza muy intenso, confusión, cambios en el pensamiento, latidos acelerados, latidos que no parecen normales o sudoración excesiva.

Si su hija tiene períodos menstruales:

- Cambios en el período (menstrual).

Si su hijo es sexualmente activo o puede serlo:

- Problemas de desempeño sexual, como disminución del interés sexual o problemas de eyaculación.

¿Qué otros efectos secundarios tiene este medicamento?

Todos los medicamentos pueden tener efectos secundarios. Sin embargo, muchas personas no padecen ningún efecto secundario o padecen solamente efectos

secundarios menores. Llame al médico de su hijo o busque ayuda médica si al niño le molesta alguno de estos efectos secundarios o no desaparece:

- Diarrea o estreñimiento.
- Náusea o vómito.
- Boca seca.
- Somnolencia.
- Nariz tapada.

Estos no son todos los efectos secundarios que podrían ocurrir. Si tiene preguntas acerca de los efectos secundarios, llame al médico de su hijo. Llame al médico de su hijo para que le aconseje acerca de los efectos secundarios.

Puede informar los efectos secundarios al organismo de salud de su país.

¿Cuál es la mejor forma de tomarlo?

Administre este medicamento según las instrucciones del médico de su hijo. Lea toda la información que se le brinde. Siga todas las instrucciones con atención.

- Siga administrando este medicamento a su hijo según se lo indique el médico u otro proveedor de atención médica, aun si el niño se siente bien.

¿Qué hago si mi hijo/hija olvida tomar una dosis?

- Administre la dosis que olvidó lo antes posible.
- Si ya casi es hora de la dosis siguiente, sátese la dosis faltante y continúe con el horario habitual del niño.
- No administre 2 dosis simultáneamente ni administre dosis adicionales.

¿Cómo debo guardar y/o desechar este medicamento?

- Almacenar a temperatura ambiente protegido de la luz. Mantener en un lugar seco. No conservar en un baño.
- Guarde los medicamentos en un lugar seguro. Mantenga todo medicamento

fuera del alcance de los niños y las mascotas.

- Deseche los medicamentos sin usar o que hayan expirado. No los tire por el retrete ni los vierta al desagüe a menos que así se lo indiquen. Consulte con el farmacéutico si tiene preguntas sobre la mejor manera de desechar medicamentos. Pueden existir programas de devolución de medicamentos en su área.

Afirmaciones generales

- Si los síntomas o trastornos de su hijo no mejoran o si empeoran, llame al médico de su hijo.
- No comparta el medicamento del niño con otras personas ni le de al niño el medicamento de ninguna otra persona.
- Algunos medicamentos pueden tener otro folleto informativo para el paciente. Si tiene alguna pregunta sobre este medicamento, hable con el médico de su hijo, enfermera, farmacéutico u otro proveedor de atención médica.

Exención de responsabilidad y uso de la información del consumidor

No se debe utilizar esta información para decidir si se debe tomar este medicamento o cualquier otro. Solamente el proveedor de atención médica tiene el conocimiento y la capacitación para decidir qué medicamentos son adecuados para un paciente específico. Esta información no recomienda ningún medicamento como seguro, eficaz o aprobado para tratar a ningún paciente o enfermedad. Es solamente un breve resumen de información general sobre este medicamento. NO incluye toda la información sobre los usos, las instrucciones, las advertencias, las precauciones, las interacciones, los efectos secundarios o los riesgos posibles que podrían aplicarse a este medicamento. Esta información no constituye asesoramiento médico específico y no reemplaza la información que usted recibe de su proveedor de atención médica. Debe hablar con el proveedor de atención médica para obtener información completa sobre los riesgos y los beneficios de tomar este medicamento.

Copyright

© 2020 UpToDate, Inc. y sus licenciados y/o afiliados. Todos los derechos reservados.

Si tiene preguntas, contacte a un integrante del equipo de atención médica directamente. Si es paciente de MSK y necesita comunicarse con un proveedor después de las 5:00 PM, durante el fin de semana o un día feriado, llame al 212-639-2000.

Para obtener más recursos, visite www.mskcc.org/pe y busque en nuestra biblioteca virtual.

Thioridazine - Last updated on October 29, 2020

©2020 Memorial Sloan Kettering Cancer Center