



## EDUCACIÓN DE PACIENTES Y CUIDADORES

# Tobramycin (Oral Inhalation)

Esta información de Lexicomp® le explica lo que debe saber sobre este medicamento, por ejemplo, para qué se usa, cómo tomarlo, sus efectos secundarios y cuándo llamar a su proveedor de cuidados de la salud.

### **Marcas estadounidenses**

Bethkis; Kitabis Pak; Tobi; Tobi Podhaler

### **Marcas canadienses**

TOBI; TOBI Podhaler

### **¿Para qué se usa este medicamento?**

- Se administra a personas con fibrosis quística para tratar un determinado tipo de infección bacteriana.

### **¿Qué debo informar al médico ANTES de tomar este medicamento?**

- Si es alérgico a la tobramicina o cualquier otro componente de este medicamento.
- Si es alérgico a algún medicamento como este, a otros medicamentos, alimentos o sustancias. Informe a su médico acerca de esta alergia y qué síntomas ha presentado, tales como, sarpullido; urticaria; comezón; falta de aire;

sibilancia; tos; inflamación de la cara, los labios, la lengua o la garganta o cualquier otro síntoma.

- Si toma alguno de los siguientes medicamentos: Ácido etacrínico, furosemida, monitol, o urea.
- Si toma o si últimamente ha tomado algún medicamento que cause problemas nerviosos, renales o de audición. Estos pueden ser medicamentos como anfotericina B, bacitracina, cefaloridina, cisplatina, colistina, ciclosporina, paromomicina, polimixina B, vancomicina, viomicina u otros medicamentos como este. Existen muchos otros medicamentos que pueden hacer esto. Pregunte al médico o al farmacéutico si no está seguro.

Esta no es una lista de todos los medicamentos o trastornos que pueden interactuar con este medicamento.

Informe a su médico y farmacéutico acerca de todos los medicamentos que tome (sean estos recetados o de venta libre, productos naturales, vitaminas) y los trastornos que tenga. Debe verificar que sea seguro para usted tomar este medicamento junto con todos sus otros medicamentos y trastornos. No empiece, detenga ni modifique la dosis de ningún medicamento sin consultar antes al médico.

### **¿Qué debo tener en cuenta al usar este medicamento?**

- Avise a todos sus proveedores de atención médica que toma este medicamento. Esto incluye a los médicos, enfermeras, farmacéuticos y dentistas.

- Controle la función sanguínea según le indique el médico. Consulte al médico.
- Realice una audiometría antes de comenzar a tomar este medicamento y mientras lo toma.
- Controle la orina según le haya indicado su médico.
- No lo use durante más tiempo que el indicado. Es posible que haya una segunda infección.
- Este medicamento puede dañar al feto si se toma durante el embarazo. Si está embarazada o queda embarazada mientras toma este medicamento, llame al médico de inmediato.
- Informe a su médico si está amamantando a su bebé. Tendrá que hablar acerca de si hay riesgos para el bebé.

### **Razones por las que debe llamar a su médico de inmediato.**

**ADVERTENCIA/PRECAUCIÓN:** A pesar de que es muy poco frecuente, algunas personas pueden sufrir efectos secundarios muy graves, que causen incluso la muerte, al tomar un medicamento. Si presenta alguno de los siguientes signos o síntomas que puedan estar relacionados con un efecto secundario muy grave, infórmelo a su médico o busque asistencia médica de inmediato:

- Signos de reacción alérgica tales como sarpullido; urticaria; picazón; piel enrojecida, hinchada, con ampollas o descamada, con o sin fiebre; sibilancia; opresión en el pecho

o la garganta; problemas para respirar, tragar o hablar; ronquera inusual; o hinchazón de la boca, el rostro, los labios, la lengua o la garganta.

- Signos de problemas renales como la incapacidad de orinar, cambios en la cantidad de orina, sangre en la orina o un aumento de peso importante.
- Modificación del equilibrio.
- Mareos o desmayos.
- Fiebre.
- Debilidad muscular.
- Zumbido en los oídos, pérdida de la audición o cualquier otro cambio en la audición.
- Sibilancia.
- Tos persistente.
- Toser sangre.
- Problema para respirar reciente o que empeoró.

### **¿Qué otros efectos secundarios tiene este medicamento?**

Todos los medicamentos pueden tener efectos secundarios. Sin embargo, muchas personas no tienen ningún efecto secundario o tienen solamente efectos secundarios menores. Llame a su médico o busque asistencia médica si le molesta alguno de estos efectos secundarios o no desaparece:

- Dolor de cabeza.

- Tos.
- Más esputo.
- Dolor en la boca.
- Dolor de garganta.
- Dolor de garganta.
- Cambios en la capacidad de percibir sabores.
- Respiración ruidosa.
- Modificación de la voz.
- Nariz tapada.
- Náusea o vómito.

Estos no son todos los efectos secundarios que podrían ocurrir. Si tiene preguntas acerca de los efectos secundarios, llame al médico. Llame al médico para que lo aconseje acerca de los efectos secundarios.

Puede informar los efectos secundarios al organismo de salud de su país.

### **¿Cuál es la mejor forma de tomarlo?**

Tome este medicamento según las indicaciones de su médico. Lea toda la información que se le brinde. Siga todas las instrucciones con atención.

### **Todas las presentaciones:**

- Para sacar el mayor provecho de este medicamento, no se

salte ninguna dosis.

- Siga usando este medicamento según se lo indique el médico u otro proveedor de atención médica, aun si se siente bien.
- Siga las indicaciones de su médico o lea el prospecto adjunto al envase.

### **Solución para inhalar:**

- Lo utilizará inhalando (chupar) por la boca con una máquina nebulizadora. Su proveedor de salud médica le enseñara la manera adecuado de utilizarlo.
- Solo utilice el tipo de nebulizador que le indicaron usar. Consulte al médico si no está seguro del tipo de nebulizador que debe usar.
- No utilizar si la solución se ve turbia, pierde o contiene partículas.
- Si ya está utilizando dornasa alfa, no mezcle este medicamento en el mismo nebulizador de la dornasa alfa. Si está utilizando más de 1 fármaco de inhalación, consulte con su médico acerca de la mejor forma de tomar el medicamento.
- No mezcle otros medicamentos en el nebulizador.
- Siga las instrucciones de uso cuidadosamente.

### **Capsulas para inhalar:**

- **No trague la cápsula. El contenido de la cápsula se**

## **inhalará hacia los pulmones.**

- Utilice únicamente el dispositivo que viene con el medicamento. No utilice otros dispositivos.
- Retire la cápsula del envoltorio de aluminio justo antes de usarla.
- Si quedó polvo en la cápsula, exhale completamente y repita. Una vez que la cápsula quede vacía, deséchela.
- Si utiliza más de 1 fármaco de inhalación, consulte con su médico acerca de la mejor forma de tomar los medicamentos.
- Consúltele al médico el uso del inhalador en cada visita. Lea y siga todas las instrucciones que vienen con el inhalador. Asegúrese de usar el inhalador correctamente.
- Utilice un nuevo inhalador con cada reposición.

## **¿Qué hago si se me olvida tomar una dosis?**

- Tome la dosis que se saltó lo antes posible.
- Si faltan menos de 6 horas para la dosis siguiente, omita la dosis faltante y continúe con el horario habitual.
- No tome dos dosis al mismo tiempo ni tome dosis adicionales.

## **¿Cómo debo conservar este medicamento?**

### **Solución para inhalar:**

- Conserve en el refrigerador o a temperatura ambiente. Si se

guarda a temperatura ambiente, tire cualquier porción sin usar después de 28 días.

- Conserve los recipientes sin usar en el estuche de aluminio hasta que llegue el momento de usarlos.
- No congelar.
- Proteja de la luz.
- Este medicamento puede volverse un poco más oscuro con el transcurso del tiempo si lo conserva a temperatura ambiente. Esto no afecta el funcionamiento del medicamento siempre y cuando esté almacenado a temperatura ambiente como le han indicado.

### **Capsulas para inhalar:**

- Conserve en su envase original a temperatura ambiente.
- Mantener en un lugar seco. No conservar en un baño.

### **Todas las presentaciones:**

- Guarde los medicamentos en un lugar seguro. Mantenga todo medicamento fuera del alcance de los niños y las mascotas.
- Deseche los medicamentos sin usar o que hayan expirado. No los tire por el retrete ni los vierta al desagüe a menos que así se lo indiquen. Consulte con el farmacéutico si tiene preguntas sobre la mejor manera de desechar medicamentos. Pueden existir programas de devolución de medicamentos en su área.



## **Afirmaciones generales**

- Si sus síntomas o trastornos no mejoran o si empeoran, llame al médico.
- No comparta su medicamento con otras personas ni tome el medicamento de ninguna otra persona.
- Lleve consigo una lista de todos los medicamentos que toma (recetados, productos naturales, suplementos, vitaminas, medicamentos que obtuvo sin receta). Entregue esta lista al médico.
- Hable con su médico antes de comenzar a tomar cualquier medicamento, ya sea uno recetado o sin receta, productos naturales o vitaminas.
- Algunos medicamentos pueden tener otro folleto informativo para el paciente. Si tiene alguna pregunta sobre este medicamento, hable con su médico, enfermera, farmacéutico u otro proveedor de atención médica.
- Si cree que ha habido una sobredosis, llame al centro de toxicología local o busque atención médica de inmediato. Prepárese para responder qué se ingirió, qué cantidad y cuándo.

## **Exención de responsabilidad y uso de la información del consumidor**

No se debe utilizar esta información para decidir si se debe tomar este medicamento o cualquier otro. Solamente el proveedor de atención médica tiene el conocimiento y la capacitación para decidir qué medicamentos son adecuados

para un paciente específico. Esta información no recomienda ningún medicamento como seguro, eficaz o aprobado para tratar a ningún paciente o enfermedad. Es solamente un breve resumen de información general sobre este medicamento. NO incluye toda la información sobre los usos, las instrucciones, las advertencias, las precauciones, las interacciones, los efectos secundarios o los riesgos posibles que podrían aplicarse a este medicamento. Esta información no constituye asesoramiento médico específico y no reemplaza la información que usted recibe de su proveedor de atención médica. Debe hablar con el proveedor de atención médica para obtener información completa sobre los riesgos y los beneficios de tomar este medicamento.

## **Copyright**

© 2019 Wolters Kluwer Clinical Drug Information, Inc. y sus licenciantes y/o afiliados. Todos los derechos reservados.

Si tiene preguntas, llame a un miembro de su equipo de atención médica directamente. Si es paciente de MSK puede comunicarse con un proveedor de cuidados de la salud después de las 5:00 PM, durante los fines de semana y los feriados, llame al 212-639-2000.

Para obtener más recursos, visite [www.mskcc.org/pe](http://www.mskcc.org/pe) y podrá hacer búsquedas en nuestra biblioteca virtual.

---

Tobramycin (Oral Inhalation) - Generated on July 18, 2019

©2019 Memorial Sloan Kettering Cancer Center