Memorial Sloan Kettering Cancer Center

EDUCACIÓN PARA PACIENTES Y CUIDADORES

Qué hacer después de una reacción al medio de contraste

En esta información se explica qué debe hacer después de tener una reacción al medio de contraste.

Usted tuvo una reacción a lo siguiente:

Contraste de la imagen por resonancia magnética (IRM):

☐ Gadobutrol (Gadovist®)

☐ Gadoxetate disodium (Eovist®)

☐ Gadoterate meglumine (Clariscan™)

☐ Gadoterate meglumine (Dotarem®)

☐ Gadopiclenol (Elucirem™)

☐ Gadopiclenol (VUEWAY™)

Contraste de la tomografía computarizada (CT):

☐ Iohexol (Omnipaque™)

☐ Iopamidol (Isovue®)

Qué debe hacer hoy

☐ Vaya al Centro de Atención de Urgencia o a la sala de emergencias local.

☐ Vaya a su casa después del examen de exploración.

- Vaya a la sala de emergencias más cercana o llame al 911 si tiene alguno de estos síntomas:
  - Dificultad para respirar
  - Sentir que le falta el aire
  - Dolor de pecho
- Llame al médico que solicitó este examen de exploración si tiene síntomas nuevos o preocupantes.

☐ Se le administró diphenhydramine (Benadryl®), que le puede causar somnolencia.

- No regrese a su casa conduciendo. Le ayudaremos a hacer los arreglos necesarios.
- Vaya a la sala de emergencias más cercana si siente un dolor agudo y repentino en los ojos o si tiene problemas para orinar.

Qué debe hacer antes de su próxima exploración con contraste

Dígales a todos sus proveedores de cuidados de la salud que tuvo esta reacción. Hemos registrado la reacción al contraste en su historia clínica de MSK.

En las futuras ☐ tomografías computarizadas ☐ IRM con contraste, siga las instrucciones marcadas a continuación:

☐ Su reacción fue un efecto secundario del contraste, no una alergia. Tomaremos medidas para reducir el efecto secundario la próxima vez que reciba este contraste.

☐ Su reacción fue una reacción alérgica leve. No haga nada diferente antes de su próximo examen de exploración.

☐ Su reacción fue una reacción alérgica moderada. El médico que solicite el examen de exploración le dará una receta para un esteroide. Además, es

posible que le dé una receta para diphenhydramine. Comience a tomarlos el día antes de cada (marque uno) ☐ resonancia magnética ☐ tomografía computarizada que se haga con contraste. Siga las instrucciones de su médico.

☐ Su reacción fue grave. Hable con su médico sobre su alergia antes de su próxima (marque uno) ☐ resonancia magnética ☐ tomografía computarizada antes de le administren el contraste.

Si tiene preguntas, llame al _____ y pida hablar con un enfermero.

Para obtener más recursos, visite www.mskcc.org/pe y busque en nuestra biblioteca virtual.

What to Do After Your Reaction to Contrast Dye - Last updated on July 31, 2023
Todos los derechos son propiedad y se reservan a favor de Memorial Sloan Kettering Cancer Center