



દર્દીર અને સંભાળદાતા શિક્ષણ

## તમારા ઈમ્પ્લાન્ટ કરેલ પોટર વિશે

આ માહિતી ઈમ્પ્લાન્ટ કરેલ પોટર, પોટર પ્લેસમેન્ટ અને તમારા પોટરની સંભાળ કેવી રીતે રાખવી તે સમજાવે છે. ઈમ્પ્લાન્ટ કરેલ પોટરને ઘણીવાર mediport(મેડીપોટર) અથવા port-a-cath(પોટર-એ-કેથ) કહેવામાં આવે છે. કેન્સરની સારવાર દરમિયાન પોટર તમારી નસોને સુરક્ષિત રાખે છે.

### ઈમ્પ્લાન્ટ કરેલ પોટર શું છે?

ઈમ્પ્લાન્ટ કરેલ પોટર એ સેન્ટ્રલ વીનસ કેથેટર (CVC) નો એક પર્કાર છે. CVC એ લવચીક ટ્યુબ છે જે તમારી નસોમાંની એક નસમાં નાખવામાં આવે છે.

તમારે તમારા હાથમાં છે તે નસ કરતાં મોટી નસમાં દવા લેવાની જરૂર પડી શકે છે. તમારું પોટર દવાને તમારી નસ દ્વારા તમારા લોહીમાં ભણવા દે છે. તેનો ઉપયોગ તમને સંગ્રહણા દિવસો સુધી દવા આપવા માટે થઈ શકે છે.

પોટર તમારી નસોને વારંવાર એક્સેસથી થતાં નુકસાનથી સુરક્ષિત કરે છે. પોટર તમારી સંભાળ ટીમ માટે નીચેની બાબતો સરળ બનાવે છે:


- લોહીના નમૂના લેવા
- તમને ઇન્ટરાવીનસ (IV, નસ મારફતે) દવાઓ આપવી આ એ દવા છે જેને તમારી નસોમાંની એક નસમાં નાખવામાં આવે છે. કેટલીક IV દવાઓ, જેમ કે એનેસ્થેસિયા અને અમુક પર્કારની કીમોથેરાપી (કીમો), જેને મોટી નસમાંથી પસાર કરવી આવશ્યક છે.

- તમને IV ફ્લુઈડ્સ આપવામાં
- તમને IV રક્ત ઉત્પાદનો આપો, જેમ કે પ્લેટલેટ્સ અને પ્લાઝ્મા.
- તમને IV કોન્ટરાસ્ટ આપવામાં આવે છે. આ એક ખાસ ડાઇ છે જે તમારા આરોગ્યસંભાળ પરદાતાને તમારા અંગોને વધુ સારી રીતે જોવામાં મદદ કરે છે.

તમારા આરોગ્યસંભાળ પરદાતા તમને જણાવશે કે શું પોટર્થી સારવાર તમારા માટે અને તમારી સારવાર માટે શરેષ્ઠ છે.

સજર્ન અથવા ઇન્ટરવેન્શનલ રેડિયોલોજિસ્ટ (જેને IR ડોક્ટર પણ કહેવાય છે) તમારું પોટર ગોઠવશે. IR ડોક્ટર એક ડોક્ટર છે જે ઇમેજ-માગરદશિર્ત પર્કિર્યાઓમાં નિષ્ણાત છે. તેઓ સામાન્ય રીતે તમારા પોટરને તમારી છાતીમાં મૂકશે. પોટર ક્યારેક તેના બદલે તમારા ઉપરના હાથમાં મૂકી શકે છે. તમારું પોટર ક્યાં મૂકવામાં આવશે તે વિશે તમારા આરોગ્યસંભાળ પરદાતા તમારી સાથે વાત કરશે.

છાતીમાં મૂકવામાં આવેલા પોટર સામાન્ય રીતે તમારા જમણા કોલરબોનની મધ્યથી લગભગ 1 ઈચ (2.5 સેન્ટિમીટર) નીચે હોય છે (આકૃતિ 1 જુઓ). આ તમારી નસમાં એકદમ સરળ રીતે નાખવા માટે મંજૂરી આપે છે. જો તમે બરા પહેરો છો, તો તમારું પોટર જ્યાંથી તમારી બરાનો પટ્ટો આવેલો છે ત્યાંથી લગભગ 1 ઈચ દૂર હશે.



આકૃતિ 1. પોટરનો આગળનો વ્યૂ (ડાબે) અને પોટર બાજુનો વ્યૂ (જમણો)

તમારું પોટર તમારી ત્વચામાંથી લગભગ  $\frac{1}{2}$  ઇંચ (1.2 સેન્ટિમીટર) ઉપર તરફ બહાર આવી શકે છે. તમે તેને તમારી ત્વચામાં અનુભવી શકશો. મોટાભાગના લોકો કહી શકશો નહીં કે તમારી પાસે પોટર છે. જો તમારી સંભાળ ટીમે Steri-Strips(સ્ટેરી-સ્ટ્રિપ્સ)નો ઉપયોગ કર્યોર હોય, તો તે 7 થી 10 દિવસમાં પોતાની મેળે નીકળીને પડી જશે.

તમારું પોટર વખોર સુધી તે સ્થાને રહી શકે છે. તમારા આરોગ્યસંભાળ પરદાતા તમારા પોટરને હટાવી દેશે જ્યારે તમને તેની જરૂર ન હોય. જો તેનાથી તમને ચેપ લાગે તો પણ તેઓ તેને દૂર કરશો. જો તમને જરૂર હોય તો તમે બીજા પોટરને પછીથી મૂકી શકો છો.

**તમારા ઈમ્પાલન્ટ કરેલા પોટરના ભાગો**  
ઇમ્પલાન્ટ કરેલ પોટરના ભાગોમાં પોટર, સેપ્ટમ અને કેથેટર છે (આકૃતિ 2 જુઓ).


## પોટર અને સેપ્ટમ

પોટર એ કેથેટરમાંથી પર્વાહી વહેવા માટેનું શરૂઆતનું સ્થાન છે. તે તમારા ત્વચાની નીચે બેસાડાય છે અને તેમાં સેપ્ટમ નામનું ઉપર તરફ ઉઠેલ કેન્દ્ર હોય છે. આ પોટરનો એક ભાગ છે જ્યાં સોય બેસાડવામાં આવશે. તેને ઓક્સેસ પોર્ટન્ટ પણ કહેવામાં આવે છે.

સેપ્ટમ એ એની જાતે સીલ થઈ જતા રબરમાંથી બને છે. પોટરમાં હોય તે સોય વગર કંઈપણ પર્વેશી શકતું નથી. સોય દૂર કર્યાર પછી સેપ્ટમ બંધ થાય છે.

## કેથેટર

કેથેટર એક પાતળી, લવચીક પ્લાસ્ટિકની નળી છે. એક છેડો તમારા પોટર સાથે જોડાયેલ છે. બીજો છેડો તમારી નસમાં નાખવામાં આવે છે.



## આકૃતિ 2. તમારા પોટરના ભાગો

### ઇમ્પ્લાન્ટ કરેલ પોટરના પર્કારો

પોટર વતુરળ, અંડાકાર અથવા તિર્કોણ જેવા આકારનું હોઈ શકે છે. તમારું પોટર Mediport®, BardPort®, PowerPort® અથવા Port-A-Cath® હોઈ શકે છે. તે સિંગલ લ્યુમેન પોટર અથવા ડબલ લ્યુમેન પોટર હોઈ શકે છે (આકૃતિ 3 જુઓ). તમારા આરોગ્યસંભાળ પરદાતા તમારા માટે અને તમારી સારવાર માટે શરેખ્થ હોય તેને પસંદ કરશે.

### એક લ્યુમેન પોટર

એક લ્યુમેન પોટરમાં 1 એક્સ્સેસ પોર્ટન્ટ છે. મોટાભાગના લોકોને સિંગલ લ્યુમેન પોટર મળે છે.

### બે લ્યુમેન પોટર

ડબલ લ્યુમેન પોટરમાં 2 એક્સેસ પોર્ટન્ટ છે. તમે દરેક એક્સેસ પોર્ટન્ટમાં એક સોય મૂકી શકો છો. જો તમને સારવાર માટે સામાન્ય રીતે 1 પોર્ટન્ટથી વધુ એક્સેસની જરૂર હોય તો તમને ડબલ લ્યુમેન પોટર મળી શકે છે.



આકૃતિ 3. સિંગલ (ડાબે) અને ડબલ (જમણો) લ્યુમેન પોટર્

### પાવર-ઇન્જેક્ટેબલ પોટર્

મોટાભાગના ઇમ્પ્લાન્ટ કરેલ પોટર્ ઇમેજિંગ પરીક્ષણો દરમિયાન ઉપયોગમાં લેવા માટે બનાવવામાં આવે છે. તેમાં કોમ્પ્યુટેડ ટોમોગ્રાફી (CT) સ્ક્રેન અથવા મેગ્નેટિક રેઝોનન્સ ઇમેજિંગ (MRI) નો સમાવેશ થાય છે. આ પોટર્ તમને કોન્ટરાસ્ટના હાઇ સ્પીડ ઇન્જેક્શન (શોટ) આપે છે. આને પાવર-ઇન્જેક્ટેબલ પોટર્ કહેવામાં આવે છે (આકૃતિ 4 જુઓ).

જો પાસે પાવર-ઇન્જેક્ટેબલ પોટર્ છે તો તમારા આરોગ્યસંભાળ પ્રદાતા તમને જણાવશે. તેઓ તમને તમારા પોટર્ વિશેની માહિતી સાથેનું વોલેટ કાડર પણ આપશે. તમારે તે દરેક સમયે તમારી સાથે રાખવું જોઈએ.



આકૃતિ 4. સિંગલ (ડાબે) અને ડબલ (જમણો) પાવર-ઇન્જેક્ટેબલ પોટર્

# તમારે ઇમ્પ્લાન્ટ કરેલ પોટર પ્લોસમેન્ટ ઓપરેશન પહેલાં શું કરવું

તમારા ઓપરેશનના લગભગ 1 અઠવાડિયા પહેલાં, તમે ઓપરેશન પહેલાંની મુલાકાત માટે ઓપરેશન ટીમ સાથે મુલાકાત કરશો. આ મુલાકાત દરમિયાન, તેઓ તમને તમારા નવા પોટર વિશે અને તેની સંભાળ કેવી રીતે રાખવી તે વિશે વધુ શીખવશો. તમારી સાથે શીખવા માટે તમારા પરિવારના કોઈ સભ્ય અથવા મિત્ર પણ હોવા જોઈએ.

## તમારી દવાઓ વિશે પૂછો

તમારે તમારા ઓપરેશન પહેલાં તમારી કેટલીક દવાઓ લેવાનું બંધ કરવાની જરૂર પડી શકે છે, જેમાં નીચેનાનો સમાવેશ થાય છે:

- વિટામિન E.
- એસ્સિપરિન.
- એન્ટીકોએગ્યુલન્ટ્સ (રક્ત પાતળું કરનાર)
- ઇન્સ્યુલિન અથવા ડાયાબિટીસ માટેની અન્ય દવાઓ.
- વજન ઘટાડવાની દવાઓ

કઈ દવાઓ લેવાનું બંધ કરવું તમારા માટે સલામત છે તે વિશે તમારા ડૉક્ટર સાથે વાત કરો.

જો તમે કોઈપણ અન્ય દવાઓ લઈ રહ્યા હો, તો તે ડૉક્ટરને પૂછો કે તેમણે જે દવાઓ સૂચવી છે કે શું તમારે તમારા ઓપરેશન પહેલાં તેને લેવાનું બંધ કરવું જોઈએ.

જો તમે સવારે કોઈપણ દવાઓ લો છો, તો તમારા ડૉક્ટર સાથે વાત કરો કે તમારે તમારા ઓપરેશન પહેલાં કઈ દવાઓ લેવી જોઈએ. તમારા ડૉક્ટર તમને તમારી કેટલીક દવાઓ લેવા માટે તમારું ઓપરેશન પૂણાર થાય ત્યાં સુધી રાહ જોવાનું કહી શકે છે.

## તમારી પરોસીજરના સમયની નોંધ કરો

સ્ટોફના સભ્ય તમારા ઓપરેશનના આગલા દિવસે તમને બપોરે 2 થી 4 વાગ્યાની વચ્ચે ફોન કરશો. જો તમારું ઓપરેશન સોમવારે નક્કી કરવામાં આવ્યું હોય, તો તેઓ તમને અગાઉના શુક્રવારે કોલ કરશો. જો તમને સાંજે 4 વાગ્યા સુધીમાં કોલ ન આવે, તો 212-639-5948પર કોલ કરો.

સ્ટોફના સભ્ય તમને જણાવશો કે તમારે ઓપરેશન માટે હોસ્પિટલમાં કયા સમયે પહોંચવું. તેઓ તમને એ યાદ પણ કરાવશો કે ક્યાં જવું.

પાકિર્ંગની માહિતી અને તમામ MSK સ્થાનો માટેના દિશાનિદેરણો માટે [www.msk.org/parking](http://www.msk.org/parking) મુલાકાત લો.

**તમારે ઇમ્પ્લાન્ટેડ પોટર પ્લેસમેન્ટ ઓપરેશન માટે કેવી રીતે તૈયાર થવું**

તમારું પોટર પ્લેસમેન્ટ ઓપરેશન, ઓપરેશન રૂમમાં થશે. તમારા આરોગ્યસંભાળ પરદાતા તમને જણાવશો કે કેવી રીતે તૈયાર રહેવું.

**તમારી ત્વચા પરથી ઉપકરણને દૂર કરો**

તમે તમારી ત્વચા પર ચોક્કસ ડિવાઇસો પહેરી શકો છો. તમારું સ્કેન અથવા પ્રક્રિયા પહેલાં, ડિવાઇસ બનાવનાર ભલામણ કરે છે કે તમે તમારા ડિવાઇસ ઉતારો:

- સતત ગ્લુકોઝનું મોનિટરિંગ (CGM)
- ઇન્સ્યુલિન પંપ

તમારે તમારા ઉપકરણને બદલવાની જરૂર હોય તે તારીખની નજીક તમારી અપોઇન્ટમેન્ટના શેડ્યુલ વિશે તમારા આરોગ્યસંભાળ પરદાતા સાથે વાત કરો. ખાતરી કરી લો કે તમારી પાસે તમારી સ્કેન અથવા પ્રક્રિયા પછી ચાલુ કરવા માટે તમારી સાથે એક વધારાનું ઉપકરણ છે.

જ્યારે તમારું ડિવાઇસ બંધ હોય ત્યારે તમારા ગ્લુકોઝનું સંચાલન કેવી રીતે કરવું તે વિશે તમને ખાતરી ન હોઈ શકે. જો એમ હોય તો, તમારી એપોઇન્ટમેન્ટ પહેલાં, તમારી ડાયાબિટીસની કાળજીનું સંચાલન કરતા આરોગ્યસંભાળ પરદાતા સાથે વાત કરો.

### કોઈ તમને ઘરે લઈ જાય તે માટેની વ્યવસ્થા કરવી

ઓપરેશન પછી તમને ઘરે લઈ જવા માટે તમારી સારવાર કરનાર જવાબદાર વ્યક્તિ હોવો આવશ્યક છે. સારવાર કરનાર જવાબદાર વ્યક્તિ તે છે જે તમને સલામત રીતે ઘરે પહોંચવામાં મદદ કરી શકે છે. જો તેમને કોઈ ચિંતા હોય તો તેઓ તમારી સારવાર ટીમનો સંપક્ર કરવા માટે સમથ્ર હોવા જોઈએ. તમારા ઓપરેશનના દિવસ પહેલાં તેનું આયોજન કરવાની ખાતરી કરો.

જો તમારી પાસે ઘરે લઈ જવા માટે સારવાર કરનાર જવાબદાર વ્યક્તિ ન હોય, તો નીચેની કોઈ એક એજન્સીનો સંપક્ર કરો. તેઓ તમારી સાથે ઘરે જવા માટે કોઈને મોકલશો. આ સેવા માટે શુલ્ક છે અને તમારે પરિવહન પૂરું પાડવું પડશો. ટેક્સી અથવા કાર સેવાનો ઉપયોગ કરવો એ બરાબર છે, પરંતુ તમારે હજી પણ તમારી સારવાર કરનાર જવાબદાર વ્યક્તિની જરૂર છે.

ન્યૂ યોકરમાં એજન્સીઓ

વીએનએસ (VNS) સ્વાસ્થ્ય: 888-  
735-8913

સંભાળ રાખનારા લોકોના સંપક્ર નં.:

877-227-4649

તમારે પોટર્ પ્લેસમેન્ટ ઓપરેશનના આગલા દિવસે શું કરવું

ખાવા-પીવા માટેની સૂચનાઓ

ન્યૂ જસીરમાં એજન્સીઓ

સંભાળ રાખનારા લોકોના સંપક્ર નં.:  
877-227-4649



તમારી સજર્રીની આગલી રાતરે મધરાતેથી (રાતરે 12 વાગ્યે) ખાવાનું બંધ કરી દો. જેમાં હાડ્ર કેન્ડી (પિપરમેન્ટ) અને ચ્યુઇંગમનો સમાવેશ થાય છે.

જો તમારા આરોગ્ય પરદાતા તમને મધ્યરાતિર્ય પહેલાં જમવાનું બંધ કરવાનું કહ્યું હોય, તો તેમની સૂચનાઓનું પાલન કરો. કેટલાક લોકોએ સજર્રી પહેલાં લાંબા સમય સુધી ઉપવાસ (જમવું નહીં) કરવાની જરૂર હોય છે.

## તમારે પોટર્સ પ્લેસમેન્ટ ઓપરેશનના દિવસે શું કરવું

### ખાવા-પીવા માટેની સૂચનાઓ

મધરાત (રાતરે 12 વાગ્યાથી) તમારા આગમન સમયના 2 કલાક પહેલાં સુધી, નીચે દશાર્વેલા પરવાહી જ પીવો. બીજું કંઈ ખાવું કે પીવું નહીં. તમારા આગમન સમયના 2 કલાક પહેલાં પીવાનું બંધ કરો.

- પાણી.
- સ્વચ્છત સફરજનનો રસ, સ્વચ્છત દર્દકૂષનો રસ અથવા સ્વચ્છત ક્રેનબેરીનો રસ.
- ગેટોરેડ અથવા પાવરેડ.
- બ્લેક કોફી કે સાદી ચા. ખાંડ ઉમેરવી ઠીક છે. બીજું કશું ઉમેરશો નહીં.
  - કોઈપણ પરકારનું દૂધ અથવા કરીમર કોઈપણ માતરામાં ઉમેરશો નહીં. જેમાં છોડ આધારિત દૂધ અને કરીમરનો સમાવેશ થાય છે.
  - મધ ઉમેરશો નહીં.
  - ફુલેવરવાળા સીરપ ઉમેરશો નહીં.

જો તમને ડાયાબિટીસ હોય તો આ પીણાંમાં કેટલી માતરામાં ખાંડ છે તેના પર ધ્યાન

આપો. જો તમે આ પીણાંમાં ખાંડ રહિત, ઓછી ખાંડવાળું અથવા ખાંડ વગરના વજરનાનો સમાવેશ કરો છો, તો તમારા રક્તમાં ખાંડનાં સૂતરને નિયંત્રિત કરવાનું સરળ બનશે.

સજર્રી પહેલાં હાઇડરેટેડ રહેવું મદદરૂપ થાય છે, તેથી જો તમને તરસ લાગી હોય તો પાણી પીવો. તમારી જરૂરિયાત કરતા વધારે પીવું નહીં. તમારી સજર્રી દરમિયાન તમને ઇન્ટરાવેન્સ (IV) પરવાહી આપવામાં આવશે.



તમારા આગમન સમયના 2 કલાક પહેલાં પીવાનું બંધ કરો. આમાં પાણીનો પણ સમાવેશ થાય છે.

### દવાઓ માટેની સૂચનાઓ

તમારા ડોક્ટર તમને તમારું ઓપરેશન કરવાનું છે તે દિવસે સવારે જે દવાઓ લેવા માટે કહે છે તે જ દવાઓ લો. તેમને પાણીના નાના ઘૂંઠા સાથે લો.

### યાદ રાખવાની બાબતો

- તમે તમારી પર્કિન્યા પહેલાં સામાન્ય રીતે કરો છો તેમ તમે સ્નાન કરી શકો છો.  
You can shower as you normally would before your procedure. તમારા આરોગ્ય સંભાળ પરદાતા તમને આગલી રાતરે હિબિક્લન્સ નામના વિશેષ સાબુથી સ્નાન કરવાનું કહી શકે છે. જો તેઓ આમ કરવાનું કહે છે, તો આ સંસાધનનો “એન્ટિસેપ્ટિક સ્લિક ક્લીન્સર (જેમ કે હિબિક્લેન્સ) દ્વારા સ્નાન” વિભાગ વાંચો..
- કોઈપણ લોશન, કરીમ, પાવડર, ડીઓડરન્ટ, મેકઅપ, પાવડર, પરક્ક્યુમ અથવા કોલોન ન લગાવો.
- જો તમે કોન્ટેક્ટ લેન્સ પહેરો છો, તો તેના બદલે તમારા ચશ્મા પહેરો. તમારા ઓપરેશન દરમિયાન કોન્ટેક્ટ લેન્સ પહેરવાથી તમારી આંખોને નુકસાન થઈ શકે

છે.

- કોઈપણ ધાતુની વસ્તુઓ પહેરશો નહીં. શરીર પરની કોઈ તીક્ષ્ણા વસ્તુઓ સહિત તમામ ઘરેણાં કાઢી નાખો. તમારા ઓપરેશન દરમિયાન ઉપયોગમાં લેવાતા સાધનો જો ધાતુને સ્પશેર્ટ તો તે બળી શકે છે.
- કિંમતી વસ્તુઓ (જેમ કે કરેડિટ કાડ્ર અને ઘરેણાં) ઘરમાં જ રાખો.
- તમે ઓપરેશન રૂમમાં જાઓ તે પહેલાં તમારે અમુક વસ્તુઓ દૂર કરવાની જરૂર પડશો. આમાં સાંભળવા માટેના સાધનો, ડેન્ટસર્ટ, ફૃતિર્મ ઉપકરણ(ઓ), વિગ અને ધામિર્ક વસ્તુઓનો સમાવેશ થાય છે.

## શું સાથે લાવવું

- જો તમે ચશ્માં પહેરો છો તો તમારા ચશ્મારાખવા માટેનું ખોખું.
- તમારા ઓપરેશન પછી ઢીલા, આરામદાયક કપડાં પહેરવા.
- જો તમે કારમાં ઘરે જઈ રહ્યા હો, તો એક નાનું ઓશીકું અથવા ટુવાલ. તમે તમારા ચીરા (સાંજિર્કલ કટ)ને સીટબેલ્ટથી બચાવવા માટે આનો ઉપયોગ કરી શકો છો.
- તમારું હેલ્થ કેર પરોક્સી ફોમર્ઝ અને અન્ય વિગતવાર નિદેરશો, જો તમે તેમને પૂણાર્ઝ કર્યાર્ઝ હોય.
- જો તમે કોઈ દવા લો છો તો તે સાથે લાવવી.

## જ્યારે તમે આવો ત્યારે શું અપેક્ષા રાખવી

ઘણા સ્ટાફ સભ્યો તમને તમારું નામ અને જન્મ તારીખ કહેવા અને જોડણી કરવા માટે કહેશો. આ તમારી સલામતી માટે છે. સમાન અથવા સરખાં નામ ધરાવતા લોકોની તે જ દિવસે પર્કિર્યા થવાની સંભાવના છે.

જો તમે પેશન્ટ પોટરલ MyMSK પર પર્શનાવલી ના ભરી હોય તો તમે સંક્ષિપ્ત પર્શનાવલી ભરશો.

તમને કેથેટર દ્વારા ધેનની દવા (તમને આરામદાયક થવામાં મદદ કરવા માટેની દવા) આપવામાં આવશે. કેથેટર તમારા બાહુમાં અથવા હાથમાં IV હોઈ શકે છે. તે CVC પણ હોઈ શકે છે, જેમ કે પેરિફેરલી ઇન્સ્ટેર્ડ સેન્ટ્રલ કેથેટર (PICC), જો તમારી પાસે પહેલાથી જ તે હોય. તમારી સંભાળ ટીમનો સભ્ય તમારી પર્કિર્યા પહેલા તમારી સાથે આ અંગે વિચાર કરશે.

જ્યારે તમારું પોટર મૂકવાનો સમય થશે ત્યારે સ્ટાફ મેમ્બર તમને પર્કિર્યા રૂમમાં લાવશે.

### નસર સાથેની મુલાકાત

તમારા ઓપરેશન પહેલાં તમે એક નસરને મળશો. તેમને મધરાત (રાતરે 12 વાગ્યા) પછી તમે લીધેલી કોઈ પણ દવાઓની માતરા અને તેને લેવાનો સમય જણાવો. પિરસ્િક્રેપ્શન અને પિરસ્િક્રેપ્શન વિનાની દવાઓ, દદરમાં રાહત માટે લગાવવામાં આવતી પટ્ટીઓ અને કરીમનો સમાવેશ કરો છો તેની ખાતરી કરો.

તમારી નસર તમારી કોઈ એક નસમાં એક નરમ, લવચીક ટ્યુબ (ઇન્ટ્રાવેનસ લાઇન, IV) મૂકી શકે છે, જે સામાન્ય રીતે તમારી ભુજા કે હાથમાં હોય છે. જો તમારી નસર નરમ, લવચીક ટ્યુબ (ઇન્ટ્રાવેનસ લાઇન, IV) ન મુકે, તો તમારા એનેસ્થેસિયોલોજિસ્ટ તેને ઓપરેશન રૂમમાં જઈને મુકશે.

### એનેસ્થેસિયોલોજિસ્ટ સાથેની મુલાકાત

તમે એનેસ્થેસિયોલોજિસ્ટ (A-nes-THEE-zee-AH-loh-jist) સાથે પણ મુલાકાત કરશો. એનેસ્થેસિયોલોજિસ્ટ એનેસ્થેસિયાની વિશેષ તાલીમ ધરાવતા ડોક્ટર છે. તેઓ તમને તમારા ઓપરેશન દરમિયાન એનેસ્થેસિયા આપશે. તેઓ નીચે મુજબનું કાયર પણ કરશે:

- તેમની સાથે તમારા તબીબી ઇતિહાસની સમીક્ષા કરો.
- પૂછો કે શું તમને ભૂતકાળમાં એનેસ્થેસિયાથી કોઈ સમસ્યા આવી છે. આમાં

ઉબકા (તમને ઉલટી થાય છે તેવું લાગવું) અથવા પીડાનો સમાવેશ થાય છે.


- તમારા ઓપરેશન દરમિયાન તમારી અનુકૂળતા અને સલામતી વિશે તમારી સાથે વાત કરશો.
- તમને ક્યા પર્કારનું એનેસ્થેસિયા આપવામાં આવશે તે વિશે તમારી સાથે વાત કરશો.
- એનેસ્થેસિયા વિશેના તમારા પરશ્નોના જવાબ આપશો.

### ઓપરેશન રૂમની અંદર

એકવાર તમે ઓપરેશન રૂમમાં આવો તે પછી, તમારા આરોગ્યસંભાળ પરદાતા સજર્રીના ભાગમાં એનેસ્થેસિયાનું ઇન્જેક્શન (તમને શોટ આપશો) આપશો. લોકલ એનેસ્થેસિયા એ તમારા શરીરના એક ભાગને સુન્ન કરવા માટેની દવા છે. તમારા આરોગ્યસંભાળ પરદાતા તમારી ગરદન અને છાતીમાં એનેસ્થેસિયાનું ઇન્જેક્શન આપશો.

તમારું પોટર મૂકવા માટે તમારે જનરલ એનેસ્થેસિયાની પણ જરૂર પડી શકે છે. જનરલ એનેસ્થેસિયા એ તમારી પર્કિર્યા દરમિયાન તમને બેભાન કરવા માટેની દવા છે.

તમારા ડોક્ટર તમારી ગરદનના નીચેના ભાગ પર એક નાનો ચીરો (સજિર્કલ કટ) કરશે (આકૃતિ 5 જુઓ). તે લગભગ 1 થી 1.5 ઇંચ (2.5 થી 4 સેન્ટિમીટર) લાંબો હશે. તેઓ તમારી છાતી પર, તમારા કોલરબોન નીચે લગભગ 0.5 ઇંચ (1 સેન્ટિમીટર) લાંબો બીજો નાનો ચીરો કરશો. પછી, તેઓ તમારી ત્વચા હેઠળ એક ખાડો બનાવશો. આ તમારા પોટરને તે સ્થાને રાખશો.



આકૃતિ 5. પોટર્ પ્લેસમેન્ટ માટે ચીરાનું સ્થાન

તમારા આરોગ્યસંભાળ પરદાતા બીજા ચીરામાં કેથેટર મૂકશે અને તેને તમારી નસ સાથે જોડશે.

તમારી સંભાળ ટીમ તમારા ચીરા બંધ કરવા માટે સ્થુયર (ટાંકા) અથવા ડમાર્બોન્ડ® નામના સજીરકલ ગુંદરનો ઉપયોગ કરશે. જો તમને ટાંકા આવ્યા છે, તો તે તમારા શરીરમાં સમાઈ જશે. તમારે તેને દૂર કરવાની જરૂર રહેશે નહીં. તેઓ Steri-StripSTMનો પણ ઉપયોગ કરી શકે છે. આ સજીરકલ ટેપની ટૂંકી, પાતળી પટ્ટીઓ છે જે નિયમિત પટ્ટી કરતાં વધુ મજબૂત હોય છે.

તમારી પર્કિન્યા લગભગ 1 કલાક લેવી જોઈએ.

## તમારા પોટર્ પ્લેસમેન્ટ ઓપરેશન પછી તમારે શું કરવું

### પોસ્ટ-એનેસ્થેસિયા કેર યુનિટ (પીએસીયુ)માં

જ્યારે તમે તમારા ઓપરેશન પછી જાગશો ત્યારે તમે પીએસીયુમાં હશો. નસર્ તમારા શરીરનું તાપમાન, ધબકારા, બ્લડ પરેશાર અને ઓક્સિજનના સ્તરનું નિરીક્ષણ કરશે. તમે તમારા નાકની નીચેની નળી અથવા તમારા નાક અને મોં પરના માસ્ક વડે ઓક્સિજન મેળવી શકો છો. તમારા પગના તથિયે કુમ્પરેશન બૂટ (સંકોચન બૂટ) પણ હુશે.

જો તમને દુખાવો થતો હોય તો તમારી નસરને જણાવો. તેઓ તમને તમારી પીડા માટે દવા આપી શકે છે.

તમારી નસરને પૂછો કે તમે PACU માં કેટલો સમય રહેવાની અપેક્ષા રાખી શકે છે. તમારી સંભાળ ટીમ તમને જણાવશે કે ક્યારે ઘરે જવું સલામત છે. તમારી સાથે જવા માટે તમારે એક જવાબદાર સંભાળ રાખનાર સાથીની જરૂર પડશે.

તમારા હોસ્પિટલ છોડતા પહેલા તમારી નસર તમારી IV કાઢી લેશો. તેઓ સમજાવશે કે ડ્રેસિંગ કેવી રીતે બદલવું અને ઘરે તમારી સંભાળ કેવી રીતે રાખવી.

## તમારી સજર્રી કરેલા ભાગની સંભાળ કેવી રીતે રાખવી

તમારી છાતી પરના નાના ચીરાને ઢાંકતી પટ્ટી હશે. તમે તમારા ઓપરેશનના 48 કલાક (2 દિવસ) પછી આ પટ્ટી કાઢી શકો છો.

તમારી ચીરાની જગ્યાઓ પર અને જ્યાં તમારી ત્વચાની નીચે કેથેટર રાખવામાં આવ્યું હતું ત્યાં તમને પીડા અથવા દુખાવો થઈ શકે છે. આ 1 થી 2 દિવસમાં સારું થઈ જશે. જો તમને એની જરૂર લાગે તો તમે કાઉન્ટર પર મળતી દુઃખાવાની દવા (એવી દવા જે પિરસિક્રપ્શન વગર મળે છે) લઈ શકો છો. તમે કેટલાક ઉઝરડા પણ જોઈ શકો છો.

સીટબેલ્ટ પહેરવાથી તમારા કાપા પર દબાણ આવી શકે છે. આમાં મદદ થાય એ માટે તમે તમારા શરીર અને પટ્ટાની વચ્ચે નાનકડો તકિયો કે વાળેલો ટુવાલ મૂકી શકો છો.

## ચીરો ટાંકા વડે બંધ કરેલો છે

જો તમારા કાપાને ટાંકા વડે બંધ કરવામાં આવ્યા છે:

- તમારી પાસે તમારા કાપાને ઢાંકતા 2 નાના પાટા હશે.
- 48 કલાક માટે અથવા તમારા હેલ્થકેર પર્દાતા તમને કહે ત્યાં સુધી તમારી પટ્ટીઓ તેની જગ્યાએ રહેવા દો.

- તમારી પટ્ટીઓ ભીની ન કરો. તમારા પાટા જ્યારે દૂર કરવામાં આવે પછી તમે સ્નાન કરી શકશો.

ચીરો ડમાર્બોન્ડ સાથે બંધ કરેલો છે  
જો તમારા કાપાને ટાંકા વડે બંધ કરવામાં આવ્યા છે:

- કાપાને ઢાંકવા ટેપનો એક નાનકડો ટૂકડો અથવા પાટો તમારી પાસે હોઈ શકે છે.
- લોશન અથવા ટેપ અથવા પટ્ટીની ટોચ પર ચીકાશ યુક્ત કંઈપણ લગાવશો નહીં.
- ડમાર્બોન્ડને અડશો કે ખંજવાળશો નહીં. લગભગ 7 થી 10 દિવસ પછી તે પોતાની મેળે બંધ થઈ જશે.
- તમારી સંભાળ ટીમ તમને તમારા ચીરા સાજા ન થાય ત્યાં સુધી સલામત રીતે સ્નાન કેવી રીતે કરવું તેની સૂચનાઓ આપશો.

તમારા પોટર્ડ ઉપરની ત્વચાને કોઈ ખાસ કાળજીની જરૂર નથી. તમે તેને સામાન્યની જેમ જ ધોઈ શકો છો. તમે તેને સામાન્ય રીતે પલાળી શકો છો.

જો તમારી સંભાળ ટીમે Steri-Strips(સ્ટીરી-સ્ટ્રીપ્સ)નો ઉપયોગ કરોર હોય, તો તે 7 થી 10 દિવસમાં પોતાની મેળે નીકળીને પડી જશે.

### સ્નાન કરવું અને શાવર લેવો

- તમારા ઓપરેશન પછીના પર્થમ 24 કલાક માટે, તમારી પટ્ટીને સૂકી રાખો. જ્યાં સુધી તમારી પટ્ટી ભીની ન થાય ત્યાં સુધી તમે સ્પોન્જ બાથ(કપડાંથી શરીરને લૂછવું) લઈ શકો છો.
- તમારા ઓપરેશનના 48 કલાક (2 દિવસ) પછી તમે શાવર લઈ શકો છો. પટ્ટીને બાથટબ અથવા પૂલમાં પલાળશો નહીં. તમે તમારા ઓપરેશનના 1 થી 2 અઠવાડિયા પછી સ્નાન કરવાનું શરૂ કરી શકો છો. તમારા ડોક્ટર તમને જણાવશે કે આ ક્યારે સલામત છે. જ્યાં સુધી તમારા પોટર્ડ સુધી પાણી ન પહોંચે ત્યાં સુધી તમે

બાથટબ અથવા પૂલમાં સંપૂર્ણરૂપણે પાણીની અંદર જઈ શકો છો.

- જો તમે ઘરે હોવ ત્યારે તમારા પોટરને એક્સેસ કરવામાં આવે તો:

- વોટરપૂર્ફ ડેસિંગ (જેમ કે Aquaguard®) વડે પોટર પર સપૂર્ણરૂપ ડેસિંગને ઢાંકી દો. તેનો ઉપયોગ કેવી રીતે કરવો તે માટે તમારી નસર તમને સૂચનાઓ આપી શકે છે.
- ચેપ સામે રક્ખણ આપવા માટે દરરોજ હિબિકલન્સ(Hibicleans) વડે સ્નાન કરો. આ સંસાધનના અંતે “એન્ટિસેપ્ટિક સિક્ન ક્લીઝર (જેમ કે હિબિકિલન્સ) સાથે સ્નાન કરવું” વિભાગમાંના સૂચનોને અનુસરો.
- ધોતી વખતે, પોટરના ભાગની આસપાસ તમારી ત્વચાને સૌમ્ય રીતે ધૂઓ. તમે સાબુથી હળવા હાથે ધોઈ શકો છો, પરંતુ વોશક્લોથ અથવા બર્શનો ઉપયોગ કરશો નહીં. તમારી ત્વચાને સારી રીતે ધોઈ લો અને તેને મુલાયમ ટુવાલ વડે કોરું કરો.
- તમે તમારા ઓપરેશનના 2 અઠવાડિયા પછી સ્નાન અને શાવર દરમિયાન વોશક્લોથનો ઉપયોગ કરવાનું શરૂ કરી શકો છો. જ્યાં સુધી તે ભાગ સંપૂર્ણરૂપણે સાજો ન થાય ત્યાં સુધી તેને સ્ક્રેબ કરવાનું ટાળો. આ સામાન્ય રીતે તમારા ઓપરેશનના લગભગ 6 અઠવાડિયા પછી થાય છે.

### તમારા ઓપરેશન પછી શારીરિક પરવૃત્તિત

તમારા આરોગ્ય સંભાળ પરદાતા તમને તમારા ચીરામાં રૂઝ આવતી હોય ત્યારે તમે કઈ કસરતો કરવી અને હુલનચલન કરવું તે અંગે સૂચનાઓ આપશો. કોઈપણ કસરત શરૂ કરતા પહેલાં તમારા આરોગ્યસંભાળ પરદાતા સાથે વાતચીત કરો, જેમ કે:


- દોડવું.
- સ્ટેચિંગ.
- 10 પાઉન્ડ (4.5 કિલોગ્રામ) થી વધુ વજન ઉપાડવું.

- ફૂટબોલ જેવી રમતો રમવી.

## તમારા ઇમ્પ્લાન્ટે કરેલ પોટરને એક્સેસ કરવો

જ્યારે તમને IV પર્વાહી અથવા દવાની જરૂર હોય ત્યારે તમારા આરોગ્ય સંભાળ પરદાતા તમારા પોટરને એક્સેસ કરશો. તેઓ એક્સેસ પોઇન્ટ દ્વારા સોચ મૂકીને આમ કરશો (આકૃતિ 6 જુઓ). પર્વાહી અથવા દવા તમારા પોટરમાંથી કેથેટર દ્વારા અને તમારા લોહીમાં ભળી જશો.

ફક્ત પોટર સંભાળ માટે પરશિક્ષિત આરોગ્યસંભાળ પરદાતાઓએ તમારા પોટરને એક્સેસ કરવું જોઈએ.




આકૃતિ 6. તમારા પોટરને એક્સેસ કરવો

તમારી સંભાળ ટીમને તમારા પોટર જે દિવસે તે મૂકવામાં આવે તે દિવસે તેને એક્સેસ કરવાની જરૂર પડી શકે છે. જો તેઓ આમ કરશો, તો જ્યારે તમારું પોટર મૂકવામાં આવશે ત્યારે તેઓ સેપ્ટમમાં એક્સેસ સોચ દાખલ કરશો.

જ્યારે તમારું પોટર એક્સેસ કરવામાં આવે ત્યારે સોચ અને પોટરને ખાસ પટ્ટી (ડ્રેસિંગ) દ્વારા આવરી લેવામાં આવશે (આકૃતિ 7 જુઓ). ડ્રેસિંગ સોચને સ્થાન પર

રાખવામાં મદ્દ કરશે. સૌથી ઉપરના ચીરા પર એક નાની પટ્ટી પણ હોઈ શકે છે.  
જ્યારે તેનો ઉપયોગ થતો ન હોય ત્યારે તમારે તમારા પોટર્ પર પટ્ટીની જરૂર નથી.



આકૃતિ 7. તમારા પોટર્ પર  
ડ્રેસિંગ કરવું

### તમારા ઇમ્પ્લાન્ટેડ પોટરને પાણીથી સાફ કરવો

જ્યારે તેનો ઉપયોગ કરવામાં આવે ત્યારે તમારું પોટર્ તેની જાતે જ સાફ થાય છે.  
જ્યારે તેનો વપરાશ ન હોય, ત્યારે તમારે પોટરને ઓછામાં ઓછા દર ૧૨ અઠવાડિયે  
ફુલશ કરવાની જરૂર પડશે. તમારી એપોઇન્ટમેન્ટ ક્યારે છે તેનાં આધારે, નસ્ર તમારા  
પોટરને વધારે વાર ફુલશ કરી શકે છે. આવું કરવા માટે, તેઓ તમારા પોટરમાં સોય  
ભરાવશે. તેઓ તમારા કેથેટરમાં સ્લાઇન (જંતુરહિત મીઠું પાણી) દાખલ કરશે. કેથેટર  
અવરોધિત ન થાય તેની ખાતરી કરવા માટે આમ કરવામાં આવે છે. જો તમારું કેથેટર  
અવરોધિત હોય તો તે કામ કરશે નહીં. જો આવું થાય, તો તમારે તમારા પોટરને દૂર  
કરવાની જરૂર પડી શકે છે.

### તમારા પોટરને દૂર કરી રહ્યાં છીએ

જ્યારે તમને તેની જરૂર ન હોય, અથવા જો તે ચેપ લાગે ત્યારે તમારા  
આરોગ્યસંભાળ પરદાતા તમારા પોટરને દૂર કરી શકે છે. તમારા પોટરને દૂર કરવા વિશે

વધુ માહિતી માટે તમારા આરોગ્યસંભાળ પરદાતા સાથે વાત કરો.

## તમારા આરોગ્યસંભાળ પરદાતાને ક્યારે કોલ કરવો

- જો તમને તમારા પોટરની જગ્યા પર નવો દુખાવો અથવા દુખાવામાં વધારો થયો હોય.
- જો તમને તમારા પોટરની જગ્યા પર સોજો આવે છે અથવા ઊરડા વધી રહ્યા છે.
- જો તમને તમારા ચીરા(અંગ)માંથી પરુ અથવા પર્વાહી આવતું હોય.
- જો તમે જોશો કે તમારો ચીરો ગરમ, કોમળ, લાલ, બળતરા અથવા ખુલ્લો છે.
- જો તમને  $100.4^{\circ}\text{F}$  ( $38^{\circ}\text{C}$ ) કે તેથી વધારે તાવ હોય
- જો તમને શરદી થાય છે.

### સંપકર્ણી માહિતી

જો તમને કોઈ પરશુનો હોય, તો તમારી સંભાળ ટીમના સભ્યનો સીધો સંપકર કરો. જો તમે MSK ખાતે દદીર છો અને તમારે સપ્તાહના અંતે અથવા રજાના દિવસે સાંજે 5 વાગ્યા પછી પરદાતાનો સંપકર કરવાની જરૂર હોય, તો 212-639-2000 પર કોલ કરો. કોલ પર ઇન્ટરવેન્શનલ રેડિયોલોજિસ્ટ માટે પૂછો.

## એન્ટિસેપ્ટિક સિકન ક્લીઝર (જેમ કે હિબિક્લન્સ) સાથે સ્નાન કરવું

4% સીએચજી સોલ્યુશન એન્ટિસેપ્ટિક સિકન ક્લીઝર (જેમ કે હિબિક્લન્સ) સાથે સ્નાન કરવા માટે આ સૂચનાઓને અનુસરો. એન્ટિસેપ્ટિક સૂક્ષ્મજંતુઓને મારી નાખે છે જે રોગનું કારણ બની શકે છે.

1. તમારા વાળને તમે વાપરો છો તે નિયમિત શેમ્પૂ અને કન્ફિશનરથી ધોઈ લો. તમારા

માથાને સારી રીતે ધોઈ લો.

2. તમારા ચહેરા અને જનનાંગો (જાંઘ)ના વિસ્તારને તમે વાપરો છો તેવા નિયમિત સાબુથી ધોવો. નવશેકા પાણીથી તમારા શરીરને સારી રીતે સાફ કરો.
3. 4% સીએચજી (CHG) દર્શાવણાની બોટલ ખોલો. તમારા હાથમાં અથવા સ્વચ્છ કપડામાં થોડુંક દર્શાવણ રેડો.
4. બાથરૂમમાંથી બહાર નીકળો. 4% સીએચજી (CHG) દર્શાવણને ગરદનથી પગ સુધી તમારા શરીર પર હળવેથી મસાજ કરો. તેને તમારા ચહેરા અથવા જનનાંગોના વિસ્તાર પર લગાવશો નહીં.
5. 4% સીએચજી (CHG) દર્શાવણને ધોવા માટે બાથરૂમમાં પાછા જાઓ. ગરમ પાણીનો ઉપયોગ કરો.
6. તમારી જાતને સ્વચ્છ ટુવાલથી લુછો.

નાહ્યા પછી કોઈપણ લોશન, કરીમ, ડિઓડરન્ટ, મેકઅપ, પાવડર, પરફ્યુમ અથવા અત્યાર લગાવો નહીં.

વધુ રિસોસર્સ માટે, અમારી વચ્ચેઅલ લાઈબ્રેરી [www.mskcc.org/penn](http://www.mskcc.org/penn) મુલાકાત કરો

About Your Implanted Port - Last updated on July 1, 2024  
તમામ અધિકાર અને માલિકી હક મેમોરિયલ સ્લોન કેટરિંગ કેન્સર સેન્ટર દ્વારા આરક્ષિત છે