

חינוך למטופל ולמטפל

# כיצד להתכונן לבדיקת הקולונוסקופיה שלך בעזרת MiraLAX®

מידע זה יעזור לך להתכונן לבדיקת הקולונוסקופיה בעזרת פוליאתיילן גליקול (MiraLAX).

## אודות בדיקת הקולונוסקופיה

בדיקת קולונוסקופיה היא בדיקה המאפשרת לרופא לראות את המעי הגס שלך מבפנים. הרופא ישתמש במכשיר קולונוסקופ כדי להסתכל אל תוך המעי הגס. זוהי צינורית גמישה עם מצלמה בקצה. התמונות יופיעו על מסך וידאו.

בזמן ההליך, הרופא עשוי:

- לקחת דגימה קטנה של רקמה (ביופסיה) לצורך בדיקה.
- להסיר פוליפ (גידול רקמות).
- לצלם את פנים המעי הגס שלך.

לצורך ההליך, המעי הגס צריך להיות ריק מתוכן. ייתכן שהרופא לא יוכל לראות פוליפים או בעיות אחרות אם ישנה צואה בתוך המעי הגס. במקרה זה, ייתכן שיהיה צורך בביצוע ההליך שוב.

יש להקפיד לבצע את ההוראות הבאות. אם עולות שאלות, ניתן לפנות למשרד הרופא.

## שבוע אחד לפני בדיקת הקולונוסקופיה

### שאל/י לגבי התרופות שלך

ייתכן שיהיה עליך להפסיק ליטול חלק מהתרופות הרגילות שלך לפני ביצוע ההליך הרפואי. שוחחי עם הרופא בנוגע לתרופות שאותן בטוח עבורך להפסיק ליטול.

מצורפות להלן מספר דוגמאות לתרופות, אך ישנן דוגמאות נוספות רבות. עליך לוודא כי צוות הטיפול שלך מכיר את כל התרופות שאת/ה נוטל/ת, במרשם וללא מרשם. תרופת מרשם הינה תרופה שניתן להשיג אך ורק עם מרשם מספק שירותי רפואה. תרופה ללא מרשם הינה תרופה



חשוב מאוד ליטול תרופות בדרך הנכונה בימים שלפני ביצוע ההליך הרפואי. במידה שהתרופות לא יינטלו על פי ההוראות, ייתכן שנצטרך לתאם מחדש את מועד ההליך הרפואי.

## תרופות נוגדות קרישה (מדללי דם)

מדללי דם הינם תרופות המשפיעות על הדרך שבה הדם נקרש. במקרה של נטילת מדללי דם, למשל לצורך טיפול בקרישי דם או למניעת התקף לב או שבץ, יש לשאול את הרופא שרשם את התרופות מתי יש להפסיק ליטול אותן.

ריכזנו עבורכם מספר דוגמאות למדללי דם נפוצים. קיימים גם סוגים אחרים, לכן חשוב לוודא שהצוות המטפל מכיר את כל התרופות שאת/ה נוטל/ת. אין להפסיק ליטול את מדללי הדם בלי לדון על כך עם חבר בצוות המטפל.

<ul style="list-style-type: none"><li>• מלוקסיקם - (Mobic - Meloxicam®)</li><li>• תרופות נוגדות דלקת לא סטרואידיות (NSAID) כגון איבופרופן (Advil®, Motrin®) או נפרוקסן (Aleve®)</li><li>• פנטוקסיפילין - (Trental - Pentoxifylline®)</li><li>• פרסוגרל - (Effient®)</li><li>• ריברוקסבן - (Xarelto®)</li><li>• סולפסלצין - (Azulfidine®, Sulfasalazine)</li><li>• סולפזין - (Sulfazine®)</li><li>• טיקגלור - (Brilinta - Ticagrelor®)</li><li>• טינזפרין - (Innohep®)</li><li>• ואפארין - (Jantoven®, Coumadin®)</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• אפיקסבן - (Eliquis®)</li><li>• אספירין</li><li>• סלקוקסיב - (Celebrex - Celecoxib®)</li><li>• צילוסטזול - (Pletal®)</li><li>• קלופידוגרל - (Plavix®)</li><li>• דביגרטן - (Pradaxa®)</li><li>• דלטפרין - (Fragmin®)</li><li>• דיפירידמול - (Persantine - Dipyridamole®)</li><li>• אדוקסבן - (Savaysa - Edoxaban®)</li><li>• אנוקספרין - (Lovenox®)</li><li>• פונדפרינוקס - (Arixtra - Fondaparinux®)</li><li>• זריקת הפארין</li></ul>
--	--

## תרופות לסוכרת

אם את/ה נוטל אינסולין או תרופות אחרות לסוכרת, ייתכן שתצטרך/י לשנות את המינון. שאל/י את הרופא שרושם לך את התרופות לסוכרת מה עליך לעשות בבוקר ההליך.

אין ליטול את התרופות הבאות ביום שבו מתבצע ההליך או ביום שלפניו:

- מטפורמין, כגון Glucophage® או Glumetza®.
- תרופות המכילות מטפורמין, כגון Janumet®.

## תרופות ממשפחת ה-GLP-1 לירידה במשקל

אם את/ה נוטל/ת תרופה ממשפחת ה-GLP-1 לירידה במשקל, חשוב לדווח על כך לרופא שלך. יהיה עליך לעקוב אחר הנחיות מיוחדות לשתיה ואכילה לפני ביצוע הניתוח או ההליך הרפואי. חשוב מאוד לעקוב אחר הנחיות אלה. אם לא תמלא/י אחר ההנחיות, הניתוח או ההליך הרפואי שלך עלולים להתעכב או להתבטל.

- יש להקפיד על תזונה של נוזלים צלולים ביום שלפני ביצוע הניתוח או ההליך הרפואי. אין לאכול מזון מוצק. קרא/י את [www.mskcc.org/cancer-care/patient-education/clear-liquid-diet](http://www.mskcc.org/cancer-care/patient-education/clear-liquid-diet) כדי לקבל מידע נוסף.

- יש להפסיק לשתות 8 שעות לפני מועד ההגעה. אין לאכול או לשתות דבר לאחר מועד זה, כולל נוזלים צלולים. ניתן ליטול תרופות עם לגימות קטנות של מים.

לקבלת מידע נוסף קרא/י את *Eating and Drinking Before Your Surgery or Procedure When Taking GLP-1 Medicines* ([www.mskcc.org/cancer-care/patient-education/eating-and-drinking-before-your-surgery-or-procedure-when-taking-glp-1-medicines](http://www.mskcc.org/cancer-care/patient-education/eating-and-drinking-before-your-surgery-or-procedure-when-taking-glp-1-medicines)).

להלן דוגמאות לתרופות ממשפחת GLP-1. קיימים גם סוגים אחרים, לכן חשוב לוודא שהצוות המטפל מכיר את כל התרופות שאת/ה נוטל/ת. חלק מהתרופות הללו נועדו לטיפול במחלת הסוכרת, אך לעיתים הן ניתנות רק לירידה במשקל.

<ul style="list-style-type: none"><li>• טירזפטיד (<sup>®</sup>Mounjaro, <sup>®</sup>Zepbound)</li><li>• לירגלוטיד (<sup>®</sup>Victoza, <sup>®</sup>Saxenda)</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• סמגלוטיד (<sup>®</sup>Ozempic, <sup>®</sup>Wegovy)</li><li>• (<sup>®</sup>Rybelsus)</li><li>• דולגלוטיד (<sup>®</sup>Trulicity)</li></ul>
--	---

## דאג/י לכך שמישהו יסיע אותך חזרה הביתה

עליך לדאוג ששותף אחראי לטיפול ייקח אותך הביתה לאחר ביצוע ההליך. שותף אחראי לטיפול הוא אדם שיכול לסייע לך להגיע הביתה בבטחה. על השותף האחראי לדווח על חששות או דאגות כלשהן לצוות המטפל. חשוב לתכנן זאת לפני יום ביצוע ההליך.

אם אין לך שותף אחראי לטיפול שייקח אותך הביתה, אנא התקשר/י לאחת מהסוכנויות שלהלן. הם ישלחו מישהו שייסע איתך הביתה. שירות זה כרוך בתשלום, ויהיה עליך לספק את אמצעי התחבורה. ניתן להשתמש במונית או בשירותי הסעות, אבל עדיין צריך שיהיה איתך שותף אחראי לטיפול.

## במידת הצורך, יש להציג מכתב מהרופא.

ייתכן שיהיה צורך בקבלת מכתב אישור טרם ביצוע ההליך. מכתב אישור הינו מכתב המעיד על יכולתך לעבור את ההליך בבטחה. על מכתב האישור להתקבל במשרד הרופא שלך בבית החולים MSK לפחות יום אחד לפני ביצוע ההליך.

## דפיברילטור אוטומטי מושתל (AICD)

יש ליידע את הרופא שלך בבית החולים MSK על קיומו של דפיברילטור אוטומטי מושתל. במקרה זה, יש להצטייד במכתב אישור מהקרדילוג (רופא הלב) שלך.

## תסמינים אחרים

במידה וחווית אחד מהתסמינים הבאים במהלך 6 השבועות האחרונים, יש להביא מכתב אישור מהרופא שלך:

- כאבים בחזה.
- קשיי נשימה שהופיעו או החמירו לאחרונה.
- התעלפות.

## רכישת הציוד הנחוץ

יש צורך לרכוש את הציוד הבא עבור הכנת המעיים. הכנת המעיים נקראת בקיצור גם bowel prep.

- 4 טבליות (5 מ"ג) של *(Dulcolax) bisacodyl* (®). טבליות אלה נמכרות בדרך כלל בחפיסות של 10 יחידות.
- בקבוק אחד (238 גרם) של פוליאיתילן גליקול (*MiraLAX*) (®).
- 2 ליטרים (64 אונקיות) של נוזלים צלולים שאינם בצבע אדום, סגול או כתום. הנוזל ישמש לערבוב עם ה-*MiraLAX*. יש לשמור אותו בטמפרטורת החדר.
  - משקה ספורט כגון *Gatorade* (®) או *Powerade* (®) עשוי להיות בחירה טובה. משקאות ספורט יעזרו בהחלפת האלקטרוליטים שתאבד/י במהלך הכנת המעיים.
  - אם יש לך סוכרת, יש לוודא שהמשקה הצלול אינו מכיל סוכר.

## יש לרכוש ציוד נוסף במידת הצורך

אם התשובה על אחת מהשאלות הבאות היא חיובית, ייתכן שיהיה צורך לקנות ציוד נוסף:

- האם יש לך נטייה לעצירות (קושי במתן צואה) או פחות משלוש יציאות בשבוע?
- האם את/ה נוטל/ת תרופות נרקוטיות (אופיואידים)? אם יש לך ספק, יש לשאול את הרופא שלך. תרופות אופיואידיות כוללות:
  - פנטניל (®Subsys, ®Duragesic)
  - מורפיום (®Duramorph, ®DepoDur)
  - הידרוקודון (®Vicodin)
  - אוקסיקודון (®Percocet, ®Oxycontin)
- האם עברת בדיקת קולונוסקופיה ללא הכנה מתאימה (צואה במעי הגס) בעבר?

אם ענית "כן" על אחת מהשאלות הללו, יש לקנות כמות גדולה יותר של MiraLAX. ניתן לקנות קופסה של 10 חבילות (17 גרם) או בקבוק אחד (119 גרם) של אבקה.

בנוסף, יש לקנות כמות גדולה יותר של נוזלים לצורך תזונת נוזלים מלאה. לדוגמאות של משקאות מותרים לשתייה, יש לקרוא את הסעיף "יומיים לפני בדיקת הקולונוסקופיה".

## 5 ימים לפני ההליך

### הפסק/י ליטול תוספי ברזל

אם את/ה נוטל/ת תוסף ברזל, יש להפסיק ליטול אותו 5 ימים לפני ביצוע ההליך. תוספי ברזל יכולים לגרום לשינויים בצבע הצואה שלך. זה יכול להקשות על הרופא לראות את המעי הגס שלך בצורה ברורה.

# 3 ימים לפני בדיקת הקולונוסקופיה

## הקפדה על תזונה דלת סיבים

יש להקפיד על תזונה דלת סיבים החל משלושה ימים לפני בדיקת הקולונוסקופיה. במהלך שלושת הימים הללו, אין לאכול את הדברים הבאים:

- פירות וירקות נאים (לא מבושלים).
- גרעיני תירס שלמים, כולל תירס משומר.
- דגנים מלאים (כגון שיבולת שועל, אורז חום, קינואה או לחם חיטה).
- זרעים (כגון פרג או שומשום).
- אגוזים.

## שיחה עם אחות אנדוסקופיה

מספר ימים לפני ביצוע ההליך, אחות האנדוסקופיה תתקשר אליך. היא תעבור אתך על ההוראות במדריך זה, ותשאל אותך שאלות לגבי ההיסטוריה הרפואית שלך.

האחות גם תבדוק אילו תרופות את/נוטל/ת, ותאמר לך אילו תרופות יש ליטול בבוקר ההליך.

יש לרשום את התרופות בשורה הריקה למטה.

---

---

---

# יומיים לפני בדיקת הקולונוסקופיה

יש להמשיך להקפיד על תזונה דלת סיבים, למעט במקרים הבאים:

- עצירות לעתים תכופות.
- נטילת תרופות נרקוטיות.
- בדיקת קולונוסקופיה בעבר ללא הכנה נאותה.

אם אחד מהמצבים הללו חל במקרה שלך, יש להפסיק את התזונה דלת הסיבים ולפעול לפי ההנחיות הבאות:

- יש ליטול מנה אחת (17 גרם) של MiraLAX, 3 פעמים ביום. יש לערבב מנה אחת עם 240 מ"ל (8 אונקיות) של נוזל בכל פעם. אפשר ליטול מנה אחת בארוחת הבוקר, בארוחת הצהריים ובארוחת הערב.
- יש להקפיד על דיאטת נוזלים מלאה. בדיאטת נוזלים מלאה מותר לאכול ולשתות את הבאים:
  - יוגורט (ללא חתיכות פרי).
  - מיץ פירות ללא ציפה (חתיכות פרי).
  - סודה.
  - מרקים צחים או מרקים קרמיים שסוננו כך שאינם מכילים חתיכות ירק.
  - תוספי תזונה.
  - גלידה וקרחוני פירות. אסור שאלה יכילו חתיכות פרי, אגוזים, פאדג' או חמאת בוטנים.

## יום אחד לפני בדיקת הקולונוסקופיה

### הכנת תערובת MiraLAX

בבוקר היום שלפני ההליך, יש לערבב את כל 238 הגרם של אבקת MiraLAX עם 2 ליטרים (64 אונקיות) של נוזל צלול בטמפרטורת החדר עד שאבקת MiraLAX תתמוסס לחלוטין.

לאחר שאבקת ה-MiraLAX מתמוססת, ניתן להכניס את התערובת למקרר. אפשרות זו הינה אופציונלית.

אין להכין את תערובת ה-MiraLAX מוקדם יותר מהבוקר של היום שלפני ההליך.

## מעקב אחר תזונה של נוזלים צלולים

ביום שלפני ביצוע ההליך, יש להקפיד על תזונה של נוזלים צלולים. תזונה של נוזלים צלולים כוללת רק נוזלים שקופים שניתן לראות דרכם. דוגמאות ניתן לראות בטבלה בסעיף "תזונה של נוזלים צלולים".

במהלך תזונה של נוזלים צלולים:

- אין לאכול מזון מוצק.
- אין לשתות נוזלים בצבע אדום, סגול או כתום.
- בשעות הערות, יש להשתדל לשתות כוס אחת (240 מ"ל/8 אונקיות) של נוזלים כל שעה.
- שתה סוגים שונים של נוזלים צלולים. אל תשתה רק מים, קפה או תה. זה עוזר להבטיח צריכה מספקת של קלוריות וזהו חלק חשוב מההכנה לבדיקת הקולונוסקופיה.
- אם יש לך סוכרת, עליך לשתות נוזלים צלולים שאינם מכילים סוכר ולבדוק את רמת הסוכר לעתים תכופות. אם יש לכם שאלות, שוחחו עם הרופא.

דיאטת נוזלים שקופים		
בסדר לשתות	אין לשתות	
<ul style="list-style-type: none"> <li>מרק צח, ציר מרק או קונסומה.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>כל דבר המכיל חתיכות של אוכל מיובש או תבלינים.</li> </ul>	מרקים
<ul style="list-style-type: none"> <li>ג'לטין, כגון Jell-O®.</li> <li>קרחונים בטעמים.</li> <li>סוכריות קשות, כגון סוכריות לימון או Life Savers®.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>כל דבר בצבע אדום, סגול או כתום.</li> <li>דברי מתיקה.</li> </ul>	דברי מתיקה
<ul style="list-style-type: none"> <li>מיצי פירות צלולים, כגון לימונדה, תפוחים, חמוציות לבנות ומיצי ענבים לבנים.</li> <li>משקאות מוגזים, כגון ג'ינג'ר אייל, 7UP®, ספרייט® ומי סודה.</li> <li>משקאות ספורט, כגון Gatorade®, Powerade®-1.</li> <li>קפה ללא חלב או שמנת.</li> <li>תה ללא חלב או שמנת.</li> <li>מים, כולל מים מוגזים ומים בטעמים.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>כל דבר בצבע אדום, סגול או כתום. זה כולל מיצים, משקאות מוגזים ומשקאות ספורט שצבעם אדום, סגול וכתום.</li> <li>מיצים עם חתיכות פרי.</li> <li>נקטרים.</li> <li>סמודיס או שייקים.</li> <li>חלב, שמנת ומוצרי חלב אחרים.</li> <li>משקאות חלב אגוזים, משקאות חלב צמחי, מלביני קפה לא חלביים ותחליפי חלב אחרים.</li> <li>משקאות המכילים אלכוהול.</li> </ul>	משקאות

## שים לב למועד ביצוע ההליך הרפואי

איש צוות ממשרד הקבלה יתקשר אליך אחר הצהריים (12:00 בצהריים) ביום שלפני ביצוע ההליך. אם ההליך מתוכנן ליום שני, יתקשרו אליך ביום שישי שקודם לו.

איש הצוות יאמר לך באיזו שעה עליך להגיע לבית החולים לצורך ביצוע ההליך. הוא גם יזכיר לך לאן עליך לפנות. אם לא קיבלת שיחה, יש להתקשר למשרד הרופא שלך.

אם תצטרך/י לבטל את ההליך מכל סיבה שהיא, התקשר/י למשרד לזימון תורים לגסטרואנטרולוגיה (GI) בטלפון 212-639-5020.

## התחלת הכנת המעיים

שלב 1: בשעה 16:00 ביום שלפני ביצוע ההליך, יש לבלוע 2 טבליות (5 מ"ג) של ביסאקודיל עם כוס מים.

שלב 2: בשעה 16:15, יש לשתות את תערובת ה-MiraLAX.

1. בשעה 16:15, יש לשתות כוס אחת (240 מ"ל/8 אונקיות) של התערובת.

2. בשעה 16:30, יש לשתות כוס אחת (240 מ"ל/8 אונקיות) של התערובת.
  3. בשעה 16:45, יש לשתות כוס אחת (240 מ"ל/8 אונקיות) של התערובת.
  4. בשעה 17:00, יש לשתות כוס אחת (240 מ"ל/8 אונקיות) של התערובת.
- יש לשתות 4 כוסות של התערובת בסך הכל.

- בסיום, תישאר לך חצי מכמות תערובת ה-MiraLAX. השעה שבה יש לשתות את החצי השני של תערובת ה-MiraLAX תלוי בזמן ההגעה שנקבע עבור ההליך. יש לעקוב אחר ההוראות בשלב 3.
- בדרך כלל, תוך שעה אחת לאחר שתיית המנה הראשונה מתחילות היציאות, אך זה עשוי להימשך זמן רב יותר עבור אנשים מסוימים.
  - אין צורך לדאוג אם אין לך יציאות לאחר שתיית המחצית הראשונה של תערובת ה-MiraLAX. יש להמשיך לשתות נוזלים צלולים ולהתחיל עם החצי השני של תערובת ה-MiraLAX על פי ההוראות.
- יש למרוח וזלין (Vaseline®) או משחת A&D® על העור סביב פי הטבעת לאחר כל יציאת מעיים. פעולה זו תסייע במניעת גירויים.
- יש להמשיך לשתות נוזלים צלולים כדי למנוע התייבשות ולרוקן את המעי הגס.

שלב 3 (אם התבקשת להגיע להליך לפני 11:00 בבוקר):

אם התבקשת להגיע להליך לפני השעה 11:00, יש לפעול לפי ההנחיות הבאות בלילה שלפני ההליך:

בשעה 23:00, יש לבלוע 2 טבליות ביסאקודיל עם כוס מים. לאחר מכן, יש להתחיל לשתות את החצי השני של תערובת ה-MiraLAX.

1. בשעה 23:15, יש לשתות כוס אחת (240 מ"ל/8 אונקיות) של התערובת.
  2. בשעה 23:30, יש לשתות כוס אחת (240 מ"ל/8 אונקיות) של התערובת.
  3. בשעה 23:45, יש לשתות כוס אחת (240 מ"ל/8 אונקיות) של התערובת.
  4. בשעה 00:00 (חצות), יש לשתות כוס אחת (240 מ"ל/8 אונקיות) של התערובת.
- יש להקפיד לשתות את כל תערובת ה-MiraLAX.

- מותר להמשיך לשתות נוזלים צלולים עד 4 שעות לפני זמן ההגעה המתוכנן.
- אין לאכול דבר עד לאחר ההליך.

## ביום של בדיקת הקולונוסקופיה

שלב 3 (אם התבקשת להגיע להליך בשעה 11:00 בבוקר או מאוחר יותר):

אם התבקשת להגיע להליך בשעה 11:00 בבוקר או מאוחר יותר, יש לפעול לפי ההנחיות הבאות בבוקר של הבדיקה:

בשעה 06:00, יש לבלוע 2 טבליות ביסאקודיל עם כוס מים. לאחר מכן, יש להתחיל לשתות את החצי השני של תערובת ה-MiraLAX.

1. בשעה 06:15, יש לשתות כוס אחת (240 מ"ל/8 אונקיות) של התערובת.
2. בשעה 06:30, יש לשתות כוס אחת (240 מ"ל/8 אונקיות) של התערובת.
3. בשעה 06:45, יש לשתות כוס אחת (240 מ"ל/8 אונקיות) של התערובת.
4. בשעה 07:00, יש לשתות כוס אחת (240 מ"ל/8 אונקיות) של התערובת.

יש להקפיד לשתות את כל תערובת ה-MiraLAX.

- מותר להמשיך לשתות נוזלים צלולים עד 4 שעות לפני זמן ההגעה המתוכנן.
- אין לאכול דבר עד לאחר ההליך.

## פרטים שחשוב לזכור

- יש ליטול אך ורק את התרופות שהורו לך ליטול בבוקר של ההליך. יש ליטול אותן עם מספר לגימות של מים.
- אין למרוח תחליב, קרם, או טלק על החזה והזרועות.
- יש להסיר את כל התכשיטים, כולל פירסינג בגוף.
- יש להשאיר את כל חפצי הערך, כגון כרטיסי אשראי ותכשיטים, בבית. אין לנו ארוניות לאחסון חפצי ערך.
- אם את/ה משתמש/ת בעדשות מגע, יש להרכיב משקפיים במקומן.

## מה להביא

- כרטיס הארנק שלך, אם יש לך AICD והכרטיס שלך עדיין לא רשום בבית החולים.
- משאף (כגון אלבוטרול לאסטמה), אם יש.
- נרתיק למשקפיים או לשיניים התותבות שלך, אם יש.
- טופס ייפוי כוח רפואי, במידה ומילאת טופס כזה.

## לאן ללכת

ההליך שלך יתבצע באחד מהמיקומים הבאים:

- מחלקת אנדוסקופיה ב-Memorial Hospital (בית החולים הראשי של MSK)  
שדרת יורק 1275 (בין הרחובות 67 מזרח ו-68 מזרח)  
ניו יורק, ניו יורק, 10065  
יש לקחת את מעלית B לקומה 2. יש לפנות ימינה ולהיכנס דרך דלתות הזכוכית אל מרכז הכירורגיה וההליכים הרפואיים.

David H. Koch Center □

רחוב 74 מזרח 530

ניו יורק, ניו יורק

קומה 8 במעלית.

MSK Monmouth □

דרך רד היל 480

מידלטאון, ניו-ג'רזי 07748

למידע על חנייה במיקומים אלו, בקרו בעמוד [www.msk.org/parking](http://www.msk.org/parking).

## למה לצפות

אנשי צוות רבים יבקשו ממך לומר ולאייט את שמך ואת תאריך הלידה שלך. זאת למען בטחונך. ייתכן שמטופלים בעלי אותו שם או שם דומה יעברו הליך באותו יום.

כשיגיע הזמן להחליף בגדים לקראת ההליך, תקבל/י כותונת, חלוק וגרביים נגד החלקה של בית החולים.

לפני ההליך, תהיה לך פגישה עם הרופא. הרופא יסביר לך את ההליך ויענה לכל שאלה שעשויה לעלות.

תהיה לך פגישה גם עם הרופא המרדים. הרופא המרדים יעבור אתך על ההיסטוריה הרפואית שלך וישוחח איתך על סוג ההרדמה (תרופה שתגרום לך לישון) שתקבל/י.

כשיגיע הזמן לבדיקת הקולונוסקופיה שלך, איש צוות ייקח אותך אל החדר בו יתבצע ההליך. את/ה תשכב/י על צד שמאל בברכיים מקופלות.

ספק שירותי הרפואה יחדיר לך עירווי תוך ורידי (IV), בדרך כלל בווריד ביד או בזרוע. הרופא המרדים ייתן לך דרך העירווי תרופת הרדמה שתגרום לך להירדם. ברגע שתירדם/י, הרופא יבצע את ההליך.

הרופא יחדיר קולונסקופ אל פי הטבעת. הקולונוסקופ מחובר למסך וידאו. זה מאפשר לרופא לראות את פנים המעי הגס שלך. הרופא ישתמש באוויר ובנוזלים כדי לנווט את הקולונוסקופ דרך המעי הגס, תוך כדי חיפוש אחר ממצאים חריגים על המסך.

ההליך בדרך כלל אורך פחות מ-60 דקות (שעה אחת).

# שאלות נפוצות

אני נוטל/ת את תערובת ההכנה ויש לי צואה רכה ומיימית עוד לפני שסיימתי אותה. האם עליי לשתות את יתר התערובת בכל זאת?

כן. יש לשתות את כל תערובת ההכנה כדי לנקות את המעי הגס ולהבטיח בדיקת קולונוסקופיה בטוחה ושלמה.

יש לי תחושה שאני עומד/ת להקיא (בחילה) או שהקאתי לאחר ששתיתי את תערובת ההכנה. מה עליי לעשות?

אנשים רבים עלולים לחוש בחילה בזמן שתיית התערובת להכנת המעיים. כדי לעזור בכך, נסה/י לערבב את אבקת ה-MiraLAX עם נוזלים צלולים שאת/ה אוהב/ת לשתות.

אם את/ה מרגיש/ה בחילה, יש לשתות לאט ולקחת הפסקות בין לגימות. זה אומר להפסיק לשתות את הנוזל למשך 30-45 דקות כדי לאפשר לבטן להתרוקן. אם את/ה מעדיף/ה לשתות את הנוזל קר, באפשרותך להחזיר את נוזל ההכנה למקרר בזמן ההפסקה. לאחר ההפסקה, נסה/י שוב לשתות את נוזל ההכנה לאט. אם יש לך קשית, השתמש/י בה.

אם בכל זאת הקאת, קח/י הפסקה של 30 עד 45 דקות. אם יש לך בבית תרופה נגד בחילות, אפשר לקחת מנה אחת לפני שמתחילים שוב את הכנת המעיים. כדי לשמור על רוויה, ניתן לשתות כל נוזל צלול לפי טעמך. חשוב לשתות את כל נוזל ההכנה כדי לנקות את המעי הגס ולהבטיח בדיקת קולונוסקופיה בטוחה ושלמה.

## לאחר בדיקת הקולונוסקופיה

האחות תמשיך לעקוב אחרי הדופק, הנשימה ולחץ הדם שלך. אנשים רבים מרגישים נפיחות או התכווצויות בקיבה לאחר בדיקת קולונוסקופיה. זוהי תופעה נורמלית שתיעלם עם הגזים שעוברים במערכת.

ברגע שתהיה/י ער/ה לחלוטין, האחות תסיר את העירווי. אם יש מישהו שמחכה איתך, האחות תסביר לשינכם את הוראות השחרור לפני שתלכו הביתה.

## בבית

- אפשר להתחיל לאכול מזון קל מיד לאחר השחרור. בהתחלה יש להימנע ממזון חריף, עתיר שומן ומטוגן. יש לחזור לתזונה הרגילה שלך בהדרגה. אם הרופא ירצה שתגביל את התזונה

שלך לתקופה מסוימת, הוא יגיד לך.

- אין לשתות שום דבר המכיל אלכוהול במשך 24 שעות לאחר ההליך.
- ניתן לחזור לפעילויות הרגילות שלך 24 שעות לאחר ההליך.

אם עברת ביופסיה, זה נורמלי שיופיע דימום קל מפי הטבעת. לא אמורות להיות יותר ממספר טיפות בודדות של דם. הדימום אמור להפסיק בתוך 24 שעות מתום ההליך.

זה נורמלי שהיציאות שלך יהיו לא סדירות או שונות מהרגיל לאחר בדיקת קולונוסקופיה. זה עשוי להימשך עד שבוע לאחר ההליך.

## מתי יש ליצור קשר עם הרופא המטפל

יש ליצור קשר עם הרופא המטפל במקרים הבאים:

- חום של  $38^{\circ}\text{C}$  מעלות ( $101^{\circ}\text{F}$  פרנהייט) ומעלה.
- כאב בטן או נפיחות חמורים.
- דימום מפי הטבעת שנמשך מעבר ל-24 שעות.
- דימום בין יציאות.
- חולשה, עילפון או בחילה.
- דימום כבד מפי הטבעת.

If you have questions or concerns, contact your healthcare provider. A member of your care team will answer Monday through Friday from 9 a.m. to 5 p.m. Outside those hours, you can leave a message or talk with another MSK provider. There is always a doctor or nurse on call. If you're not sure how to reach your healthcare provider, call 212-639-2000

למשאבים נוספים אנא בקר/י ב- [www.mskcc.org/pe](http://www.mskcc.org/pe) כדי לחפש בספריה הוירטואלית שלנו.

How To Prepare for Your Colonoscopy Using MiraLAX® - Last updated on June 9, 2025  
כל הזכויות בבעלות ושמורות ל-Memorial Sloan Kettering Cancer Center