



환자 및 간병인 교육

아스피린, 기타 비스테로이드성 항염증제(NSAID) 또는 비타민 E가 함유된 일반적인 의약품

이 정보는 아스피린, 기타 NSAID 또는 비타민 E가 함유된 약물을 식별하는 데 도움이 됩니다. 많은 암 치료에서 사전에 이러한 약물의 복용을 중단하는 것이 중요합니다. 이들은 혈소판(응고되어 출혈을 방지하는 혈액 세포)에 영향을 미치며 치료 중 출혈 위험을 증가시킬 수 있습니다.

다른 식이 보충제(예: 기타 비타민, 한방 치료)도 암 치료에 영향을 줄 수 있습니다. 자세한 내용은 [한방 치료와 암 치료 \(www.mskcc.org/ko/cancer-care/patient-education/herbal-remedies-and-treatment\)](http://www.mskcc.org/ko/cancer-care/patient-education/herbal-remedies-and-treatment)을 참조하십시오.

암 치료 전 지침

아스피린, 기타 NSAID 또는 비타민 E를 복용하는 경우 의료진에게 알려십시오. 의료진들이 복용을 중단해야 하는지 알려줄 것입니다. 치료 정보에서도 지침을 찾을 수 있습니다. 귀하의 약에 아스피린, 기타 NSAID 또는 비타민 E가 함유되어 있는지 알아보려면 “의약품 예시” 섹션을 읽으십시오.

수술 전

수술이나 외과적 절차를 받는 경우 이 지침을 따르십시오. 의료진이 다른 지침을 제공하는 경우 해당 지침을 따르십시오.

- 아스피린이나 아스피린이 포함된 약을 복용 중인 경우에는 수술 7일 전부터 복용량을 변경하거나 복용을 중단해야 할 수도 있습니다. 의료진의 지침을 따르십시오. 의료진이 지시하지 않는 한 아스피린 복용을 중단하지 마십시오.
- 비타민 E 또는 비타민 E가 함유된 보충제를 복용하는 경우 수술 7일 전까지 또는 의료진의 지시에 따라 복용을 중단하십시오.

- NSAID 또는 NSAID가 함유된 약물을 복용하는 경우 수술 48시간(2일) 전까지 또는 의
료진의 지시에 따라 복용을 중단하십시오.

방사선 절차 전

방사선 절차(중재방사선, 중재유방조영술, 유방 영상, 일반방사선 포함)를 받는 경우 이 지
침을 따르십시오. 의료진이 다른 지침을 제공하는 경우 해당 지침을 따르십시오.

- 아스피린이나 아스피린이 함유된 약을 복용 중인 경우에는 절차 5일 전부터 복용을 중
단해야 할 수도 있습니다. 의료진의 지침을 따르십시오. 의료진이 지시하지 않는 한 아
스피린 복용을 중단하지 마십시오.
- NSAID나 NSAID가 함유된 약을 복용 중인 경우에는 절차 24시간(1일) 전부터 복용을
중단해야 할 수도 있습니다. 의료진의 지침을 따르십시오.

화학 요법 전과 도중

화학 요법은 혈소판 수를 낮춰 출혈 위험을 높일 수 있습니다. 화학 요법을 막 시작했든 받
고 있든 관계없이 아스피린, 기타 NSAID 또는 비타민 E를 복용하기 전에 의료진과 상담하
십시오.

의약품 예시

의약품은 종종 브랜드명으로 불립니다. 그로 인해 성분명을 알기 어려울 수 있습니다. 아래
목록은 아스피린, 기타 NSAID 또는 비타민 E가 함유된 약물을 식별하는데 도움이 될 수
있습니다.

이 목록에는 가장 일반적인 제품이 포함되어 있지만 다른 제품도 있습니다. 의료진이 패치
와 크림을 포함하여 복용하고 계신 모든 처방약과 일반의약품(처방전 없이 구입할 수 있
는 약품)을 알고 있는지 항상 확인하십시오.

아스피린을 함유한 일반적인 의약품			
Aggrenox®	Cama® 관절염 진통제	Heartline®	Robaxisal® 정제
Alka Seltzer®	COPE®	Headrin®	Roxiprin®
Anacin®	Dasin®	Isollyl®	Saleto®
관절염 진통제	Easprin®	Lanorinal®	Salocol®
Arthritis Foundation	Ecotrin®(대부분의 제	Lortab® ASA 정제	Sodol®

Pain Reliever [®]	형)		
ASA Enseals [®]	Empirin [®] 아스피린(대부분의 제형)	Magnaprin [®]	Soma [®] 복합 정제
ASA Suppositories [®]	Epromate [®]	Marnal [®]	코데인을 함유한 Soma [®] 복합 정제
Ascriptin [®] 및 Ascriptin A/D [®]	Equagesic 정제	Micrainin [®]	St. Joseph [®] 성인용 츄어블 아스피린
Aspergum [®]	Equazine [®]	Momentum [®]	Supac [®]
Asprimox [®]	Excedrin [®] 고용량 진통 정제 및 당의정	Norgesic Forte [®] (대부분의 제형)	Synalgos [®] -DC 캡슐
Axotal [®]	Excedrin [®] 편두통제	Norwich [®] 아스피린	Tenol-Plus [®]
Azdone [®]	Fiorgen [®]	PAC [®] 진통 정제	Trigesic [®]
Bayer [®] (대부분의 제형)	Fiorinal [®] (대부분의 제형)	Orphengesic [®]	Talwin [®] 복합제
BC [®] 분말 및 감기약 제형	Fiortal [®]	Painaid [®]	Vanquish [®] 진통 당의정
Bufferin [®] (대부분의 제형)	Gelpirin [®]	Panasal [®]	Wesprin [®] 완충액
Buffets II [®]	Genprin [®]	Percodan [®] 정제	Zee-Seltzer [®]
Buffex [®]	Gensan [®]	Persistin [®]	ZORprin [®]

아스피린을 함유하지 않은 일반적인 NSAID 의약품

Advil [®]	Duexis [®]	메페남산	PediaCare Fever [®]
Advil Migraine [®]	Etodolac [®]	멜록시캄	피록시캄
Aleve [®]	Feldene [®]	Menadol [®]	Ponstel [®]
Anaprox DS [®]	페노프로펜	Midol [®]	Relafen [®]
Ansaid [®]	플루비프로펜	Mobic [®]	Saleto 200 [®]
Arthrotec [®]	Genpril [®]	Motrin [®]	설린닥
Bayer [®] 셀렉트 진통 당의정	이부프로펜	나부메톤	Toradol [®]
Celebrex [®]	인도메타신	Nalfon [®]	Treximet [®]

셀레콕시브	Indocin®	나프록센	Vicoprofen®
Children's Motrin®	케토프로펜	Naprosyn®	Vimovo®
Clinoril®	케톨락	Nuprin®	Voltaren®
Daypro®	Lodine®	Orudis®	
디클로페낙	메클로페나메이트	옥사프로진	

비타민 E를 함유한 제품			
Amino-Opt-E	아쿠아비트	E-400 IU	E 콤플렉스-600
아쿠아솔 E	D'알파 E	E-1000 IU 소프트겔	비타-플러스 E

대부분의 종합 비타민에는 비타민 E가 포함되어 있습니다. 종합 비타민제를 복용하는 경우 라벨을 확인하십시오.

아세트아미노펜 정보

아세트아미노펜(타이레놀®)은 일반적으로 암 치료 중에 복용해도 안전합니다. 혈소판에 영향을 미치지 않으므로 출혈 가능성이 증가하지 않습니다. 그러나 화학 요법을 받는 경우 아세트아미노펜을 복용하기 전에 의료진과 상담하십시오.

아세트아미노펜을 함유한 의약품			
Acephen®	Esgic®	Percocet®	Vanquish®
코데인을 함유한 Aceta®	Excedrin P.M.®	Primlev®	Vicodin®
코데인을 함유한 아세트아미노펜	Fiorcet®	Repan®	Wygesic®
아스피린 무함유 Anacin®	Lorcet®	Roxicet®	Xartemis XR®
Arthritis Pain Formula® 아스피린 무함유	Lortab®	Talacen®	Xodol®
Datril®	Naldegescic®	Tempra®	Zydone®
Di-Gesic®	Norco®	타이레놀®	
Endocet®	Panadol®	코데인 No. 3를 함유한	

모든 약의 라벨을 읽으십시오

아세트아미노펜은 지시대로 사용할 때 안전합니다. 하지만 하루에 섭취할 수 있는 양에는 제한이 있습니다. 이 성분은 많은 처방약과 일반의약품에 함유되어 있기 때문에 본인도 모르게 너무 많이 복용할 수 있습니다. 이 성분은 진통제, 해열제, 수면 보조제, 기침, 감기, 알레르기 약에 자주 사용됩니다.

정식명 아세트아미노펜이 항상 쓰여지는 것은 아닙니다. 특히 처방 진통제에 대해 아래 나열된 일반적인 약어를 찾아보십시오.

아세트아미노펜의 일반적인 약어

APAP	AC	아세트아미놀
아세타민	아세탐	아세트아미노프

항상 복용하는 제품의 라벨을 읽고 따르십시오. 의료진과 상의하지 않은 채 아세트아미노펜이 함유된 약을 두 가지 이상 복용하지 마십시오.

궁금한 점이 있으시면 의료보험팀으로 직접 연락해 주십시오. MSK 환자인 경우 오후 5시 이후와 주말 또는 공휴일에 의료진에게 연락해야 한다면 212-639-2000으로 전화하십시오.

추가 자료는 www.mskcc.org/pe의 가상 라이브러리에서 확인하실 수 있습니다.

Common Medications Containing Aspirin, Other Nonsteroidal Anti-inflammatory Drugs (NSAIDs), or Vitamin E - Last updated on October 25, 2021

모든 권리는 Memorial Sloan Kettering Cancer Center가 소유하고 보유합니다