Порядок реагирования в экстренных случаях при прохождении амбулаторной клеточной терапии

Инструкции:

При опасных экстренных ситуациях (угрожающих жизни):

1. **Позвоните 911.** Транспортируйте пациента только в автомобиле скорой медицинской помощи (Emergency Medical Services, EMS).
2. EMS может немедленно доставить вас в ближайшую больницу для оказания медицинской помощи. **Это вполне уместно** и ожидаемо — ваша безопасность превыше всего, и наша команда при необходимости сможет скоординировать оказание медицинской помощи с этой больницей.

При неопасных экстренных ситуациях (не угрожающих жизни):

1. Привезите пациента в центр неотложной помощи (UCC) MSK.
2. Когда вы приедете, скажите сотруднику UCC, что пациент проходит клеточную терапию.

Адрес центра неотложной помощи (Urgent Care Center, UCC) MSK:

- С 06:00 до 00:00 принимает отделение на 425 E. 67th St. (между 1st avenue и York avenue).
- В другое время принимает отделение на 1275 York Ave. (между East 67th street и East 68th street). Спросите дорогу на посту охраны.

При ситуациях, не являющихся экстренными:	Позвоните в отделение клеточной иммунотерапии (Cellular Therapy) по номеру 646-608-3150 (круглосуточно и без выходных).
Онколог отделения клеточной иммунотерапии	
Дата инфузии в отделении клеточной иммунотерапии:	

Memorial Sloan Kettering Cancer Center

	Опасные экстренные ситуации: позвоните 911	**Неопасные экстренные ситуации:** обратитесь в центр неотложной помощи MSK	**Ситуации, не являющиеся экстренными:** позвоните в отделение клеточной иммунотерапии по телефону 646-608-3150	
Ситуации, требующие повышенного внимания	• Пациент не просыпается • Пациент внезапно не может двигать руками или ногами • Судороги (неконтролируемая дрожь или скованность тела)	• Внезапное изменение зрения	• Головокружение • Тремор или дрожь • Перепады настроения • Изменение степени энергичности • Отсутствие сна • Появление или усугубление симптомов спутанности сознания	• Сложности с подбором слов • Изменение уровня внимания • Онемение или покалывание • Невозможность передвигаться • Проблемы с глотанием
Кровотечение		• Непрекращающееся кровотечение	• Рвота с кровью • Непрекращающееся носовое кровотечение • Кровь в моче • Черный и дегтеобразный (липкий) стул	• Использование 1 или нескольких гигиенических прокладок каждый час • Петехии (небольшие красные или фиолетовые пятна на коже) • Новое кровотечение или кровотечение сильнее обычного
Сахар в крови		• Сахар в крови менее 50 • Сахар в крови более 400 • Пациенту трудно проснуться	• Сахар в крови в пределах от 50 до 400	
Дыхание	• Отсутствие дыхания • Проблемы с дыханием • Удушье		• Свистящее дыхание (свист или хрипы при дыхании) • Одышка при незначительной физической активности	• Появившийся кашель или кашель, который не проходит • Кашель с кровью, зеленой или желтой слизью • Проблемы с дыханием в положении лежа
Центральный венозный катетер (CVC)		• Открытие катетера, попадание воздуха и проблемы с дыханием. **Немедленно закройте катетер.** • Катетер поврежден или подтекает • Выпадение катетера	• Невозможно промыть катетер • Отделяемое из места введения катетера • Боль в месте введения • Отек, покраснение или чувствительность в месте введения • Отек лица или шеи	
Диарея (жидкий или водянистый стул)		• Неконтролируемая постоянная диарея	• Появление диареи и спазмов в животе • Выведение целых таблеток с калом	

	Опасные экстренные ситуации: позвоните 911	**Неопасные экстренные ситуации:** обратитесь в центр неотложной помощи MSK	**Ситуации, не являющиеся экстренными:** позвоните в отделение клеточной иммунотерапии по телефону 646-608-3150
Падение	• Изменение сознания после падения	• Удар головой при падении	• Отсутствие удара головой при падении • Падение дома • Отсутствие изменения сознания после падения
Переутомление (ощущение большей усталости или слабости, чем обычно)	• Пациент не просыпается		• Головокружение • Пациент чувствует себя слишком усталым, чтобы встать с постели или сходить в ванную комнату
Повышенная температура или озноб		• Температура 100,4 °F (38 °C) или выше при измерении температуры через рот • Потрясающий озноб (температура может быть нормальной)	• Симптомы простуды (насморк, слезотечение, чихание, кашель)
Боль в ротовой полости (мукозит)	• Отсутствие дыхания • Проблемы с дыханием		• Ярко-красная кровь во рту • Проблемы с глотанием • Белые пятна или язвы на деснах, на губах или в ротовой полости • Боль, которая не проходит после приема обезболивающего лекарства
Тошнота или рвота (ощущение подступающей рвоты)		• Очень сильная боль в животе • Кровь или «кофейная гуща» в рвотных массах • Неконтролируемая постоянная тошнота и рвота	• Невозможность приема лекарств без рвоты • Тошнота не прекращается после приема лекарств от тошноты
Боль	• Очень сильная боль в груди • Очень сильное сдавливание или давление в груди	• Очень сильная внезапная головная боль	• Новая или неконтролируемая боль • Учащенное сердцебиение • Ощущение движения сердца • Жжение в груди или в животе • Боль или жжение во время мочеиспускания или опорожнения кишечника • Боль в месте введения центрального венозного катетера (CVC) • Боль при введении лекарств или жидкостей через CVC
сыпь.			• Новая сыпь • Сыпь с болью, зудом или обоими симптомами
Отек	• Проблемы с дыханием	• Отек горла	• Отек ног, рук или кистей • Внезапный отек с болью или без боли
Мочеиспускание			• Кровь в моче • Боль или жжение при мочеиспускании • Отсутствие мочеиспускания более 8 часов