

Руководство на случай чрезвычайной ситуации для амбулаторных пациентов, проходящих клеточную терапию

	в чрезвычайных ситуациях	в нечрезвычайных ситуациях	
Бдительность	<ul style="list-style-type: none"> • Неспособность проснуться • Приступ • Внезапное изменение зрения • Внезапная неспособность двигать руками или ногами 	<ul style="list-style-type: none"> • Головокружение • Треморы или дрожание • Изменение настроения • Изменение уровня энергии • Неспособность спать 	<ul style="list-style-type: none"> • Появление или усиление спутанности сознания • Изменение уровня бдительности • Летаргичность (замедленность движений) • Онемение или покалывание • Неспособность передвигаться • Нарушение глотания
Кровотечение	<ul style="list-style-type: none"> • Непрекращающееся кровотечение • Неспособность проснуться 	<ul style="list-style-type: none"> • Рвота кровью • Неспособность остановить носовое кровотечение • Кровь в моче • Понос с кровью 	<ul style="list-style-type: none"> • Использование одной или больше одной гигиенической прокладки в 1 час • Маленькие красные или фиолетовые пятна коже • Появление или усиление кровотечения
Уровень сахара в крови	<ul style="list-style-type: none"> • Выше 400 • Ниже 50 	<ul style="list-style-type: none"> • Сложно проснуться 	<ul style="list-style-type: none"> • Уровень сахара в крови в пределах между 50 и 400
Дыхание	<ul style="list-style-type: none"> • Отсутствие дыхания • Затрудненное дыхание • Закупорка дыхательных путей 	<ul style="list-style-type: none"> • Хрипы при дыхании • Быстрее начинает «задышаться» при минимальной активности 	<ul style="list-style-type: none"> • Появление кашля или постоянный кашель • При кашле отхаркивание крови или зеленого или желтого вещества • Затрудненное дыхание в положении лежа на спине
Центральный венозный катетер	<ul style="list-style-type: none"> • Трубка открыта для воздуха и одышка. <p style="text-align: center; margin: 0;">Закройте зажим на трубке немедленно.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Трубка сломана или протекает • Трубка выпала • Нет возможности промыть катетер • Дренаж из участка входа катетера 	<ul style="list-style-type: none"> • Боль в месте входа • Отек лица или шеи • Отек, покраснение или болезненность в месте входа
Диарея	<ul style="list-style-type: none"> • Неконтролируемая диарея 	<ul style="list-style-type: none"> • Новый приступ диареи или спазмов в животе 	<ul style="list-style-type: none"> • Таблетки целиком вышли со стулом

Падение	<ul style="list-style-type: none"> • Изменения в состоянии сознания после падения • Пациент ударился головой при падении 	<ul style="list-style-type: none"> • Пациент не ударился головой при падении • Упал дома 	<ul style="list-style-type: none"> • Нет изменений в состоянии сознания после падения
Усталость	<ul style="list-style-type: none"> • Неспособность проснуться 	<ul style="list-style-type: none"> • Головокружение 	<ul style="list-style-type: none"> • Слишком большая усталость, чтобы подняться с постели или пройти в туалет или ванную
Жар или озноб	<ul style="list-style-type: none"> • Жар с температурой 100,4 °F (38 °C) и выше при измерении во рту 	<ul style="list-style-type: none"> • Симптомы простуды (насморк, слезящиеся глаза, чихание, кашель) 	<ul style="list-style-type: none"> • Лихорадка, температура может быть нормальной
Боль во рту (мукозит)	<ul style="list-style-type: none"> • Не дышит • Затрудненное дыхание 	<ul style="list-style-type: none"> • Ярко-красная кровь во рту • Затрудненное глотание 	<ul style="list-style-type: none"> • Белые участки или язвы на деснах, во рту или на губах • Боль не контролируется лекарствами
Тошнота или рвота	<ul style="list-style-type: none"> • Сильная боль в животе 	<ul style="list-style-type: none"> • Неконтролируемая, постоянная тошнота и рвота • Неспособность удерживать лекарства внутри 	<ul style="list-style-type: none"> • Кровь или «кофейная гуща» в рвоте • Лекарства от тошноты не контролируют тошноту
Боль	<ul style="list-style-type: none"> • Сильная боль в груди • Сильное сжатие или давление в груди • Сильная внезапная головная боль 	<ul style="list-style-type: none"> • Появление боли или неконтролируемая боль • Дискомфорт в груди • Учащенное сердцебиение • Ощущение «хлюпанья» в сердце • Боль в месте входа центрального венозного катетера 	<ul style="list-style-type: none"> • Жжение в груди или животе • Боль или жжение при мочеиспускании или дефекации • Боль во время инфузии лекарств или жидкостей через центральный венозный катетер
Сыпь		<ul style="list-style-type: none"> • Появление сыпи 	<ul style="list-style-type: none"> • Сыпь сопровождается болью, зудом или и тем и тем
Отек	<ul style="list-style-type: none"> • Отек в горле • Затрудненное дыхание 	<ul style="list-style-type: none"> • Отек ног, рук или кистей 	<ul style="list-style-type: none"> • Внезапный отек, сопровождающийся болью или без боли
Мочеиспускание		<ul style="list-style-type: none"> • Моча с кровью • Боль или жжение при мочеиспускании 	<ul style="list-style-type: none"> • Неспособность помочиться в течение более 8 часов

См. инструкции на следующей странице.

в чрезвычайных ситуациях

1. Звоните 911.

Не транспортируйте пациента без участия скорой медицинской помощи (Emergency Medical Services, EMS).

2. Попросите, чтобы вас отвезли в пункт неотложной медицинской помощи (Urgent Care Center) при MSK.

- С 6:00 до полуночи пользуйтесь входом на 425 East 67th Street между First Avenue и York Avenue.
- Во все остальное время пользуйтесь входом на 1275 York Avenue между 67th и 68th стрит). Спросите, куда и как пройти у поста охраны.

3. Укажите, что пациент проходит клеточную терапию.

Пациентам, которые проходят процедуры трансплантации дома

Если вы зачислены в программу Homebound Transplant и у вас возникла ситуация, требующая неотложной помощи, позвоните в службу помощи престарелым в ситуациях, требующих неотложной помощи, SeniorCare Emergency Service, по номеру **718-430-9700**.

Когда будете звонить, скажите: **«Здравствуйтесь, у меня чрезвычайная ситуация и мне нужна бригада скорой помощи»**. Человек, принимающий звонок, может задать вам некоторые вопросы.

Если они спросят...

Скажите им...

«По какому адресу нужна неотложная помощь?»

Адрес, по которому вы находитесь.

«Где находится пациент?»

Номер комнаты, квартиры, этажа, корпуса или офиса.

«С какого телефонного номера вы звоните?»

Ваш номер телефона.

«Какова природа вашей чрезвычайной ситуации?»

Причину, по которой вы звоните, например: «У пациента жар» или «Пациенту тяжело дышать».

«В какой госпиталь нужно доставить пациента?»

Пункт неотложной медицинской помощи Urgent Care Center при Memorial Sloan Kettering Cancer Center.

в нечрезвычайных ситуациях

В течение дня (с 8:00 до 20:00)

- Звоните в Red Team по номеру 212-639-3122.
- С вами поговорит медицинский специалист Red Team.

Ночью (с 20:00 до 8:00)

- Звоните в MSK по номеру 212-639-2000.
- Попросите доктора, который покрывает костномозговую трансплантацию.