

Ванкомицин-резистентный *энтерококк*

Здесь приведена информация, описывающая *энтерококк*, резистентный к ванкомицину (VRE, сокращение на английском языке), включая то, как он распространяется и как проводится лечение инфекций.

Что такое ванкомицин-резистентный *энтерококк*?

Энтерококки – это бактерии, которые естественным образом присутствуют в вашем кишечнике. Некоторые штаммы энтерококков приобрели устойчивость к антибиотику ванкомицину, и это значит, что инфекция не поддается лечению данным антибиотиком. Эти устойчивые штаммы называют ванкомицин-резистентным *энтерококком*.

Ванкомицин-резистентный *энтерококк* может вызывать множество заболеваний, включая:

- Инфекции мочевыводящих путей
- Инфекции крови
- Инфекции раны

В чем заключается разница между присутствием колоний и инфицированием ванкомицин-резистентным *энтерококком*?

У человека могут либо присутствовать колонии, либо он может быть инфицирован ванкомицин-резистентным *энтерококком*. Если у человека присутствуют колонии, это означает, что бактерии находятся на его коже или в естественном отверстии тела, но признаки заболевания отсутствуют. Если человек инфицирован, то это значит, что бактерии присутствуют на его коже или в естественном отверстии тела, и это вызывает заболевание.

Как распространяется ванкомицин-резистентный *энтерококк*?

Ванкомицин-резистентный *энтерококк* распространяется при непосредственном контакте с биологическими жидкостями инфицированного человека (кровью, дренажом из раны, мочой, стулом или мокротой). Он также может распространяться при контакте с оборудованием или поверхностями, которые были заражены бактериями. Ванкомицин-резистентный *энтерококк* не распространяется при обычном контакте, таком как прикосновение или объятие.

Кто подвержен риску заражения ванкомицин-резистентным *энтерококком*?

Здоровые люди не подвержены высокому риску заражения ванкомицин-резистентным *энтерококком*. Чаще заражение происходит у людей:

- Пожилого возраста
- С ослабленными иммунными системами
- С хроническими заболеваниями
- Проходивших лечение антибиотиками в прошлом

- Недавно перенесших операцию
- С повторяющимися или продолжительными госпитализациями
- С открытыми ранами или язвами
- С трубками или дренажом, расположенными в теле

Каковы симптомы заражения ванкомицин-резистентным энтерококком?

Симптомы различаются в зависимости от места положения и типа инфекции.

Как осуществляется лечение инфекции, вызванной ванкомицин-резистентным энтерококком?

Инфекции, вызываемые ванкомицин-резистентным *энтерококком*, лечатся с помощью антибиотиков, у которых отсутствует устойчивость к бактериям.

Какие изоляционные меры предосторожности предпринимаются в госпитале, если у меня инфекция, вызванная ванкомицин-резистентным энтерококком?

- Если вам поставлен диагноз инфекции, вызванной ванкомицин-резистентным энтерококком, то вас поместят в отдельную палату.
- На двери вывешат надпись, которая будет предупреждать весь персонал и посетителей о принятии мер предосторожности.
- Весь персонал и посетители, входя в вашу палату и выходя из нее, должны очищать свои руки. Они могут использовать мыло и воду или антисептик для рук на основе спирта.
- Весь персонал и посетители, входящие в вашу палату, должны носить желтый халат и перчатки.
- Если вы покинете свою палату для проведения анализов, вы должны надеть желтый халат и перчатки или быть покрытым чистой простыней.
- Если вы покинете свою палату для прогулки по отделению, вы должны надеть желтый халат и перчатки.
- Вы не сможете ходить в следующие места в госпитале:
 - Буфет в вашем отделении
 - Центр отдыха на М15
 - Детские игровые комнаты на М9
 - Кафетерий
 - Главный вестибюль
 - Любое другое общественное место в госпитале
- Во время следования изоляционным мерам предосторожности вы можете получить в своей палате арт-терапию или лечебный массаж.
- Эти меры предосторожности прекратятся, после того, как вы пройдете лечение и у вас больше не будет симптомов.

Какие меры предосторожности мне следует принимать дома, если у меня инфекция, вызванная ванкомицин-резистентным *энтерококком*?

Здоровые люди не подвержены высокому риску заражения ванкомицин-резистентным *энтерококком*. Тем не менее, убедитесь, что дома вы выполняете следующее:

- Часто мойте руки с мылом и водой, особенно после использования туалета.
- Мойте руки после контакта с кровью, мочой или дренажом из раны.
- Используйте дезинфицирующее средство, такое как Clorox® или Lysol®, чтобы протирать любую поверхность, которая может быть заражена бактериями.

Где можно получить дополнительную информацию о ванкомицин-резистентном *энтерококке*?

Если у вас возникнут какие-либо вопросы, поговорите со своим врачом или медсестрой (медбратом). Вы также можете позвонить по телефону (212) 639-7814, чтобы поговорить со специалистом Отделения инфекционного контроля в Мемориальном онкологическом центре Слоан-Кеттеринг (МОЦСК).

Также для получения дополнительной информации вы можете посетить следующие сайты:

Centers for Disease Control and Prevention (Центры по контролю и профилактике заболеваний)
www.cdc.gov

New York State Department of Health (Управление здравоохранения штата Нью-Йорк)
www.health.ny.gov