



ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ И УХАЖИВАЮЩИХ ЗА НИМИ ЛИЦ

Об инъекциях verapamil для лечения болезни Пейрони

Эта информация поможет вам узнать, чего стоит ожидать до, во время и после инъекций (уколов) verapamil при лечении болезни Пейрони.

При болезни Пейрони внутри полового члена происходит образование рубцовых тканей. Эти ткани вызывают его кривизну (искривление полового члена при эрекции). Кроме того, это может стать причиной возникновения боли при эрекции. Иногда эти рубцовые ткани называют бляшками.

До начала лечения

Прежде чем начать лечение, вам нужно будет пройти пенильное ультразвуковое исследование (визуальную диагностику полового члена), чтобы установить место искривления. Для получения дополнительной информации о пенильном ультразвуковом исследовании ознакомьтесь с материалом *О пенильном ультразвуковом исследовании* (www.mskcc.org/ru/cancer-care/patient-education/about-your-penile-ultrasound). Вы можете найти его в Интернете или получить у своего медицинского сотрудника.

Лекарства

Вам не нужно прекращать прием ваших обычных лекарств во время лечения. В период лечения вы можете принимать aspirin, ibuprofen (например Motrin® и Advil®) или naproxen (например Aleve®).

Портал для пациентов (MSK MyChart)

Если у вас еще нет учетной записи на портале MSK MyChart, мы настоятельно рекомендуем вам зарегистрироваться там до начала лечения. Вы можете использовать свою учетную запись на портале MSK MyChart для защищенной отправки фотографий нежелательных реакций своему врачу и медсестре/медбратью высшей квалификации, если это понадобится.

Чтобы создать учетную запись, перейдите по ссылке mskmychart.mskcc.org.

График лечения

В течение курса лечения вам сделают 6 инъекций verapamil. Вам будут делать по одной инъекции каждые 2 недели. Важно воздерживаться от занятий сексом (полового контакта, орального секса и мастурбации) и не пользоваться устройством для вытяжения в течение 24 часов после каждой инъекции.

Через 6 недель после последней инъекции вам нужно будет пройти пенильное ультразвуковое исследование, чтобы посмотреть, не уменьшилось ли искривление. Если результаты ультразвукового исследования покажут, что некоторое искривление все же осталось, вы можете начать второй цикл лечения.

Во время инъекций

Сначала вы разденетесь до пояса снизу и ляжете на стол для осмотра. Медицинский сотрудник введет небольшое количество местного анестетика (лекарства, которое вызывает онемение участка тела) в основание полового члена через тонкую иглу. Вы можете почувствовать укол иглой, а затем ощущение тепла во время введения лекарства.

После введения анестетика медицинский сотрудник подождет не менее 15 минут, прежде чем сделать инъекцию verapamil. Это необходимо для того, чтобы анестетик начал действовать и гарантированно вызвал онемение всего этого участка.

Как только половой член онемеет, медицинский сотрудник введет verapamil в рубцовую ткань полового члена. После инъекции он плотно сожмет половой член и обернет его повязкой по всей длине. Повязка поможет уменьшить гематому и отек. Она не исправит кривизну. Вам оставят отверстие, чтобы вы могли мочиться.

После инъекций

- Воздерживайтесь от половой активности в течение 24 часов после каждой инъекции. Занятие сексом в течение этого времени может привести к перелому полового члена (разрыву тканей, обеспечивающих отвердевание полового члена).
- Не снимайте повязку с полового члена в течение 4 часов после каждой инъекции.
 - Если она снялась раньше, не нужно накладывать ее снова.
 - Не мочите повязку. Если вам нужно принять душ, а повязка еще не снята, закройте ее пластиковым пакетом.
- Вы можете вернуться к повседневным делам.

Устранение распространенных побочных эффектов

Считается нормальным, если после инъекции на половом члене и участке вокруг него наблюдается некоторая отечность и появились гематомы. Интенсивность отека и гематомы после каждой инъекции может быть различной. Чтобы уменьшить отек, старайтесь располагать половой член в направлении брюшной полости (живота) при помощи поддерживающих трусов типа плавок.

Также считается нормальным, если в месте инъекции возникает болезненность или дискомфорт. Болезненные ощущения могут сохраняться несколько дней после процедуры. В этом случае примите безрецептурное обезболивающее лекарство, например, aspirin, ibuprofen (Motrin®, Advil®) или parroxen (Aleve®).

Вытяжение полового члена

Между инъекциями важно пользоваться устройством для вытяжения полового члена. Это поможет максимально повысить эффективность лечения.

- Не пользуйтесь устройством для вытяжения в течение первых 24 часов после каждой инъекции. Использование устройства в этот период может привести к перелому полового члена.
- По истечении 24 часов после инъекции используйте устройство для вытяжения от 30 до 120 минут (2 часов) за один раз. Не используйте его дольше 2 часов за один раз.
- Вы можете пользоваться устройством для вытяжения несколько раз в день.
- Пользуйтесь им в общей сложности не более 6 часов в день.

Когда следует обращаться к своему медицинскому сотруднику

Немедленно позвоните своему медицинскому сотруднику, если у вас:

- появилась кровь в моче;
- возникли трудности с мочеиспусканием;
- во время эрекции вы услышали или почувствовали хлопок, сопровождающийся болью, эрекция исчезла, и на половом члене появилась фиолетовая гематома и отек. Это могут быть признаки перелома полового члена.

Если вы не можете помочиться, немедленно обратитесь в пункт неотложной медицинской помощи или отделение скорой помощи ближайшей больницы. Это состояние требует срочной медицинской помощи. Позвоните своему врачу из Memorial Sloan Kettering и сообщите о случившемся.

Контактная информация

Если у вас возникнут какие-либо вопросы или опасения, обсудите их с представителем лечащей команды. Вы можете звонить с понедельника по пятницу с 9:00 до 17:00 по телефону 646-888-6024.

После 17:00, а также в выходные и праздничные дни вы можете звонить по телефону 212-639-2000 только в случае экстренной необходимости.

Дополнительную информацию см. в нашей виртуальной библиотеке на сайте www.mskcc.org/pe.

About Verapamil Injections for Treatment of Peyronie's Disease - Last updated on August 19, 2019

Все права защищены и принадлежат Memorial Sloan Kettering Cancer Center