



---

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ И  
УХАЖИВАЮЩИХ ЗА НИМИ ЛИЦ

# **О катетере для продленной проводниковой анестезии верхних конечностей**

Эта информация поможет вам понять, что такая продленная проводниковая анестезия верхних конечностей, как она работает и чего ожидать после установки катетера.

## **Информация о катетере для проводниковой анестезии**

При проводниковой анестезии, для снятия боли путем блокады группы нервов используется местный анестетик. Местный анестетик — это лекарство, которое вызовет онемение участка тела.

**При продленной проводниковой анестезии** лекарство подается через соединенный с помпой катетер (тонкую гибкую трубку). Для облегчения боли после операции катетер продленной проводниковой анестезии может стоять несколько

дней. Ваш анестезиолог (врач, который специализируется на лекарствах для облегчения боли до, во время и после операции) запрограммирует помпу на подачу определенного количества местного анестетика. Вам может понадобиться больше или меньше лекарства в зависимости от того, насколько сильную боль вы испытываете после операции.

**При продленной проводниковой анестезии верхних конечностей** местный анестетик используется для снятия боли путем блокады нервов в верхних конечностях (плече, руке или кисти руки). Катетер проводниковой анестезии устанавливают в области шеи, где он будет достигать этих нервов.

Продленная проводниковая анестезия верхних конечностей существенно облегчит боль, но может не снять ее полностью. Возможно, при проводниковой анестезии вам также будет необходимо принимать обезболивающее лекарство.

## **Чего ожидать после операции**

Катетер проводниковой анестезии будет установлен во время операции. Чувство онемения плеча, руки или кисти сразу после операции — это нормальная реакция.

Вы можете чувствовать онемение лица или шеи на той стороне, где была проведена операция. Вы также можете заметить, что у вас охрип голос, опущено верхнее веко, сузились зрачки или заложен нос. Такие ощущения являются нормальными. Эти симптомы вызваны местным анестетиком и исчезнут после удаления катетера проводниковой анестезии.

Через 8-16 часов после операции действие более сильного местного анестетика, введенного врачом во время операции, ослабнет. Вам станет проще шевелить плечом, предплечьем или кистью. Вы можете испытывать некоторый дискомфорт по мере восстановления чувствительности.

Медсестра/медбрать запрограммирует помпу на введение вам местного анестетика через катетер проводниковой анестезии. Вам также могут дать обезболивающее лекарство, чтобы устраниТЬ дискомфорт.

Попросите у медсестры/медбрата обезболивающее лекарство, чтобы принять его перед сном в первую ночь после операции. Это поможет избежать пробуждения от боли после того, как пройдет онемение.

## **Чего ожидать при установленном**

# **катетере проводниковой анестезии**

- Вы можете обнаружить подтекание жидкости вокруг катетера проводниковой анестезии. Это местный анестетик. Это нормально и не означает, что он не действует. Если катетер проводниковой анестезии подтекает, сообщите об этом медсестре/медбрату.
- Катетер проводниковой анестезии может выпасть, или вы можете случайно вытащить его. Если это произойдет, сообщите медсестре/медбрату. Не выбрасывайте катетер.
- Не забывайте контролировать, в каком положении находятся ваше плечо, рука или кисть руки. Из-за местного анестетика вы не всегда будете это чувствовать. Защитите конечность, чтобы не повредить ее. Если вам дали поддерживающую повязку, держите в ней руку постоянно, снимая ее только для сеансов физиотерапии.
- Скажите медсестре/медбрату, если ваше плечо, рука или кисть руки полностью онемели. Возможно, необходимо выключить помпу на некоторое время. Ее можно включить снова, когда к руке вернется чувствительность.

## **Когда следует обращаться к своему**

## **медицинскому сотруднику**

Позвоните медицинскому сотруднику, если у вас возникло что-либо из перечисленного ниже:

- затрудненное дыхание или боль в груди;
- сыпь на теле;
- онемение вокруг рта;
- металлический привкус во рту;
- звон в ушах;
- головокружение;
- спутанность сознания;
- невнятная речь;
- подергивание мышц тела;
- судороги (неконтролируемое дрожание или напряжение мышц тела).

## **Контактная информация**

Если у вас возникли какие-либо вопросы или опасения, позвоните в Анестезиологическую службу (Anesthesia Pain Service) по номеру 212-639-6851. Вы можете связаться с сотрудником с понедельника по пятницу с 09:00 до 16:00. После 16:00, а также в выходные и праздничные дни звоните по номеру 212-639-2000 и спросите дежурного анестезиолога.

Дополнительную информацию см. в нашей виртуальной библиотеке на сайте [www.mskcc.org/pe](http://www.mskcc.org/pe).

---

About Your Continuous Upper Extremity Nerve Block Catheter -  
Last updated on April 2, 2024

Все права защищены и принадлежат Memorial Sloan Kettering Cancer Center