



ОБРАЗОВАНИЕ ПАЦИЕНТОВ И КОРНЯКОВ

# Alprostadil

Этот документ, предоставленный Lexicomp®, содержит всю необходимую информацию о препарате, включая показания, способ применения, побочные эффекты и случаи, при которых необходимо связаться с вашим поставщиком медицинских услуг.

## Фирменные знаки США

Caverject; Caverject Impulse; Edex; Muse; Prostin VR

## Фирменный знак Канады

Alprostadil Injection USP; Caverject; Muse Pellet; Prostin VR

## Для чего применяют этот препарат?

- Препарат назначается для лечения эректильной дисфункции (ЭД).
- Данный лекарственный препарат можно применять и по другим показаниям. Проконсультируйтесь с врачом.

## Что необходимо сообщить врачу ПЕРЕД приемом данного препарата?

- При индивидуальной аллергической реакции на альпростадил или какой-либо иной компонент этого препарата.
- Если у вас аллергия на аналогичные препараты, любые другие лекарства, пищевые продукты или другие вещества. Сообщите своему врачу о наличии у вас аллергии и ее симптомах, таких как сыпь, крапивница, зуд, одышка, свистящее дыхание, кашель, отек лица, губ, языка или горла или о любых других симптомах.
- Если Вам было сказано, что Вы недостаточно здоровы для занятий сексом.
- Если у Вас деформирован пенис, установлен пениальный имплантат или

существуют другие проблемы, связанные с половым органом.

- Если у Вас имеется любая из перечисленных проблем со здоровьем: полицитемия или тромбоцитемия.
- Если у Вас есть любые из перечисленных ниже проблем со здоровьем: лейкемия, множественная миелома, серповидноклеточная анемия или другие нарушения, повышающие риск болезненной эрекции, или эрекции, которая длится более 4 часов. Если Вы не уверены, спросите у своего врача.
- Если Вы — женщина. Этот лекарственный препарат не одобрен для применения у женщин.

Данный список лекарств и заболеваний, которые могут неблагоприятно сочетаться с приемом данного препарата, не является исчерпывающим.

Расскажите своему врачу и аптекарю о всех лекарствах, которые вы принимаете (как рецептурных, так и приобретаемых без рецепта, натуральных препаратах и витаминах), а также о своих проблемах со здоровьем. Вам необходимо удостовериться, что прием данного препарата безопасен при ваших заболеваниях и в сочетании с другими лекарствами, которые вы уже принимаете. Не начинайте и не прекращать прием какого-либо препарата, а также не менять дозировку без согласования с врачом.

## Какие меры предосторожности при приеме этого лекарства?

### Все формы выпуска:

- Сообщите всем обслуживающим Вас медицинским работникам о том, что Вы принимаете этот препарат. Это врачи, медсестры, фармацевты и стоматологи.
- Избегайте вождения транспортных средств, а также прочих занятий, требующих повышенного внимания, пока вы не увидите, как на вас влияет данный препарат.
- Чтобы снизить риск головокружения или потери сознания, вставать из лежачего или сидячего положения следует медленно. Подниматься и спускаться по лестнице следует с осторожностью.

- Перед употреблением алкоголя проконсультируйтесь с врачом.
- Данный лекарственный препарат не препятствует распространению заболеваний, таких как ВИЧ-инфекция или гепатит, которые передаются через кровь или половым путем. Не вступайте в половой контакт без использования латексного или полиуретанового презерватива. Не пользуйтесь одной иглой с другими людьми, а также не давайте никому личные вещи, например полотенца или бритву. Проконсультируйтесь с врачом.

### **Уретральные суппозитории:**

- Если Ваша сексуальная партнерша в состоянии забеременеть, применяйте надежное противозачаточное средство для предотвращения беременности.
- Во время приема данного препарата не вступайте в половые отношения с беременной женщиной без использования презерватива.
- Этот препарат не одобрен для применения у детей. Проконсультируйтесь с врачом.

### **Инъекция:**

- Существует вероятность поломки иглы при проведении инъекции. Иглы ломались, а часть иглы оставалась в половом члене. Если игла поломалась, и Вы можете захватить сломанный конец, вытащите его и обратитесь к своему врачу. Если Вы не можете захватить сломанный конец, немедленно обратитесь к своему врачу.
- Данный лекарственный препарат содержит бензиловый спирт. Бензиловый спирт может вызывать очень тяжелые и иногда опасные для жизни побочные эффекты у новорожденных и младенцев. Данный препарат не одобрен к применению детьми. Проконсультируйтесь с врачом.

**Причины, по которым необходимо незамедлительно позвонить лечащему врачу.**

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.** В редких случаях у некоторых пациентов прием данного препарата может повлечь серьезные, а иногда и смертельно

опасные побочные эффекты. Немедленно свяжитесь с лечащим врачом или обратитесь за медицинской помощью, если у вас присутствуют следующие признаки или симптомы, которые могут быть связаны с серьезными побочными эффектами:

- Признаки аллергической реакции, такие как сыпь, крапивница, зуд, покрасневшая и опухшая кожа с волдырями или шелушением, возможно в сочетании с лихорадкой, свистящее или хрипящее дыхание, стеснение в груди или горле, затрудненное дыхание, глотание или речь, необычная хриплость, отечность в области рта, лица, губ, языка или горла.
- Покраснение, наличие припухлостей, отек, болезненность или искривление полового члена во время эрекции.
- Раздражение в месте применения лекарственного препарата.
- Боль или давление в груди или учащенное сердцебиение.
- Головокружение или обморок.
- Сильная головная боль.
- Одышка.
- Любое необъяснимое образование кровоподтеков или кровотечения.
- Отечность вен на ногах.
- Немедленно свяжитесь с врачом, если у вас возникла болезненная эрекция, либо если эрекция длится более 4 часов. Это может произойти, даже если вы в это время не занимаетесь сексом. Если немедленно не принять меры, это может привести к долгосрочным проблемам с эрекцией, и вы, возможно, не сможете заниматься сексом.

## Каковы некоторые побочные эффекты данного препарата?

Любое лекарство может иметь побочные эффекты. Однако у многих людей побочные эффекты либо незначительные, либо вообще отсутствуют. Свяжитесь с лечащим врачом или обратитесь за медицинской помощью, если эти или любые другие побочные эффекты вас беспокоят или не проходят:

## **Уретральные суппозитории:**

- Ощущение жара или жжения в уретре.
- Боль в половом члене, яичках, ногах или в области между половым членом и прямой кишкой.

## **Инъекция:**

- Боль в половом члене.

Данный список возможных побочных эффектов не является исчерпывающим. Если у вас возникли вопросы касательно побочных эффектов, свяжитесь со своим врачом. Проконсультируйтесь с врачом относительно побочных эффектов.

Вы можете сообщить о развитии побочных эффектов в национальное управление здравоохранения.

## **Как принимать это лекарство наилучшим образом?**

Применяйте данный препарат в соответствии с предписаниями врача. Прочитайте всю предоставленную Вам информацию. Строго следуйте всем инструкциям.

## **Все формы выпуска:**

- Ваш лечащий врач научит вас тому, как правильно принимать этот препарат.
- Мойте руки до и после применения.

## **Уретральные суппозитории:**

- Этот препарат предназначен для применения в уретре (трубке, через которую проходит моча).
- Эффективность препарата повысится, если перед его применением Вы помочитесь.

## **Инъекция:**

- Не взбалтывайте.

- Перед каждой дозой следует устанавливать новую иглу.
- Не используйте изогнутую иглу. Не пытайтесь разогнуть согнутую иглу. Вероятность ее поломки повышается.
- После введения препарата слегка прижмите место инъекции, чтобы предупредить образование кровоподтека. Прижимайте место инъекции в течение 5 минут и до остановки кровотечения.
- Выкидывайте иглы в контейнер для использованных острых предметов/иголок. Иглы и другие предметы повторно использовать нельзя. Когда контейнер наполнится, утилизируйте его согласно местным правилам. Если у Вас есть вопросы, проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом.
- Не применяйте, если раствор мутный, протекает или содержит частицы.
- Не используйте, если раствор изменит цвет.
- Чередуйте стороны полового члена и вводите каждую дозу препарата в другой участок.

## Что делать, если я пропустил(а) прием препарата?

- Данный лекарственный препарат применяется по мере необходимости. Не применяйте препарат чаще, чем назначено врачом.

## Как мне хранить это лекарство?

### **Уретральные суппозитории:**

- Храните невскрытую упаковку из фольги в холодильнике.
- Защищайтесь от воздействия тепла и солнечных лучей.
- Препарат следует хранить при комнатной температуре не дольше 2 недель после начала использования.

### **Инъекция:**

- Хранить в соответствии с указаниями врача.

### **Все формы выпуска:**

- Храните все лекарственные препараты в безопасном месте. Храните все лекарственные препараты в месте, недоступном для детей и домашних животных.
- Утилизируйте неиспользованные лекарственные препараты или препараты с истекшим сроком годности. Не выливайте в туалет или канализацию без соответствующих указаний. Если у вас есть вопросы относительно утилизации лекарственных препаратов, проконсультируйтесь с фармацевтом. В вашем регионе могут действовать программы утилизации лекарственных препаратов.

## Общее утверждение

- Если состояние вашего здоровья не улучшается или даже ухудшается, обратитесь к врачу.
- Не следует давать кому-либо свое лекарство и принимать чужие лекарства.
- Следует вести список всех принимаемых Вами лекарств (выдаваемых по рецепту, натуральных продуктов или добавок, витаминов и лекарств, продающихся без рецепта). Этот список необходимо показывать вашему врачу.
- Перед началом приема любого нового препарата, включая препараты, отпускаемые без рецепта, натуральные препараты и витамины, проконсультируйтесь с врачом.
- К некоторым лекарственным препаратам могут прилагаться другие информационные листки для пациента. Если у Вас есть вопросы, касающиеся данного лекарственного препарата, проконсультируйтесь с врачом, медсестрой, фармацевтом или другим работником здравоохранения.
- Если вы считаете, что произошла передозировка препарата, немедленно позвоните в токсикологический центр или обратитесь за медицинской помощью. Будьте готовы сообщить или показать, какой препарат вы приняли, в каком количестве и когда это произошло.

## Использование информации потребителей и заявление об ограничении ответственности

Эту информацию не следует использовать для принятия решения о приеме этого или любого другого препарата. Только лечащий врач обладает необходимыми знаниями и опытом, чтобы принимать решения о том, какие препараты подходят для конкретного пациента. Данная информация не является гарантией того, что препарат безопасен, эффективен или одобрен для лечения каких-либо заболеваний или конкретных пациентов. Здесь приведены лишь краткие сведения общего характера об этом препарате. Здесь НЕ приводится вся имеющаяся информация о возможном использовании препарата с инструкциями по применению, предупреждениями, мерами предосторожности, сведениями о взаимодействии, нежелательных эффектах и рисках, которые могут быть связаны с данным препаратом. Эта информация не должна рассматриваться в качестве руководства по лечению и не заменяет собой информацию, предоставляемую вам лечащим врачом. Для получения полной информации о возможных рисках и преимуществах приема этого препарата обратитесь к лечащему врачу.

## Авторское право

© Wolters Kluwer Clinical Drug Information, Inc. и ее аффилированные компании и/или лицензиары, 2019. Все права защищены.

Если у вас возникли вопросы, обратитесь непосредственно к сотруднику своей медицинской бригады. Пациенты MSK могут обратиться к поставщику услуг после 17:00 либо в выходной или праздничный день, позвонив по номеру 212-639-2000.

Дополнительную информацию см. в нашей виртуальной библиотеке на [www.mskcc.org/pe](http://www.mskcc.org/pe).

Alprostadil - Generated on July 21, 2019

©2019 Memorial Sloan Kettering Cancer Center