



ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ И УХАЖИВАЮЩИХ ЗА НИМИ ЛИЦ

Что делать дома во время инфузии Blinatumomab (Blincyto®): информация для взрослых пациентов

Эта информация поможет вам понять, что делать дома во время инфузии blinatumomab.

Эта информация предназначена для взрослых пациентов. Если вы проходите лечение в MSK Kids, ваша лечащая команда даст вам другие указания.

Для получения дополнительной информации о том, что делать дома во время инфузии, ознакомьтесь с материалом *Blinatumomab* (www.mskcc.org/ru/cancer-care/patient-education/medications/adult/blinatumomab).

Ежедневно проверяйте инфузионную систему

- Проверяйте соединение компонентов на инфузионной системе как минимум один раз в день. Убедитесь в надежности соединения этих компонентов.
 - Если система отсоединилась, не пытайтесь подключить ее снова. Зажмите ее зажимом, предусмотренным в системе. Немедленно позвоните своему врачу центра MSK. Вам расскажут, что нужно

делать.

- Убедитесь, что ничего не натягивает систему. Помните, что помповый блок с blinatumomab должен всегда находиться рядом с вами. Если вы отойдете слишком далеко от него, он будет натягивать инфузционную систему.
- В случае утечки или разлива blinatumomab соблюдайте указания, приведенные в материале **4 действия на букву З, необходимые при утечке или разливе лекарства для химиотерапии** (www.mskcc.org/ru/cancer-care/patient-education/follow-4-cs-if-your-chemo-leaks-spills). Информация доступна онлайн; вы также можете попросить копию у своей лечащей команды.

Ежедневно проверяйте помпу

- Проверяйте индикатор инфузии на помпе как минимум один раз в день. Он должен мигать зеленым цветом.
 - При подаче звукового сигнала помпа может отображать информацию на экране. Информация о различных сигналах помпы и о том, что следует делать при их активации, представлена в материале **CADD®-Solis VIP Alarm Help Guide** (www.mskcc.org/cancer-care/patient-education/cadd-solis-vip-alarm-help-guide).
 - При появлении вопросов, связанных с помпой, звоните в Службу поддержки инфузионных систем по телефону 800-315-3287.
- Помпа должна располагаться на уровне сердца или выше. Это способствует стабильному введению blinatumomab.
- Защищайте помпу от воздействия прямых солнечных лучей.
- Не подвергайте помпу воздействию температур ниже 34 °F (2°C) или выше 104 °F (40 °C).
- Не используйте помпу в условиях очень высокой влажности, например, в ванной комнате после долгого и горячего душа.

Следите за тем, чтобы повязка на PICC или имплантируемом порте всегда была чистой, сухой и неповрежденной

- На периферически вводимый центральный катетер (peripherally inserted central catheter, PICC) или имплантируемый порт (mediport) вам будет наложена повязка (бандаж). Каждый раз, когда принимаете ванну или душ, накрывайте ее водонепроницаемой пленкой (например, AquaGuard®). Ваша лечащая команда покажет вам, как это делать.
- Если повязка загрязнена, намокла или повреждена, немедленно позвоните своему врачу центра MSK. Вам расскажут, что нужно делать. Для замены повязки вам нужно будет прийти в отделение MSK.

Следите за тем, чтобы инфузия выполнялась вовремя и без перерывов

- Если инфузия прекращается более чем на 4 часа, немедленно позвоните своему врачу центра MSK. Вам скажут, что делать.
- Во время инфузии вам будут назначены приемы для замены пакета с blinatumomab. Очень важно приходить на эти приемы вовремя.

Что делать, если вы попали на прием к медицинскому сотруднику за пределами центра MSK

- Медсестра/медбрать предоставит вам материал *Blinatumomab (Blincyto®) Wallet Card* (www.mskcc.org/cancer-care/patient-education/blinatumomab-blincyto-wallet-card). В нем приведена информация для медицинских сотрудников, которые могут быть не знакомы с blinatumomab. Всегда носите эту карточку-памятку с собой. Если вам нужно обратиться к медицинскому сотруднику за пределами центра MSK, покажите ему карточку.

- На системе для инфузии blinatumomab должна быть наклейка «Не промывать». Это наглядное напоминание для медицинских сотрудников о запрете промывания системы для инфузии blinatumomab. Не снимайте наклейку.

Когда звонить лечащей команде

Позвоните своему медицинскому сотруднику центра MSK, если:

- инфузионная система отсоединилась;
- повязка на PICC или имплантируемом порте загрязнена, намокла или повреждена;
- инфузия была прекращена более 4 часов назад;
- наблюдается боль или отек вокруг PICC или имплантируемого порта;
- появились признаки подтекания жидкости из PICC или имплантируемого порта, системы инфузии или помпы;
- возникли какие-либо вопросы или опасения.

При появлении вопросов, связанных с помпой, звоните в Службу поддержки инфузионных систем по телефону 800-315-3287.

If you have questions or concerns, contact your healthcare provider. A member of your care team will answer Monday through Friday from 9 a.m. to 5 p.m. Outside those hours, you can leave a message or talk with another MSK provider. There is always a doctor or nurse on call. If you're not sure how to reach your healthcare provider, call 212-639-2000.

Дополнительную информацию см. в нашей виртуальной библиотеке на сайте www.mskcc.org/pe.

What To Do at Home During Your Blinatumomab (Blinacyto®) Infusion: Information for Adult Patients - Last updated on June 2, 2025

Все права защищены и принадлежат Memorial Sloan Kettering Cancer Center