

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ И УХАЖИВАЮЩИХ ЗА НИМИ ЛИЦ

Что делать дома во время инфузии Blinatumomab (Blinicyto®): информация для пациентов детского возраста

Эта информация поможет вам понять, что делать дома во время инфузии blinatumomab. Использованные в тексте этого материала слова «вы» и «ваш» также относятся к вам или вашему ребенку.

Эта информация предназначена для пациентов детского возраста (проходящих лечение в MSK Kids). Если вы не проходите лечение в MSK Kids, ваша лечащая команда даст вам другие указания.

Для получения дополнительной информации о том, что делать дома во время инфузии, ознакомьтесь с материалом *Blinatumomab* (www.mskcc.org/ru/cancer-care/patient-education/medications/pediatric/blinatumomab).

Ежедневно проверяйте инфузионную систему

- Проверьте соединение компонентов на инфузионной системе как минимум один раз в день. Убедитесь в надежности соединения этих компонентов.
 - Если система отсоединилась, не пытайтесь подключить ее снова. Зажмите ее зажимом, прикрепленным к системе. Немедленно позвоните 212-639-2000. Попросите соединить вас с врачом-педиатром.
- Убедитесь, что ничего не натягивает систему. Помните, что ранцевый блок с blinatumomab должен всегда находиться рядом с вами. Если вы отойдете слишком далеко от него, он будет натягивать инфузионную систему.

Ежедневно проверяйте помпу

- Проверьте индикатор инфузии на помпе как минимум один раз в день. Он

должен мигать зеленым цветом.

- Если помпа подает звуковой сигнал, позвоните по номеру 212-639-2000. Попросите соединить вас с врачом-педиатром.
- При подаче звукового сигнала помпа может отображать информацию на экране. Примеры отображаемой информации приведены в материале *CADD®-Solis VIP Alarm Help Guide* (www.mskcc.org/cancer-care/patient-education/cadd-solis-vip-alarm-help-guide).
- Помпа должна располагаться на уровне сердца или выше. Это способствует стабильному введению blinatumab.
- Защищайте помпу от воздействия прямых солнечных лучей.
- Не подвергайте помпу воздействию температур ниже 34 °F (2°C) или выше 104 °F (40 °C).
- Не используйте помпу в условиях очень высокой влажности, например, в ванной комнате после долгого и горячего душа.

Следите за тем, чтобы повязка (бандаж) на имплантируемом порте всегда была чистой, сухой и неповрежденной

- Каждый раз, когда принимаете ванну или душ, накрывайте повязку на имплантируемом порте водонепроницаемой пленкой (например, AquaGuard®). Ваша лечащая команда покажет вам, как это делать.
- Если повязка испачкалась, намокла или порвалась, позвоните по телефону 212-639-2000. Попросите соединить вас с врачом-педиатром. Для замены повязки вам нужно будет прийти в Педиатрический центр амбулаторной помощи (Pediatric Ambulatory Care Center (PACC)).

Следите за тем, чтобы инфузия выполнялась по расписанию и без перерывов

- Во время инфузии вам будут назначены приемы для замены пакета с blinatumab. Очень важно приходить на эти приемы вовремя. Это поможет нам в нужный момент заменить пакет с blinatumab.
- Если возникла проблема с помпой, инфузионной системой или

имплантируемым портом, сразу же звоните по телефону 202-639-2000.

Попросите соединить вас с врачом-педиатром. Вам нужно будет приехать в РАСС на Манхэттене.

- Возможно, вам придется задержаться в РАСС, если вам неожиданно понадобится новый пакет с blinatumomab. Мы предоставляем новый пакет по мере необходимости. В этом процессе участвует много людей, и он может занять несколько часов.
- Если инфузия прекращается более чем на 4 часа, то для ее возобновления мы можем положить вас в больницу. Это связано с тем, что при возобновлении инфузии у вас могут возникнуть побочные эффекты. В больнице мы можем наблюдать и контролировать их более эффективно.

Когда звонить лечащей команде

Звоните по номеру 212-639-2000 и спросите врача-педиатра, если:

- инфузионная система отсоединилась;
- помпа подает звуковой сигнал;
- повязка на имплантируемом порте загрязнена, намочена или повреждена;
- наблюдается боль или отек вокруг имплантируемого порта;
- есть признаки подтекания жидкости из имплантируемого порта, трубки или помпы;
- возникли какие-либо вопросы или опасения.

Вы можете обращаться к педиатру круглосуточно без выходных.

Дополнительную информацию см. в нашей виртуальной библиотеке на сайте www.mskcc.org/pe.

What To Do at Home During Your Blinatumomab (Blinicyto®) Infusion: Information for Pediatric Patients - Last updated on May 5, 2025

Все права защищены и принадлежат Memorial Sloan Kettering Cancer Center

Дата последнего обновления

May 5, 2025

Learn about our [Health Information Policy](#).

Поделитесь своим мнением

Поделитесь своим мнением

Ваш отзыв поможет нам скорректировать образовательные материалы, предоставляемые пациентам. Данные, предоставленные вами в этой форме обратной связи, будут недоступны для сотрудников вашей лечащей команды. Пожалуйста, не используйте эту форму для вопросов о вашем лечении. Если у вас есть вопросы по поводу вашего лечения, обратитесь к своему медицинскому сотруднику.

Хотя мы читаем все отзывы, мы не можем ответить на все вопросы. Мы просим не указывать свое имя или какую-либо персональную информацию в этой форме обратной связи.

Was this information easy to understand?

Yes

Somewhat

No

Что следует объяснить более подробно?

Не вводите свое имя или любую персональную информацию.

Отправить



Memorial Sloan Kettering
Cancer Center